

А.Ф. ФИЛИППОВ

СБОРНИК
ЗАДАЧ
ПО
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ
УРАВНЕНИЯМ



А. Ф. ФИЛИПPOB

СБОРНИК ЗАДАЧ
ПО
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ
УРАВНЕНИЯМ

ИЗДАНИЕ СЕДЬМОЕ, СТЕРЕОТИПНОЕ

*Допущено Государственным комитетом СССР
по народному образованию
в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений*



МОСКВА «НАУКА»
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1992

ББК 22.161.6
Ф53
УДК 517.9(075.8)

Филиппов А. Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям: Учебное пособие для вузов.— 7-е изд., стер.— М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1992.— 128 с.

Содержит задачи по курсу дифференциальных уравнений, составленные и подобранные автором в процессе многолетней преподавательской работы в Московском государственном университете.

Для студентов университетов и технических вузов с повышенной математической программой.

Ил. 8.

Рецензент

доктор физико-математических наук профессор
М. В. Федорюк

Учебное издание

ФИЛИППОВ Алексей Федорович

СБОРНИК ЗАДАЧ ПО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ УРАВНЕНИЯМ

Заведующий редакцией *А. П. Баева*
Редакторы *М. М. Горячяя, К. Г. Кравчук*
Художественный редактор *Г. М. Коровина*
Технический редактор *Л. В. Лихачева*
Корректор *Н. Д. Дорохова*

ИБ № 41299

Сдано в набор 28.03.91. Подписано к печати 16.03.92. Формат 84×108/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 6,72. Усл. кр.-отт. 6,93. Уч.-изд. л. 8,14. Тираж 20 700 экз. Заказ № 734. С-030.

Издательско-производственное и книготорговое объединение «Наука»
Главная редакция физико-математической литературы
117071 Москва В-71, Ленинский проспект, 15

Четвертая типография издательства «Наука»
630077 Новосибирск, 77, Станиславского 25

Ф 1602070100—030 41-91
053(02)-92

© «Наука». Физматлит, 1973;
с изменениями, 1979, 1992

ISBN 5-02-014663-3

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	4
§ 1. Изоклины. Составление дифференциального уравнения семейства кривых	5
§ 2. Уравнения с разделяющимися переменными	7
§ 3. Геометрические и физические задачи	9
§ 4. Однородные уравнения	14
§ 5. Линейные уравнения первого порядка	17
§ 6. Уравнения в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель	20
§ 7. Существование и единственность решения	23
§ 8. Уравнения, не разрешенные относительно производной	28
§ 9. Разные уравнения первого порядка	32
§ 10. Уравнения, допускающие понижение порядка	35
§ 11. Линейные уравнения с постоянными коэффициентами	38
§ 12. Линейные уравнения с переменными коэффициентами	48
§ 13. Краевые задачи	56
§ 14. Линейные системы с постоянными коэффициентами	58
§ 15. Устойчивость	70
§ 16. Особые точки	78
§ 17. Фазовая плоскость	84
§ 18. Зависимость решения от начальных условий и параметров. Приближенное решение дифференциальных уравнений	88
§ 19. Нелинейные системы	97
§ 20. Уравнения в частных производных первого порядка	100
Ответы	106
Таблицы показательной функции и логарифмов	128

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сборник содержит задачи по курсу обыкновенных дифференциальных уравнений в соответствии с программой, принятой на механико-математическом факультете Московского государственного университета. Часть задач взята из известных задачников Н. М. Гюнтера и Р. О. Кузьмина, Г. Н. Бермана, М. Л. Краснова и Г. И. Макаренко, учебников В. В. Степанова, Г. Филиппса; большинство задач составлено заново. Более трудные задачи отмечены звездочкой.

В начале каждого параграфа изложены основные методы, необходимые для решения задач этого параграфа, или даны ссылки на соответствующие учебники. В ряде случаев приведены подробные решения типовых задач.

В книге приняты условные обозначения учебников:

[1] — В. В. Степанов, Курс дифференциальных уравнений.

[2] — И. Г. Петровский. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений.

[3] — Л. С. Понтрягин, Обыкновенные дифференциальные уравнения.

[4] — Л. Э. Эльсгольц, Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление.

[5] — Б. П. Демидович, Лекции по математической теории устойчивости.

А. Ф. Филиппов

§ 1. ИЗОКЛИНЫ.

СОСТАВЛЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ СЕМЕЙСТВА КРИВЫХ

1. Решение уравнения $y' = f(x, y)$, проходящее через точку (x, y) , должно иметь в этой точке производную y' , равную $f(x, y)$, т. е. оно должно касаться прямой, наклонённой под углом $\alpha = \arctg f(x, y)$ к оси Ox . Геометрическое место точек плоскости (x, y) , в которых наклон касательных к решениям уравнения $y' = f(x, y)$ один и тот же, называется изоклиной. Следовательно, уравнение изоклины имеет вид $f(x, y) = k$, где k — постоянная.

Чтобы приближенно построить решения уравнения $y' = f(x, y)$, можно начертить достаточное число изоклин, а затем провести решения, т. е. кривые, которые в точках пересечения с изоклинами $f(x, y) = k_1, f(x, y) = k_2, \dots$ имеют касательные с угловыми коэффициентами соответственно k_1, k_2, \dots . Пример применения этого метода см. [1], гл. I, § 4, п. 3 или [4], гл. I, § 1.

2. Чтобы построить дифференциальное уравнение, которому удовлетворяют кривые семейства

$$f(x, y, C_1, \dots, C_n) = 0, \quad (1)$$

надо продифференцировать равенство (1) n раз, считая y функцией от x , а затем из полученных уравнений и уравнения (1) исключить произвольные постоянные C_1, \dots, C_n .

Пример. Составить дифференциальное уравнение семейства кривых

$$C_1 x + (y - C_2)^2 = 0. \quad (2)$$

Так как уравнение семейства содержит два параметра, дифференцируем его два раза, считая $y = y(x)$:

$$C_1 + 2(y - C_2)y' = 0, \quad (3)$$

$$2y'^2 + 2(y - C_2)y'' = 0. \quad (4)$$

Исключаем C_1 . Из уравнения (3) имеем $C_1 = -2(y - C_2)y'$, подставляя это в (2), получим

$$-2xy'(y - C_2) + (y - C_2)^2 = 0. \quad (5)$$

Исключаем C_2 . Из уравнения (4) имеем $y - C_2 = -y'^2/y''$; подставляя это в (5), получим после упрощений дифференциальное уравнение $y' + 2xy'' = 0$.

3. Линии, пересекающие все кривые данного семейства под одним и тем же углом φ , называются изогональными траекториями. Углы β и α наклона траектории и кривой к оси Ox связаны соотношением $\beta = \alpha \pm \varphi$. Пусть

$$y' = f(x, y) \quad (6)$$

— дифференциальное уравнение данного семейства кривых, а

$$y' = f_1(x, y) \quad (7)$$

— уравнение семейства изогональных траекторий. Тогда $\operatorname{tg} \alpha = f(x, y)$, $\operatorname{tg} \beta = f_1(x, y)$. Следовательно, если уравнение (6) написано и угол φ известен, то легко найти $\operatorname{tg} \beta$ и затем написать дифференциальное уравнение траекторий (7).

Если уравнение данного семейства кривых написано в виде

$$F(x, y, y') = 0, \quad (8)$$

то при составлении уравнения изогональных траекторий можно обойтись без разрешения уравнения (8) относительно y' . В этом случае в (8) надо заменить y' на $\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{tg}(\beta \mp \varphi)$, где $\operatorname{tg} \beta = y'$ — угловой коэффициент касательной к траектории.

Если же уравнение семейства кривых дано в виде $\varphi(x, y, C) = 0$, то сначала нужно составить дифференциальное уравнение этого семейства и только после этого — дифференциальное уравнение траекторий.

В задачах 1—14 с помощью изоклин начертить (приближенно) решения данных уравнений.

$$1. y' = y - x^2. \quad 2. 2(y + y') = x + 3.$$

$$3. y' = \frac{x^2 + y^2}{2} - 1. \quad 4. (y^2 + 1)y' = y - x.$$

$$5. yy' + x = 0, \quad 6. xy' = 2y.$$

$$7. xy' + y = 0. \quad 8. y' + y = (x - y')^3.$$

$$9. y' = x - e^y. \quad 10. y(y' + x) = 1. \quad 11. y' = \frac{y - 3x}{x + 3y}.$$

$$12. y' = \frac{y}{x + y}. \quad 13. x^2 + y^2 y' = 1. \quad 14. (x^2 + y^2)y' = 4x.$$

15. Написать уравнение геометрического места точек (x, y) , являющихся точками максимума или минимума решений уравнения $y' = f(x, y)$. Как отличить точки максимума от точек минимума?

16. Написать уравнение геометрического места точек перегиба графиков решений уравнений а) $y' = y - x^2$; б) $y' = x - e^y$; в) $x^2 + y^2 y' = 1$; г) $y' = f(x, y)$.

В задачах 17—29 составить дифференциальные уравнения данных семейств линий.

$$17. y = e^{Cx}. \quad 18. y = (x - C)^3. \quad 19. y = Cx^3.$$

$$20. y = \sin(x + C). \quad 21. x^2 + Cy^2 = 2y.$$

$$22. y^2 + Cx = x^3. \quad 23. y = C(x - C)^2.$$

$$24. Cy = \sin Cx. \quad 25. y = ax^2 + be^x.$$

$$26. (x-a)^2 + by^2 = 1. \quad 27. \ln y = ax + by.$$

$$28. y = ax^3 + bx^2 + cx. \quad 29. x = ay^2 + by + c.$$

30. Составить дифференциальное уравнение окружностей радиуса 1, центры которых лежат на прямой $y = 2x$.

31. Составить дифференциальное уравнение парабол с осью, параллельной Oy , и касающихся одновременно прямых $y = 0$ и $y = x$.

32. Составить дифференциальное уравнение окружностей, касающихся одновременно прямых $y = 0$ и $x = 0$ и расположенных в первой и третьей четвертях.

33. Составить дифференциальное уравнение всех парабол с осью, параллельной Oy , и проходящих через начало координат.

34. Составить дифференциальное уравнение всех окружностей, касающихся оси абсцисс.

В задачах 35—36 найти системы дифференциальных уравнений, которым удовлетворяют линии данных семейств.

$$35. ax + z = b, \quad y^2 + z^2 = b^2.$$

$$36. x^2 + y^2 = z^2 - 2bz; \quad y = ax + b.$$

В задачах 37—50 составить дифференциальные уравнения¹⁾ траекторий, пересекающих линии данного семейства под данным углом φ :

$$37. y = Cx^4, \quad \varphi = 90^\circ. \quad 38. y^2 = x + C, \quad \varphi = 90^\circ.$$

$$39. x^2 = y + Cx, \quad \varphi = 90^\circ. \quad 40. x^2 + y^2 = a^2, \quad \varphi = 45^\circ.$$

$$41. y = kx, \quad \varphi = 60^\circ. \quad 42. 3x^2 + y^2 = C, \quad \varphi = 30^\circ.$$

$$43. y^2 = 2px, \quad \varphi = 60^\circ. \quad 44. r = a + \cos \theta, \quad \varphi = 90^\circ.$$

$$45. r = a \cos^2 \theta, \quad \varphi = 90^\circ. \quad 46. r = a \sin \theta, \quad \varphi = 45^\circ.$$

$$47. y = x \ln x + Cx, \quad \varphi = \arctg 2.$$

$$48. x^2 + y^2 = 2ax, \quad \varphi = 45^\circ. \quad 49. x^2 + C^2 = 2Cy, \quad \varphi = 90^\circ.$$

$$50. y = Cx + C^3, \quad \varphi = 90^\circ.$$

§ 2. УРАВНЕНИЯ

С РАЗДЕЛЯЮЩИМИСЯ ПЕРЕМЕННЫМИ

1. Уравнения с разделяющимися переменными могут быть записаны в виде

$$y' = f(x)g(y), \quad (1)$$

а также в виде

$$M(x)N(y) dx + P(x)Q(y) dy = 0. \quad (2)$$

¹⁾ Уравнения, получаемые в задачах 37—50, могут быть решены методами, излагаемыми в дальнейших параграфах.

Для решения такого уравнения надо обе его части умножить или разделить на такое выражение, чтобы в одну часть уравнения входило только x , в другую — только y , и затем проинтегрировать обе части.

При делении обеих частей уравнения на выражение, содержащее неизвестные x и y , могут быть потеряны решения, образующие это выражение в нуль.

Пример. Решить уравнение $x^2 y^2 y' + 1 = y$. (3)

Приводим уравнение к виду (2):

$$x^2 y^2 \frac{dy}{dx} = y - 1; \quad x^2 y^2 dy = (y - 1) dx.$$

Делим обе части уравнения на $x^2(y - 1)$:

$$\frac{y^2}{y - 1} dy = \frac{dx}{x^2}.$$

Переменные разделены. Интегрируем обе части уравнения:

$$\int \frac{y^2}{y - 1} dy = \int \frac{dx}{x^2}; \quad \frac{y^2}{2} + y + \ln |y - 1| = -\frac{1}{x} + C.$$

При делении на $x^2(y - 1)$ могли быть потеряны решения $x = 0$ и $y - 1 = 0$, т. е. $y = 1$. Очевидно, $y = 1$ — решение уравнения (3), а $x = 0$ — нет.

2. Уравнения вида $y' = f(ax + by)$ приводятся к уравнениям с разделяющимися переменными заменой $z = ax + by$ (или $z = ax + by + c$, где c любое).

В задачах 51—65 решить данные уравнения и для каждого из них построить несколько интегральных кривых. Найти также решения, удовлетворяющие начальным условиям (в тех задачах, где указаны начальные условия).

51. $xy dx + (x + 1) dy = 0$. 52. $\sqrt{y^2 + 1} dx = xy dy$.

53. $(x^2 - 1)y' + 2xy^2 = 0$; $y(0) = 1$.

54. $y' \operatorname{ctg} x + y = 2$; $y(\pi/3) = 0$.

55. $y' = 3\sqrt[3]{y^2}$; $y(2) = 0$. 56. $xy' + y = y^2$; $y(1) = 0,5$.

57. $2x^2 y y' + y^2 = 2$. 58. $y' - xy^2 = 2xy$.

59. $e^{-s} \left(1 + \frac{ds}{dt}\right) = 1$. 60. $z' = 10^{x+z}$.

61. $x \frac{dx}{dt} + t = 1$. 62. $y' = \cos(y - x)$.

63. $y' - y = 2x - 3$.

64. $(x + 2y)y' = 1$; $y(0) = -1$.

65. $y' = \sqrt{4x + 2y - 1}$.

В задачах 66—67 найти решения уравнений, удовлетворяющие указанным условиям при $x \rightarrow +\infty$.

66. $x^2 y' - \cos 2y = 1$; $y(+\infty) = 9\pi/4$.

67. $3y^2 y' + 16x = 2xy^3$; $y(x)$ ограничено при $x \rightarrow +\infty$.

68. Найти ортогональные траектории к линиям следующих семейств: а) $y = Cx^2$; б) $y = Ce^x$; в) $Cx^2 + y^2 = 1$.

В задачах 69* и 70* переменные разделяются, но получаемые интегралы не могут быть выражены через элементарные функции. Однако, исследовав их сходимость, можно дать ответ на поставленные вопросы.

69*. Показать, что каждая интегральная кривая уравнения $y' = \sqrt[3]{\frac{y^2 + 1}{x^4 + 1}}$ имеет две горизонтальные асимптоты.

70*. Исследовать поведение интегральных кривых уравнения $y' = \sqrt{\frac{\ln(1+y)}{\sin x}}$ в окрестности начала координат. Показать, что из каждой точки границы первого координатного угла выходит одна интегральная кривая, проходящая внутри этого угла.

§ 3. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ¹⁾

1. Чтобы решить приведенные ниже геометрические задачи, надо построить чертеж, обозначить искомую кривую через $y = y(x)$ (если задача решается в прямоугольных координатах) и выразить все упоминаемые в задаче величины через x , y и y' . Тогда данное в условии задачи соотношение превращается в дифференциальное уравнение, из которого можно найти искомую функцию $y(x)$.

2. В физических задачах надо прежде всего решить, какую из величин взять за независимое переменное, а какую — за искомую функцию. Затем надо выразить, на сколько изменится искомая функция y , когда независимое переменное x получит приращение Δx , т. е. выразить разность $y(x + \Delta x) - y(x)$ через величины, о которых говорится в задаче. Разделив эту разность на Δx и перейдя к пределу при $\Delta x \rightarrow 0$, получим дифференциальное уравнение, из которого можно найти искомую функцию. В большинстве задач содержатся условия, с помощью которых можно определить значения постоянных, входящих в

¹⁾ Все задачи этого параграфа сводятся к уравнениям с разделяющимися переменными. Задачи, приводящиеся к уравнениям других типов, можно найти в соответствующих параграфах. Необходимые для решения задач значения показательной функции и логарифмов можно брать из таблицы в конце задачника.

общее решение дифференциального уравнения. Иногда дифференциальное уравнение можно составить более простым путем, воспользовавшись физическим смыслом производной (если независимое переменное — время t , то $\frac{dy}{dt}$ есть скорость изменения величины y).

В некоторых задачах при составлении уравнения следует использовать физические законы, сформулированные в тексте перед задачей (или перед группой задач).

Пример. В сосуд, содержащий 10 л воды, непрерывно поступает со скоростью 2 л в минуту раствор, в каждом литре которого содержится 0,3 кг соли. Поступающий в сосуд раствор перемешивается с водой, и смесь вытекает из сосуда с той же скоростью. Сколько соли будет в сосуде через 5 минут?

Решение. Примем за независимое переменное время t , а за искомую функцию $y(t)$ — количество соли в сосуде через t минут после начала опыта. Найдем, на сколько изменится количество соли за промежуток времени от момента t до момента $t + \Delta t$. В одну минуту поступает 2 л раствора, а в Δt минут — $2\Delta t$ литров; в этих $2\Delta t$ литрах содержится $0,3 \cdot 2\Delta t = 0,6\Delta t$ кг соли. С другой стороны, за время Δt из сосуда вытекает $2\Delta t$ литров раствора. В момент t во всем сосуде (10 л) содержится $y(t)$ кг соли, следовательно, в $2\Delta t$ литрах вытекающего раствора содержалось бы $0,2\Delta t \cdot y(t)$ кг соли, если бы за время Δt содержание соли в сосуде не менялось. Но так как оно за это время меняется на величину, бесконечно малую при $\Delta t \rightarrow 0$, то в вытекающих $2\Delta t$ литрах содержится $0,2\Delta t(y(t) + \alpha)$ кг соли, где $\alpha \rightarrow 0$ при $\Delta t \rightarrow 0$.

Итак, в растворе, вытекающем за промежуток времени $(t, t + \Delta t)$, содержится $0,6\Delta t$ кг соли, а в вытекающем — $0,2\Delta t \times (y(t) + \alpha)$ кг. Приращение количества соли за это время $y(t + \Delta t) - y(t)$ равно разности найденных величин, т. е.

$$y(t + \Delta t) - y(t) = 0,6\Delta t - 0,2\Delta t \cdot (y(t) + \alpha).$$

Разделим на Δt и перейдем к пределу при $\Delta t \rightarrow 0$. В левой части получится производная $y'(t)$, а в правой получим $0,6 - 0,2y(t)$, так как $\alpha \rightarrow 0$ при $\Delta t \rightarrow 0$.

Итак, имеем дифференциальное уравнение $y'(t) = 0,6 - 0,2y(t)$. Решая его, получим

$$y(t) = 3 - Ce^{-0,2t}. \quad (1)$$

Так как при $t = 0$ соли в сосуде не было, то $y(0) = 0$. Полагая в (1) $t = 0$, найдем $y(0) = 3 - C$; $0 = 3 - C$; $C = 3$. Подставляя это значение C в (1), получим $y(t) = 3 - 3e^{-0,2t}$. При $t = 5$ в сосуде будет

$$y(5) = 3 - 3e^{-0,2 \cdot 5} = 3 - 3e^{-1} \approx 1,9 \text{ кг соли.}$$

71. Найти кривые, для которых площадь треугольника, образованного касательной, ординатой точки касания и осью абсцисс, есть величина постоянная, равная a^2 .

72. Найти кривые, для которых сумма катетов треугольника, построенного как в предыдущей задаче, есть величина постоянная, равная b .

73. Найти кривые, обладающие следующим свойством: отрезок оси абсцисс, отсекаемый касательной и нормалью, проведенными из произвольной точки кривой, равен $2a$.

74. Найти кривые, у которых точка пересечения любой касательной с осью абсцисс имеет абсциссу, вдвое меньшую абсциссы точки касания.

75. Найти кривые, обладающие следующим свойством: если через любую точку кривой провести прямые, параллельные осям координат, до встречи с этими осями, то площадь полученного прямоугольника делится кривой в отношении $1:2$.

76. Найти кривые, касательные к которым в любой точке образуют равные углы с полярным радиусом и полярной осью.

В задачах 77—79 считать, что втекающий газ (или жидкость) вследствие перемешивания распределяется по всему объему вместилища равномерно.

77. Сосуд объемом в 20 л содержит воздух (80 % азота и 20 % кислорода). В сосуд втекает 0,1 л азота в секунду, который непрерывно перемешивается, и вытекает такое же количество смеси. Через сколько времени в сосуде будет 99 % азота?

78. В баке находится 100 л раствора, содержащего 10 кг соли. В бак непрерывно подается вода (5 л в минуту), которая перемешивается с имеющимся раствором. Смесь вытекает с той же скоростью. Сколько соли в баке останется через час?

79. В воздухе комнаты объемом 200 м^3 содержится 0,15 % углекислого газа (CO_2). Вентиляция подает в минуту 20 м^3 воздуха, содержащего 0,04 % CO_2 . Через какое время количество углекислого газа в воздухе комнаты уменьшится втрое?

В задачах 80—82 принять, что скорость остывания (или нагревания) тела пропорциональна разности температур тела и окружающей среды.

80. Тело охладилось за 10 мин от 100°C до 60°C . Температура окружающего воздуха поддерживается равной 20°C . Когда тело остынет до 25°C .

81. В сосуд, содержащий 1 кг воды при температуре 20°C , опущен алюминиевый предмет с массой 0,5 кг, удельной теплоемкостью 0,2 и температурой

75 °С. Через минуту вода нагрелась на 2 °С. Когда температура воды и предмета будут отличаться одна от другой на 1 °С? Потерями тепла на нагревание сосуда и прочими пренебречь.

82. Кусок металла с температурой a градусов помещен в печь, температура которой в течение часа равномерно повышается от a градусов до b градусов. При разности температур печи и металла в T градусов металл нагревается со скоростью kT градусов в минуту. Найти температуру металла через час.

83. Лодка замедляет свое движение под действием сопротивления воды, которое пропорционально скорости лодки. Начальная скорость лодки 1,5 м/с, через 4 с скорость ее 1 м/с. Когда скорость уменьшится до 1 см/с? Какой путь может пройти лодка до остановки?

В задачах 84—86 использовать закон радиоактивного распада: количество радиоактивного вещества, распадающегося за единицу времени, пропорционально количеству этого вещества, имеющемуся в рассматриваемый момент.

84. За 30 дней распалось 50 % первоначального количества радиоактивного вещества. Через сколько времени останется 1 % от первоначального количества?

85. Согласно опытам, в течение года из каждого грамма радия распадается 0,44 мг. Через сколько лет распадется половина имеющегося количества радия?

86. В исследованном куске горной породы содержится 100 мг урана и 14 мг уранового свинца. Известно, что уран распадается наполовину за $4,5 \cdot 10^9$ лет и что при полном распаде 238 г урана образуется 206 г уранового свинца. Определить возраст горной породы. Считать, что в момент образования горная порода не содержала свинца, и пренебречь наличием промежуточных радиоактивных продуктов между ураном и свинцом (так как они распадаются намного быстрее урана).

87. Количество света, поглощаемое слоем воды малой толщины, пропорционально количеству падающего на него света и толщине слоя. Слой воды толщиной 35 см поглощает половину падающего на него света. Какую часть света поглотит слой толщиной в 2 м?

Для составления дифференциального уравнения в задачах 88—90 за неизвестную функцию удобнее взять скорость. Ускорение силы тяжести считать равным 10 м/с^2 .

88. Парашютист прыгнул с высоты $1,5 \text{ км}$, а раскрыл парашют на высоте $0,5 \text{ км}$. Сколько времени он падал до раскрытия парашюта? Известно, что предельная скорость падения человека в воздухе нормальной плотности составляет 50 м/с . Изменением плотности с высотой пренебречь. Сопротивление воздуха пропорционально квадрату скорости.

89. Футбольный мяч весом $0,4 \text{ кг}$ ¹⁾ брошен вверх со скоростью 20 м/с . Сопротивление воздуха пропорционально квадрату скорости и равно $0,48 \text{ Г}$ при скорости 1 м/с . Вычислить время подъема мяча и наибольшую высоту подъема. Как изменятся эти результаты, если пренебречь сопротивлением воздуха?

90. Вычислить время падения мяча с высоты $16,3 \text{ м}$ без начальной скорости с учетом сопротивления воздуха (см. задачу 89). Найти скорость в конце падения.

В задачах 91—95 принять, что жидкость из сосуда вытекает со скоростью, равной $0,6\sqrt{2gh}$, где $g = 10 \text{ м/с}^2$ — ускорение силы тяжести, h — высота уровня воды над отверстием.

91. За какое время вытечет вся вода из цилиндрического бака с диаметром $2R = 1,8 \text{ м}$ и высотой $H = 2,45 \text{ м}$ через отверстие в дне диаметром $2r = 6 \text{ см}$? Ось цилиндра вертикальна.

92. Решить предыдущую задачу в предположении, что ось цилиндра расположена горизонтально, а отверстие находится в самой нижней части цилиндра.

93. Цилиндрический бак поставлен вертикально и имеет отверстие в дне. Половина воды из полного бака вытекает за 5 минут. За какое время вытечет вся вода?

94. Воронка имеет форму конуса радиуса $R = 6 \text{ см}$ и высоты $H = 10 \text{ см}$, обращенного вершиной вниз. За какое время вытечет вся вода из воронки через круглое отверстие диаметра $0,5 \text{ см}$, сделанное в вершине конуса?

95. В прямоугольный бак размером $60 \text{ см} \times 75 \text{ см}$ и высотой 80 см поступает $1,8 \text{ л}$ воды в секунду. В дне

¹⁾ Принять $1 \text{ кг} = 10 \text{ Н}$.

имеется отверстие площадью $2,5 \text{ см}^2$. За какое время наполнится бак? Сравнить результат с временем наполнения такого бака без отверстия в дне.

96. Резиновый шнур длиной в 1 м под действием силы f удлиняется на kf метров. На сколько удлинится такой же шнур длины l и веса P под действием своего веса, если его подвесить за один конец?

97. Найти атмосферное давление на высоте h , если на поверхности земли давление равно 1 кг/см^2 и плотность воздуха $0,0012 \text{ г/см}^3$. Использовать закон Бойля — Мариотта, в силу которого плотность пропорциональна давлению (т. е. пренебречь изменением температуры воздуха с высотой).

98. Для остановки речных судов у пристани с них бросают канат, который наматывают на столб, стоящий на пристани. Какая сила будет тормозить судно, если канат делает три витка вокруг столба, коэффициент трения каната о столб равен $1/3$, и рабочий на пристани тянет за свободный конец каната с силой 10 кг ?

99. В закрытом помещении объемом $v \text{ м}^3$ находится открытый сосуд с водой. Скорость испарения воды пропорциональна разности между количеством q_1 водяного пара, насыщающего 1 м^3 воздуха при данной температуре, и количеством q водяного пара, имеющимся в 1 м^3 воздуха в рассматриваемый момент (считаем, что температура воздуха и воды, а также величина площади, с которой происходит испарение, остаются неизменными). В начальный момент в сосуде было m_0 грамм воды, а в 1 м^3 воздуха q_0 грамм пара. Сколько воды останется в сосуде через промежуток времени t ?

100. Масса ракеты с полным запасом топлива равна M , без топлива m , скорость истечения продуктов горения из ракеты равна s , начальная скорость ракеты равна нулю. Найти скорость ракеты после сгорания топлива, пренебрегая силой тяжести и сопротивлением воздуха (формула Циолковского).

§ 4. ОДНОРОДНЫЕ УРАВНЕНИЯ

1. Однородные уравнения могут быть записаны в виде $y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$, а также в виде $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$, где $M(x, y)$ и $N(x, y)$ — однородные функции одной и той же сте-

пени¹⁾. Чтобы решить однородное уравнение, можно сделать замену $y = tx$, после чего получается уравнение с разделяющимися переменными.

Пример. Решить уравнение $x dy = (x + y) dx$.

Это уравнение — однородное. Полагаем $y = tx$. Тогда $dy = t dx + x dt$. Подставляя в уравнение, получим

$$x(x dt + t dx) = (x + tx) dx; \quad x dt = dx.$$

Решаем полученное уравнение с разделяющимися переменными

$$dt = \frac{dx}{x}; \quad t = \ln |x| + C.$$

Возвращаясь к старому переменному y , получим $y = x(\ln |x| + C)$. Кроме того, имеется решение $x = 0$, которое было потеряно при делении на x .

2. Уравнение вида $y' = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{ax + by + c}\right)$ приводится к

однородному с помощью переноса начала координат в точку пересечения прямых $ax + by + c = 0$ и $a_1x + b_1y + c_1 = 0$. Если же эти прямые не пересекаются, то $a_1x + b_1y = k(ax + by)$; следовательно, уравнение имеет вид $y' = F(ax + by)$ и приводится к уравнению с разделяющимися переменными заменой $z = ax + by$ (или $z = ax + by + c$), см. § 2, п. 2.

3. Некоторые уравнения можно привести к однородным заменой $y = z^m$. Число m обычно заранее неизвестно. Чтобы его найти, надо в уравнении сделать замену $y = z^m$. Требуя, чтобы уравнение было однородным, найдем число m , если это возможно. Если же этого сделать нельзя, то уравнение не приводится к однородному этим способом.

Пример. Дано уравнение $2x^4yy' + y^4 = 4x^6$. После замены $y = z^m$ уравнение примет вид $2mx^4z^{2m-1}z' + z^{4m} = 4x^6$. Это уравнение будет однородным в том случае, когда степени всех его членов равны между собой, т. е. $4 + (2m - 1) = 4m = 6$. Эти равенства удовлетворяются одновременно, если $m = 3/2$. Следовательно, уравнение можно привести к однородному заменой $y = z^{3/2}$.

Решить уравнения 101—129.

101. $(x + 2y) dx - x dy = 0$.

102. $(x - y) dx + (x + y) dy = 0$.

103. $(y^2 - 2xy) dx + x^2 dy = 0$.

104. $2x^3y' = y(2x^2 - y^2)$. 105. $y^2 + x^2y' = xy y'$.

106. $(x^2 + y^2)y' = 2xy$. 107. $xy' - y = x \operatorname{tg} \frac{y}{x}$.

108. $xy' = y - xe^{y/x}$.

109. $xy' - y = (x + y) \ln \frac{x + y}{x}$.

110. $xy' = y \cos \ln \frac{y}{x}$. 111. $(y + \sqrt{xy}) dx = x dy$.

¹⁾ Функция $M(x, y)$ называется однородной функцией степени n , если для всех $k > 0$ имеем $M(kx, ky) = k^n M(x, y)$.

$$112. xy' = \sqrt{x^2 - y^2} + y.$$

$$113. (2x - 4y + 6)dx + (x + y - 3)dy = 0.$$

$$114. (2x + y + 1)dx - (4x + 2y - 3)dy = 0.$$

$$115. x - y - 1 + (y - x + 2)y' = 0.$$

$$116. (x + 4y)y' = 2x + 3y - 5.$$

$$117. (y + 2)dx = (2x + y - 4)dy.$$

$$118. y' = 2 \left(\frac{y + 2}{x + y - 1} \right)^2.$$

$$119. (y' + 1) \ln \frac{y + x}{x + 3} = \frac{y + x}{x + 3}.$$

$$120. y' = \frac{y + 2}{x + 1} + \operatorname{tg} \frac{y - 2x}{x + 1}.$$

$$121. x^3(y' - x) = y^2. \quad 122. 2x^2y' = y^3 + xy.$$

$$123. 2x dy + (x^2y^4 + 1)y dx = 0.$$

$$124. y dx + x(2xy + 1)dy = 0.$$

$$125. 2y' + x = 4\sqrt{y}. \quad 126. y' = y^2 - \frac{2}{x^2}.$$

$$127. 2xy' + y = y^2\sqrt{x - x^2y^2}.$$

$$128. \frac{2}{3}xyy' = \sqrt{x^6 - y^4} + y^2.$$

$$129. 2y + (x^2y + 1)xy' = 0.$$

130. Найти траектории, пересекающие кривые данного семейства под углом в 45° , причем этот угол от касательной к кривой до касательной к траектории отсчитывается в отрицательном направлении.

$$a) y = x \ln Cx; \quad б) (x - 3y)^4 = Cxy^6.$$

131. Найти кривую, у которой точка пересечения любой касательной с осью абсцисс одинаково удалена от точки касания и от начала координат.

132. Найти кривую, у которой расстояние любой касательной от начала координат равно абсциссе точки касания.

133. При каких α и β уравнение $y' = ax^\alpha + by^\beta$ приводится к однородному с помощью замены

$$y = z^m?$$

134*. Пусть функция $f(k)$ непрерывна и $y = k_0x$ — решение уравнения $y' = f(y/x)$. Показать, что:

1) если $f'(k_0) < 1$, то ни одно из других решений не касается прямой $y = k_0x$ в начале координат;

2) если $f'(k_0) > 1$, то этой прямой касается бесконечно много решений.

135. Начертить приближенно интегральные кривые следующих уравнений (не решая уравнений):

$$\text{а) } y' = \frac{y(2y-x)}{x^2}; \quad \text{б) } y' = \frac{2y^2-x^2}{xy};$$

$$\text{в) } y' = \frac{2y^3-x^2y}{2x^2y-x^3}; \quad \text{г*) } xy' = y + \sqrt{y^2 + \frac{y^3}{x}}.$$

У к а з а н и е. Тангенс угла между лучом $y = kx$ и пересекающей его интегральной кривой уравнения $y' = f(y/x)$ равен $(f(k) - k)/(1 + kf(k))$ (почему?). Для приближенного построения интегральных кривых надо исследовать знак этой дроби в зависимости от k .

§ 5. ЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

1. Уравнение

$$y' + a(x)y = b(x) \quad (1)$$

называется линейным. Чтобы его решить, надо сначала решить уравнение

$$y' + a(x)y = 0 \quad (2)$$

(это делается путем разделения переменных, см. § 2) и в общем решении последнего заменить произвольную постоянную C на неизвестную функцию $C(x)$. Затем выражение, полученное для y , подставить в уравнение (1) и найти функцию $C(x)$.

2. Некоторые уравнения становятся линейными, если поменять ролями искомую функцию и независимое переменное. Например, уравнение $y = (2x + y^3)y'$, в котором y является функцией от x , — нелинейное. Запишем его в дифференциалах: $y dx - (2x + y^3) dy = 0$. Так как в это уравнение x и dx входят линейно, то уравнение будет линейным, если x считать искомой функцией, а y — независимым переменным. Это уравнение может быть записано в виде $\frac{dx}{dy} - \frac{2}{y}x = y^2$ и решается аналогично уравнению (1).

3. Чтобы решить уравнение Бернулли, т. е. уравнение

$$y' + a(x)y = b(x)y^n \quad (n \neq 1),$$

надо обе его части разделить на y^n и сделать замену $1/y^{n-1} = z$. После замены получается линейное уравнение, которое можно решить изложенным выше способом. (Пример см. в [1], гл. I, § 4, п. 2, пример 10.)

4. Уравнение Риккати, т. е. $y' + a(x)y + b(x)y^2 = c(x)$, в общем случае не решается в квадратурах. Если же известно одно частное решение $y_1(x)$, то заменой $y = y_1(x) + z$ уравнение Риккати сводится к уравнению Бернулли и таким образом может быть решено в квадратурах.

Иногда частное решение удается подобрать, исходя из вида свободного члена уравнения (члена, не содержащего y). Например, для уравнения $y' + y^2 = x^2 - 2x$ в левой части будут члены, подобные членам правой части, если взять $y = ax + b$. Подставляя в уравнение и приравнивая коэффициенты при по-

добных членах, найдем a и b (если частное решение указанного вида существует, что вовсе не всегда бывает). Другой пример: для уравнения $y' + 2y^2 = 6/x^2$ те же рассуждения побуждают нас искать частное решение в виде $y = a/x$. Подставляя $y = a/x$ в уравнение, найдем постоянную a .

Решить уравнения 136—160.

136. $xy' - 2y = 2x^4$. 137. $(2x + 1)y' = 4x + 2y$.
 138. $y' + y \operatorname{tg} x = \sec x$. 139. $(xy + e^x)dx - x dy = 0$,
 140. $x^2y' + xy + 1 = 0$. 141. $y = x(y' - x \cos x)$.
 142. $2x(x^2 + y)dx = dy$. 143. $(xy' - 1) \ln x = 2y$.
 144. $xy' + (x + 1)y = 3x^2e^{-x}$.
 145. $(x + y^2)dy = y dx$. 146. $(2e^y - x)y' = 1$.
 147. $(\sin^2 y + x \operatorname{ctg} y)y' = 1$.
 148. $(2x + y)dy = y dx + 4 \ln y dy$.
 149. $y' = \frac{y}{3x - y^2}$. 150. $(1 - 2xy)y' = y(y - 1)$.
 151. $y' + 2y = y^2e^x$. 152. $(x + 1)(y' + y^2) = -y$.
 153. $y' = y^4 \cos x + y \operatorname{tg} x$. 154. $xy^2y' = x^2 + y^3$.
 155. $xy dy = (y^2 + x) dx$. 156. $xy' - 2x^2\sqrt{y} = 4y$.
 157. $xy' + 2y + x^5y^3e^x = 0$. 158. $2y' - \frac{x}{y} = \frac{xy}{x^2 - 1}$.
 159. $y' x^3 \sin y = xy' - 2y$. 160. $(2x^2 y \ln y - x)y' = y$.

С помощью замены переменных или дифференцирования привести уравнения 161—166 к линейным и решить их.

161. $x dx = (x^2 - 2y + 1) dy$. 162. $(x + 1)(yy' - 1) = y^2$.
 163. $x(e^y - y') = 2$.
 164. $(x^2 - 1)y' \sin y + 2x \cos y = 2x - 2x^3$.
 165. $y(x) = \int_0^x y(t) dt + x + 1$.
 166. $\int_0^{\infty} (x - t)y(t) dt = 2x + \int_0^{\infty} y(t) dt$.

В задачах 167—171, найдя путем подбора частное решение, привести данные уравнения Риккати к уравнениям Бернулли и решить их.

167. $x^2y' + xy + x^2y^2 = 4$. 168. $3y' + y^2 + \frac{2}{x^2} = 0$.
 169. $xy' - (2x + 1)y + y^2 = -x^2$.
 170. $y' - 2xy + y^2 = 5 - x^2$.
 171. $y' + 2ye^x - y^2 = e^{2x} + e^x$.
 172. Найти траектории, ортогональные к линиям семейства $y^2 = Ce^x + x + 1$.

173. Найти кривые, у которых площадь трапеции, ограниченной осями координат, касательной и ординатой точки касания, есть величина постоянная, равная $3a^2$.

174. Найти кривые, у которых площадь треугольника, ограниченного касательной, осью абсцисс и отрезком от начала координат до точки касания, есть величина постоянная, равная a^2 .

175. В баке находится 100 л раствора, содержащего 10 кг соли. В бак втекает 5 л воды в минуту, а смесь с той же скоростью переливается в другой 100-литровый бак, первоначально наполненный чистой водой. Избыток жидкости из него выливается. Когда количество соли во втором баке будет наибольшим? Чему оно равно?

176. За время Δt (где Δt очень мало и выражено в долях года) из каждого грамма радия распадается $0,00044 \Delta t$ грамма и образуется $0,00043 \Delta t$ грамма радона. Из каждого грамма радона за время Δt распадается $70 \Delta t$ грамма. В начале опыта имелось некоторое количество x_0 чистого радия. Когда количество образовавшегося и еще не распавшегося радона будет наибольшим?

177. Даны два различных решения y_1 и y_2 линейного уравнения первого порядка. Выразить через них общее решение этого уравнения.

178. Найти то решение уравнения

$$y' \sin 2x = 2(y + \cos x),$$

которое остается ограниченным при $x \rightarrow \pi/2$.

179*. Пусть в уравнении $xy' + ay = f(x)$ имеем $a = \text{const} > 0$, $f(x) \rightarrow b$ при $x \rightarrow 0$. Показать, что только одно решение уравнения остается ограниченным при $x \rightarrow 0$, и найти предел этого решения при $x \rightarrow 0$.

180*. Пусть в уравнении предыдущей задачи $a = \text{const} < 0$, $f(x) \rightarrow b$ при $x \rightarrow 0$. Показать, что все решения этого уравнения имеют один и тот же конечный предел при $x \rightarrow 0$. Найти этот предел.

В задачах 181—183 искомое решение выражается через интеграл с бесконечным пределом.

181*. Показать, что уравнение $\frac{dx}{dt} + x = f(t)$, где $|f(t)| \leq M$ при $-\infty < t < +\infty$, имеет одно решение, ограниченное при $-\infty < t < +\infty$. Найти это решение.

Показать, что найденное решение периодическое, если функция $f(t)$ периодическая.

182*. Показать, что только одно решение уравнения $xy' - (2x^2 + 1)y = x^2$ стремится к конечному пределу при $x \rightarrow +\infty$, и найти этот предел. Выразить это решение через интеграл.

183*. Найти периодическое решение уравнения

$$y' = 2y \cos^2 x - \sin x.$$

184*. Пусть в уравнении $\frac{dx}{dt} + a(t)x = f(t)$, $a(t) \geq c > 0$, $f(t) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow +\infty$. Доказать, что каждое решение этого уравнения стремится к нулю при $t \rightarrow +\infty$.

185*. Пусть в уравнении предыдущей задачи имеем $a(t) \geq c > 0$ и пусть $x_0(t)$ — решение с начальным условием $x_0(0) = b$. Показать, что для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta > 0$, что если изменить функцию $f(t)$ и число b меньше чем на δ (т. е. заменить их на такую функцию $f_1(t)$ и число b_1 , что $|f_1(t) - f(t)| < \delta$, $|b_1 - b| < \delta$), то решение $x_0(t)$ изменится при $t \geq 0$ меньше чем на ε . Это свойство решения называется устойчивостью по постоянно действующим возмущениям.

§ 6. УРАВНЕНИЯ В ПОЛНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛАХ. ИНТЕГРИРУЮЩИЙ МНОЖИТЕЛЬ

1. Уравнение

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \quad (1)$$

называется уравнением в полных дифференциалах, если его левая часть является полным дифференциалом некоторой функции $F(x, y)$. Это имеет место, если $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$. Чтобы решить уравнение (1), надо найти функцию $F(x, y)$, от которой полный дифференциал $dF(x, y) = F'_x dx + F'_y dy$ равен левой части уравнения (1). Тогда общее решение уравнения (1) можно написать в виде $F(x, y) = C$, где C — произвольная постоянная.

Пример. Решить уравнение

$$(2x + 3x^2y)dx + (x^3 - 3y^2)dy = 0. \quad (2)$$

Так как $\frac{\partial}{\partial y}(2x + 3x^2y) = 3x^2$, $\frac{\partial}{\partial x}(x^3 - 3y^2) = 3x^2$, то уравнение (2) является уравнением в полных дифференциалах. Найдем функцию $F(x, y)$, полный дифференциал которой $dF = F'_x dx + F'_y dy$ был бы равен левой части уравнения (2),

т. е. такую функцию F , что

$$F'_x = 2x + 3x^2y, \quad F'_y = x^3 - 3y^2. \quad (3)$$

Интегрируем по x первое из уравнений (3), считая y постоянным; при этом вместо постоянной интегрирования надо поставить $\varphi(y)$ — неизвестную функцию от y

$$F = \int (2x + 3x^2y) dx = x^2 + x^3y + \varphi(y).$$

Подставляя это выражение для F во второе из уравнений (3), найдем $\varphi(y)$:

$$(x^2 + x^3y + \varphi(y))'_y = x^3 - 3y^2;$$

$$\varphi'(y) = -3y^2; \quad \varphi(y) = -y^3 + \text{const.}$$

Следовательно, можно взять $F(x, y) = x^2 + x^3y - y^3$, и общее решение уравнения (2) будет иметь вид

$$x^2 + x^3y - y^3 = C.$$

2. Интегрирующим множителем для уравнения

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \quad (4)$$

называется такая функция $m(x, y) \neq 0$, после умножения на которую уравнение (4) превращается в уравнение в полных дифференциалах. Если функции M и N в уравнении (4) имеют непрерывные частные производные и не обращаются в нуль одновременно, то интегрирующий множитель существует. Однако нет общего метода для его отыскания (когда общее решение уравнения (4) неизвестно).

В некоторых случаях интегрирующий множитель можно найти с помощью приемов, изложенных в [1], гл. II, § 3, п. 3 или в [4], гл. I, § 5. Для решения некоторых уравнений можно применять метод выделения полных дифференциалов, используя известные формулы:

$$\begin{aligned} d(xy) &= y dx + x dy, & d(y^2) &= 2y dy, \\ d\left(\frac{x}{y}\right) &= \frac{y dx - x dy}{y^2}, & d(\ln y) &= \frac{dy}{y} \text{ и т. п.} \end{aligned}$$

Пример. Решить уравнение

$$y dx - (4x^2y + x) dy = 0. \quad (5)$$

Сначала выделяем группу членов, представляющую собой полный дифференциал. Так как $y dx - x dy = -x^2 d(y/x)$, то, деля уравнение (5) на $-x^2$, имеем

$$d\left(\frac{y}{x}\right) + 4y dy = 0, \quad d\left(\frac{y}{x}\right) + d(2y^2) = 0.$$

Это — уравнение в полных дифференциалах. Интегрируя непосредственно (приводить к виду (1) не нужно), получаем

решение

$$\frac{y}{x} + 2y^2 = C.$$

Кроме того, при делении на $-x^2$ было потеряно решение $x = 0$.

З а м е ч а н и е. Так как после деления уравнения (5) на $-x^2$, т. е. умножения на $-1/x^2$, получилось уравнение в полных дифференциалах, то интегрирующий множитель для уравнения (5) равен $-1/x^2$.

3. Если в уравнении (4) можно выделить полный дифференциал некоторой функции $\varphi(x, y)$, то иногда уравнение упрощается, если от переменных (x, y) перейти к переменным (x, z) или (y, z) , где $z = \varphi(x, y)$.

П р и м е р ы. 1) Решить уравнение $y dx - (x^3y + x) dy = 0$.

Выделив полный дифференциал как в предыдущем примере, получим

$$d\left(\frac{y}{x}\right) + xy dy = 0.$$

Перейдя к переменным $z = y/x$ и y , получим уравнение

$$dz + \frac{y^2}{z} dy = 0,$$

которое легко решается.

2) Решить уравнение $(xy + y^4) dx + (x^2 - xy^3) dy = 0$.

Сгруппируем члены так, чтобы выделить полные дифференциалы.

$$x(y dx + x dy) + y^3(y dx - x dy) = 0,$$

$$xd(xy) + y^5 d\left(\frac{x}{y}\right) = 0.$$

Разделив на x и сделав замену $xy = u$, $x/y = v$, получим уравнение $du + \frac{u^2}{v^3} dv = 0$, которое легко решается.

В задачах 186—194 проверить, что данные уравнения являются уравнениями в полных дифференциалах, и решить их.

186. $2xy dx + (x^2 - y^2) dy = 0$.

187. $(2 - 9xy^2)x dx + (4y^2 - 6x^3)y dy = 0$.

188. $e^{-y} dx - (2y + xe^{-y}) dy = 0$.

189. $\frac{y}{x} dx + (y^3 + \ln x) dy = 0$.

190. $\frac{3x^2 + y^2}{y^2} dx - \frac{2x^3 + 5y}{y^3} dy = 0$.

191. $2x(1 + \sqrt{x^2 - y}) dx - \sqrt{x^2 - y} dy = 0$.

$$192. (1 + y^2 \sin 2x) dx - 2y \cos^2 x dy = 0.$$

$$193. 3x^2(1 + \ln y) dx = \left(2y - \frac{x^3}{y}\right) dy.$$

$$194. \left(\frac{x}{\sin y} + 2\right) dx + \frac{(x^2 + 1) \cos y}{\cos 2y - 1} dy = 0.$$

Решить уравнения 195—220, найдя каким-либо способом интегрирующий множитель или сделав замену переменных.

$$195. (x^2 + y^2 + x) dx + y dy = 0.$$

$$196. (x^2 + y^2 + y) dx - x dy = 0.$$

$$197. y dy = (x dy + y dx) \sqrt{1 + y^2}.$$

$$198. xy^2(xy' + y) = 1. \quad 199. y^2 dx - (xy + x^3) dy = 0.$$

$$200. \left(y - \frac{1}{x}\right) dx + \frac{dy}{y} = 0.$$

$$201. (x^2 + 3 \ln y) y dx = x dy.$$

$$202. y^2 dx + (xy + \operatorname{tg} xy) dy = 0.$$

$$203. y(x + y) dx + (xy + 1) dy = 0.$$

$$204. y(y^2 + 1) dx + x(y^2 - x + 1) dy = 0.$$

$$205. (x^2 + 2x + y) dx = (x - 3x^2y) dy.$$

$$206. y dx - x dy = 2x^3 \operatorname{tg} \frac{y}{x} dx.$$

$$207. y^2 dx + (e^x - y) dy = 0.$$

$$208. xy dx = (y^3 + x^2y + x^2) dy.$$

$$209. x^2y(y dx + x dy) = 2y dx + x dy.$$

$$210. (x^2 - y^2 + y) dx + x(2y - 1) dy = 0.$$

$$211. (2x^2y^2 + y) dx + (x^3y - x) dy = 0.$$

$$212. (2x^2y^3 - 1) y dx + (4x^2y^3 - 1) x dy = 0.$$

$$213. y(x + y^2) dx + x^2(y - 1) dy = 0.$$

$$214. (x^2 - \sin^2 y) dx + x \sin 2y dy = 0.$$

$$215. x(\ln y + 2 \ln x - 1) dy = 2y dx.$$

$$216. (x^2 + 1)(2x dx + \cos y dy) = 2x \sin y dx.$$

$$217. (2x^3y^2 - y) dx + (2x^2y^3 - x) dy = 0.$$

$$218. x^2y^3 + y + (x^3y^2 - x)y' = 0.$$

$$219. (x^2 - y) dx + x(y + 1) dy = 0.$$

$$220. y^2(y dx - 2x dy) = x^3(x dy - 2y dx).$$

§ 7. СУЩЕСТВОВАНИЕ И ЕДИНСТВЕННОСТЬ РЕШЕНИЯ

1. Теорема существования и единственности решения уравнения

$$y' = f(x, y) \quad (1)$$

с начальным условием $y(x_0) = y_0$.

Уравнение (4) можно свести к системе вида (2), если ввести новые неизвестные функции по формулам $y = y_1$, $y' = y_2$, $y'' = y_3$, ..., $y^{(n-1)} = y_n$. Тогда уравнение (4) сводится к системе

$$y_1' = y_2, \quad y_2' = y_3, \quad \dots, \quad y_{n-1}' = y_n, \quad y_n' = f(x, y_2, \dots, y_n),$$

которая является частным случаем системы (2) и к которой применимы все утверждения п. 2.

4. Продолжение решений. Во многих случаях решение уравнения (1) или системы (2) существует не только на отрезке, указанном в п. 1, но и на большем отрезке.

Если уравнение (1) или система (2) удовлетворяет условиям теоремы существования в замкнутой ограниченной области, то всякое решение можно продолжить до выхода на границу этой области.

Если правая часть уравнения (1) или системы (3) в области $\alpha < x < \beta$, $|y| < \infty$ (α и β могут быть конечными или бесконечными) непрерывна и удовлетворяет неравенству

$$|f(x, y)| \leq a(x)|y| + b(x),$$

в функции $a(x)$ и $b(x)$ непрерывны, то всякое решение можно продолжить на весь интервал $\alpha < x < \beta$.

221. Построить последовательные приближения y_0 , y_1 , y_2 к решению данного уравнения с данными начальными условиями:

- а) $y' = x - y^2$, $y(0) = 0$.
- б) $y' = y^2 + 3x^2 - 1$, $y(1) = 1$.
- в) $y' = y + e^{y-1}$, $y(0) = 1$.
- г) $y' = 1 + x \sin y$, $y(\pi) = 2\pi$.

222. Построить по два последовательных приближения (не считая исходного) к решениям следующих уравнений и систем:

- а) $y' = 2x + z$, $z' = y$; $y(1) = 1$, $z(1) = 0$.
- б) $\frac{dx}{dt} = y$, $\frac{dy}{dt} = x^2$; $x(0) = 1$, $y(0) = 2$.
- в) $y'' + y'^2 - 2y = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.
- г) $\frac{d^2x}{dt^2} = 3tx$; $x(1) = 2$; $\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=1} = -1$.

223. Указать какой-нибудь отрезок, на котором существует решение с данными начальными условиями:

- а) $y' = x + y^3$, $y(0) = 0$.
- б) $y' = 2y^2 - x$, $y(1) = 1$.
- в) $\frac{dx}{dt} = t + e^x$, $x(1) = 0$.
- г) $\frac{dx}{dt} = y^2$, $\frac{dy}{dt} = x^2$, $x(0) = 1$, $y(0) = 2$.

224*. Для уравнения $y' = x - y^2$ с начальным условием $y(0) = 0$ построить третье приближение к решению и оценить его ошибку при $0 \leq x \leq 0,5$.

Указание. Оценить остаток ряда, сходимость которого доказывается в теореме существования решения, см. [1], гл. II, § 1; [2], § 15.

225. Пользуясь каким-либо достаточным условием единственности, выделить области на плоскости x, y , в которых через каждую точку проходит единственное решение уравнения

$$\begin{array}{ll} \text{а) } y' = 2xy + y^2, & \text{б) } y' = 2 + \sqrt[3]{y - 2x}, \\ \text{в) } (x - 2)y' = \sqrt{y} - x, & \text{г) } y' = 1 + \operatorname{tg} y, \\ \text{д) } (y - x)y' = y \ln x, & \text{е) } xy' = y + \sqrt{y^2 - x^2}. \end{array}$$

226. При каких неотрицательных a нарушается единственность решений уравнения $y' = |y|^a$ и в каких точках?

227. С помощью необходимого и достаточного условия единственности для уравнений вида $y' = f(y)$ (см. [1], гл. III, § 4, п. 1, мелкий шрифт или [2], § 4) исследовать написанные ниже уравнения. Выделив области, где $f(y)$ сохраняет знак, приблизительно изобразить на чертеже решения. Для уравнений д) и е) правые части при $y = 0$ доопределяются по непрерывности.

$$\begin{array}{ll} \text{а) } y' = \sqrt[3]{y^2}, & \text{б) } y' = y\sqrt[3]{y + 1}, \\ \text{в) } y' = (y - 1)\sqrt[3]{y^3}, & \text{г) } y' = \arccos y, \\ \text{д) } y' = y \ln y, & \text{е) } y' = y \ln^2 y. \end{array}$$

228. При каких начальных условиях существует единственное решение следующих уравнений и систем?

$$\begin{array}{ll} \text{а) } y'' = \operatorname{tg} y + \sqrt[3]{x}, & \text{б) } (x + 1)y'' = y + \sqrt{y}, \\ \text{в) } (x - y)y'y''' = \ln xy, & \text{г) } y'' - yy''' = \sqrt[5]{y' - x}, \\ \text{д) } \frac{dx}{dt} = y^2 + \sqrt[3]{t}, \quad \frac{dy}{dt} = \sqrt[3]{x}, \\ \text{е) } \frac{dx}{dt} = y^3 + \ln(t + 1), \quad x \frac{dy}{dt} = \sqrt[3]{y - t}. \end{array}$$

229. Могут ли графики двух решений данного уравнения на плоскости x, y пересекаться в некоторой точке (x_0, y_0)

а) для уравнения $y' = x + y^2$? б) для уравнения $y'' = x + y^2$?

230. Могут ли графики двух решений данного уравнения на плоскости x, y касаться друг друга в некоторой точке (x_0, y_0)

а) для уравнения $y' = x + y^2$? б) для уравнения $y'' = x + y^2$?

в) для уравнения $y''' = x + y^2$?

231. Сколько существует решений уравнения $y^{(n)} = x + y^2$, удовлетворяющих одновременно двум условиям: $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$? Рассмотреть отдельно случаи $n = 1, 2, 3$.

232. Сколько решений уравнения $y^{(n)} = f(x, y)$ (f и f'_y непрерывны на всей плоскости x, y) проходит через точку (x_0, y_0) по заданному направлению, образующему угол α с осью Ox ? Рассмотреть случаи $n = 1, n = 2$ и $n \geq 3$.

233. При каких n уравнение $y^{(n)} = f(x, y)$ (f и f'_y непрерывны) может иметь среди своих решений две функции: $y_1 = x$, $y_2 = x + x^4$?

234. При каких n уравнение $y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ с непрерывно дифференцируемой функцией f может иметь среди своих решений две функции: $y_1 = x$, $y_2 = \sin x$?

235*. Пусть $f(x, y)$ непрерывна по x, y и при каждом x не возрастает при возрастании y . Доказать, что если два решения уравнения $y' = f(x, y)$ удовлетворяют одному и тому же начальному условию $y(x_0) = y_0$, то они совпадают при $x \geq x_0$.

236. Сколько производных имеют решения следующих уравнений и систем в окрестности начала координат? (Теорему о гладкости решений см. [2], § 19 или [4], § 6, теорема 1.4).

- а) $y' = x + y^{7/3}$, б) $y' = x|x| - y^2$,
в) $y'' = |x^3| + y^{5/3}$, г) $y''' = y - x\sqrt[3]{x}$,
д) $\frac{dx}{dt} = t + y$, $\frac{dy}{dt} = x + t^2|t|$,
е) $\frac{dx}{dt} = y^2 + \sqrt[3]{t^4}$, $\frac{dy}{dt} = \sqrt[3]{x}$.

237*. При каких a каждое решение продолжается на бесконечный интервал $-\infty < x < +\infty$

а) для уравнения $y' = |y|^a$? б) для уравнения $y' = (y^2 + e^x)^a$?

в) для уравнения $y' = |y|^{a-1} + x|\sqrt[3]{y}|^{2a}$?

г) для системы $y' = (y^2 + z^2 + 2)^{-a}$, $z' = y(1 + z^2)^a$?

238*. Для следующих уравнений доказать, что решение с произвольным начальным условием $y(x_0) =$

$= y_0$ существует при $x_0 \leq x < +\infty$;

а) $y' = x^3 - y^3$, б) $y' = xy + e^{-y}$.

239*. Пусть на всей плоскости x, y функции $f(x, y)$ и $f'_y(x, y)$ непрерывны и $f'_y(x, y) \leq k(x)$, функция $k(x)$ непрерывна. Доказать, что решение уравнения $y' = f(x, y)$ с любым начальным условием $y(x_0) = y_0$ существует при $x_0 \leq x < +\infty$.

240*. Дана система в векторной записи $y' = f(x, y)$, удовлетворяющая условиям теоремы существования в окрестности каждой точки (x, y) . Пусть в области $|y| > b$ при всех x

$$y \cdot f(x, y) \leq k(x) |y|^2,$$

где $y \cdot f$ — скалярное произведение, а функция $k(x)$ непрерывна. Доказать, что решение с любым начальным условием $y(x_0) = y_0$ существует при $x_0 \leq x < +\infty$.

§ 8. УРАВНЕНИЯ, НЕ РАЗРЕШЕННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОИЗВОДНОЙ

1. Уравнения вида $F(x, y, y') = 0$ можно решать следующими методами.

а) Разрешить уравнение относительно y' , т. е. из уравнения $F(x, y, y') = 0$ выразить y' через x и y . Получится одно или несколько уравнений вида $y' = f(x, y)$. Каждое из них надо решить.

б) Метод введения параметра¹⁾.

Пусть уравнение $F(x, y, y') = 0$ можно разрешить относительно y , т. е. записать в виде $y = f(x, y')$. Введи параметр

$$p = \frac{dy}{dx} = y', \quad (1)$$

получим

$$y = f(x, p). \quad (2)$$

Взяв полный дифференциал от обеих частей равенства (2) и заменив dy через $p dx$ (в силу (1)), получим уравнение вида

$$M(x, p) dx + N(x, p) dp = 0.$$

Если решение этого уравнения найдено в виде $x = \varphi(p)$, то, воспользовавшись равенством (2), получим решение исходного уравнения в параметрической записи: $x = \varphi(p)$, $y = f(\varphi(p), p)$.

Уравнения вида $x = f(y, y')$ решаются тем же методом.

Пример. Решить уравнение $y = x + y' - \ln y'$. Вводим параметр $p = y'$:

$$y = x + p - \ln p. \quad (3)$$

¹⁾ Здесь излагается простейший вариант этого метода. Более общий вариант см. [1], гл. III, § 3, п. 1.

Берем полный дифференциал от обеих частей равенства и заменяем dy на $p dx$ в силу (1): $dy = dx + dp - \frac{dp}{p}$, $p dx = dx + dp - \frac{dp}{p}$. Решаем полученное уравнение. Переносим члены с dx влево, с dp — вправо:

$$(p - 1) dx = \frac{p - 1}{p} dp. \quad (4)$$

а) Если $p \neq 1$, то сокращаем на $p - 1$:

$$dx = \frac{dp}{p}, \quad x = \ln p + C.$$

Подставляя это в (3), получаем решение в параметрической записи:

$$x = \ln p + C, \quad y = p + C. \quad (5)$$

В данном случае можно исключить параметр p и получить решение в явном виде. Для этого из первого из уравнений (5) выражаем p через x , т. е. $p = e^{x-C}$. Подставляя это во второе уравнение, получаем искомое решение:

$$y = e^{x-C} + C. \quad (6)$$

б) Рассмотрим случай, когда в (4) имеем $p = 1$. Подставляя $p = 1$ в (3), получаем еще решение

$$y = x + 1. \quad (7)$$

(Было бы ошибкой в равенстве $p = 1$ заменить p на y' и, проинтегрировав, получить $y = x + C$.)

2. Решение $y = \varphi(x)$ уравнения $F(x, y, y') = 0$ называется *особым*, если через каждую его точку, кроме этого решения, проходит и другое решение, имеющее в этой точке ту же касательную, что и решение $y = \varphi(x)$, но не совпадающее с ним в сколь угодно малой окрестности этой точки¹⁾.

Если функция $F(x, y, y')$ и производные $\frac{\partial F}{\partial y}$ [и $\frac{\partial F}{\partial y'}$] непрерывны, то любое особое решение уравнения

$$F(x, y, y') = 0 \quad (8)$$

удовлетворяет также уравнению

$$\frac{\partial F(x, y, y')}{\partial y} = 0. \quad (9)$$

Поэтому, чтобы отыскать особые решения уравнения (3), надо исключить y' из уравнений (8) и (9). Полученное уравнение $\varphi(x, y) = 0$ называется уравнением *дискриминантной* кривой. Для каждой ветви дискриминантной кривой надо проверить, является ли эта ветвь решением уравнения (8), и если является, то будет ли это решение особым, т. е. касаются ли его в каждой точке другие решения.

¹⁾ Это определение взято из [1]. Есть и другие определения, не равносильные этому.

Пример. Найти особое решение уравнения

$$y = x + y' - \ln y'. \quad (10)$$

Дифференцируем обе части равенства по y' :

$$0 = 1 - \frac{1}{y'}. \quad (11)$$

Исключаем y' из уравнений (10) и (11). Из (11) имеем $y' = 1$; подставляя это в (10), получаем уравнение дискриминантной кривой

$$y = x + 1. \quad (12)$$

Проверим, будет ли она особым решением. Для этого сначала проверяем, является ли она решением уравнения (10). Подставляя (12) в (10), получаем тождество $x + 1 = x + 1$. Значит, кривая (12) — решение.

Теперь проверим, является ли это решение особым, т. е. касаются ли его в каждой точке другие решения. В п. 1 было найдено, что другие решения выражаются формулой (6). Пишем условия касания кривых $y = y_1(x)$ и $y = y_2(x)$ в точке с абсциссой x_0 :

$$y_1(x_0) = y_2(x_0), \quad y_1'(x_0) = y_2'(x_0). \quad (13)$$

Для решений (6) и (12) эти условия принимают вид $e^{x_0 - C} + C = x_0 + 1$, $e^{x_0 - C} = 1$. Из второго равенства имеем $C = x_0$; подставляя это в первое равенство, получаем $1 + x_0 = x_0 + 1$. Это равенство справедливо при всех x_0 . Значит, при каждом x_0 решение (12) в точке с абсциссой x_0 касается одной из кривых семейства (6), а именно той кривой, для которой $C = x_0$.

Итак, в каждой точке решение (12) касается другого решения (6), не совпадающего с ним. Значит, решение (12) — особое.

Если семейство решений записано в параметрическом виде, как в (5), то выполнение условий касания проверяется аналогично. При этом надо учесть, что $y' = p$.

3. Если семейство кривых $\Phi(x, y, C) = 0$, являющихся решениями уравнения $F(x, y, y') = 0$, имеет огибающую $y = \varphi(x)$, то эта огибающая является особым решением того же уравнения. Если функция Φ имеет непрерывные первые производные, то для отыскания огибающей надо исключить C из уравнений

$$\Phi(x, y, C) = 0, \quad \frac{\partial \Phi(x, y, C)}{\partial C} = 0$$

и проверить, будет ли полученная кривая огибающей, т. е. касаются ли ее в каждой точке кривые семейства. Эту проверку можно провести изложенным в конце п. 2 методом, используя условия касания (13).

В задачах 241—250 найти все решения данных уравнений; выделить особые решения (если они есть); дать чертеж.

241. $y'^2 - y^2 = 0$. 242. $8y'^3 = 27y$.
 243. $(y' + 1)^3 = 27(x + y)^2$. 244. $y^2(y'^2 + 1) = 1$.
 245. $y'^2 - 4y^3 = 0$. 246. $y'^2 = 4y^3(1 - y)$.
 247. $xy'^2 = y$. 248. $yy'^3 + x = 1$.
 249. $y'^3 + y^2 = yy'(y' + 1)$.
 250. $4(1 - y) = (3y - 2)^2 y'^2$.

Уравнения 251—266 разрешить относительно y' , после этого общее решение искать обычными методами (§§ 2, 4, 5, 6). Найти также особые решения, если они есть.

251. $y'^2 + xy = y^2 + xy'$. 252. $xy'(xy' + y) = 2y^2$.
 253. $xy'^2 - 2yy' + x = 0$. 254. $xy'^2 = y(2y' - 1)$.
 255. $y'^2 + x = 2y$. 256. $y'^3 + (x + 2)e^y = 0$.
 257. $y'^2 - 2xy' = 8x^2$. 258. $(xy' + 3y)^2 = 7x$.
 259. $y'^2 - 2yy' = y^2(e^x - 1)$.
 260. $y'(2y - y') = y^2 \sin^2 x$. 261. $y'^4 + y^2 = y^4$.
 262. $x(y - xy')^2 = xy'^2 - 2yy'$.
 263. $y(xy' - y)^2 = y - 2xy'$.
 264. $yy'(yy' - 2x) = x^2 - 2y^2$.
 265. $y'^2 + 4xy' - y^2 - 2x^2y = x^4 - 4x^2$.
 266. $y(y - 2xy')^2 = 2y'$.

Уравнения 267—286 решить методом введения параметра.

267. $x = y'^3 + y'$. 268. $x(y'^2 - 1) = 2y'$.
 269. $x = y' \sqrt{y'^2 + 1}$. 270. $y'(x - \ln y') = 1$.
 271. $y = y'^2 + 2y'^3$. 272. $y = \ln(1 + y'^2)$.
 273. $(y' + 1)^3 = (y' - y)^2$. 274. $y = (y' - 1)e^{y'}$.
 275. $y'^4 - y'^2 = y^2$. 276. $y'^2 - y'^3 = y^2$.
 277. $y'^4 = 2yy' + y^2$. 278. $y'^2 - 2xy' = x^2 - 4y$.
 279. $5y + y'^2 = x(x + y')$. 280. $x^2 y'^2 = xy' + 1$.
 281. $y'^3 + y^2 = xy' y'$. 282. $2xy' - y = y' \ln yy'$.
 283. $y' = e^{xy'/y}$. 284. $y = xy' - x^2 y'^3$.
 285. $y = 2xy' + y^2 y'^3$. 286. $y(y - 2xy')^3 = y'^2$.

Решить уравнения Лагранжа и Клеро (задачи 287—296).

287. $y = xy' - y'^2$. 288. $y + xy' = 4\sqrt{y'}$.
 289. $y = 2xy' - 4y'^3$. 290. $y = xy' - (2 + y')$.
 291. $y'^3 = 3(xy' - y)$. 292. $y = xy'^2 - 2y'^3$.

$$293. xy' - y = \ln y'. \quad 294. xy'(y' + 2) = y.$$

$$295. 2y'^2(y - xy') = 1. \quad 296. 2xy' - y = \ln y'.$$

297. Найти особое решение дифференциального уравнения, если известно семейство решений этого уравнения:

$$а) y = Cx^2 - C^2, \quad б) Cy = (x - C)^2,$$

$$в) y = C(x - C)^2, \quad г) xy = Cy - C^2.$$

298. Найти кривую, каждая касательная к которой образует с осями координат треугольник площади $2a^2$.

299. Найти кривую, каждая касательная к которой отсекает на осях координат такие отрезки, что сумма величин, обратных квадратам длин этих отрезков, равна 1.

300. Найти кривую, проходящую через начало координат и такую, что отрезок нормали к ней, отсекаемый сторонами первого координатного угла, имеет постоянную длину, равную 2.

§ 9. РАЗНЫЕ УРАВНЕНИЯ ПЕРВОГО ПОРЯДКА ¹⁾

Решить уравнения 301—330 и построить графики их решений.

$$301. xy' + x^2 + xy - y = 0. \quad 302. 2xy' + y^2 = 1.$$

$$303. (2xy^2 - y)dx + xdy = 0.$$

$$304. (xy' + y)^2 = x^2y'. \quad 305. y - y' = y^2 + xy'.$$

$$306. (x + 2y^3)y' = y. \quad 307. y'^3 - y'e^{2x} = 0.$$

$$308. x^2y' = y(x + y).$$

$$309. (1 - x^2)dy + xydx = 0.$$

$$310. y'^2 + 2(x - 1)y' - 2y = 0.$$

$$311. y + y' \ln^2 y = (x + 2 \ln y)y'.$$

$$312. x^2y' - 2xy = 3y.$$

$$313. x + yy' = y^2(1 + y'^2).$$

$$314. y = (xy' + 2y)^2.$$

$$315. y' = \frac{1}{x - y^2}.$$

$$316. y'^3 + (3x - 6)y' = 3y. \quad 317. x - \frac{y}{y'} = \frac{2}{y}.$$

$$318. 2y'^3 - 3y'^2 + x = y. \quad 319. (x + y)^2 y' = 1.$$

$$320. 2x^3yy' + 3x^2y^2 + 7 = 0. \quad 321. \frac{dx}{x} = \left(\frac{1}{y} - 2x\right)dy.$$

$$322. xy' = e^y + 2y'. \quad 323. 2(x - y^2)dy = ydx.$$

$$324. x^2y'^2 + y^2 = 2x(2 - yy').$$

$$325. dy + (xy - xy^3)dx = 0. \quad 326. 2x^2y' = y^2(2xy' - y).$$

¹⁾ Все задачи § 9 решаются изложенными ранее методами.

327. $\frac{y - xy'}{x + yy'} = 2$. 328. $x(x - 1)y' + 2xy = 1$.
 329. $xy(xy' - y)^2 + 2y' = 0$.
 330. $(1 - x^2)y' - 2xy^2 = xy$.

Решить уравнения 331—420.

331. $y' + y = xy^3$.
 332. $(xy^4 - x)dx + (y + xy)dy = 0$.
 333. $(\sin x + y)dy + (y \cos x - x^2)dx = 0$.
 334. $3y'^3 - xy' + 1 = 0$. 335. $yy' + y^2 \operatorname{ctg} x = \cos x$.
 336. $(e^y + 2xy)dx + (e^y + x)x dy = 0$.
 337. $xy'^2 = y - y'$. 338. $x(x + 1)(y' - 1) = y$.
 339. $y(y - xy') = \sqrt{x^4 + y^4}$. 340. $xy' + y = \ln y'$.
 341. $x^2(dy - dx) = (x + y)y dx$.
 342. $y' + x\sqrt[3]{y} = 3y$.
 343. $(x \cos y + \sin 2y)y' = 1$.
 344. $y'^2 - yy' + e^x = 0$. 345. $y' = \frac{x}{y}e^{2x} + y$.
 346. $(xy' - y)^3 = y'^3 - 1$. 347. $(4xy - 3)y' + y^2 = 1$.
 348. $y'\sqrt{x} = \sqrt{y - x} + \sqrt{x}$.
 349. $xy' = 2\sqrt{y} \cos x - 2y$. 350. $3y'^4 = y' + y$.
 351. $y^2(y - xy') = x^3y'$. 352. $y' = (4x + y - 3)^2$.
 353. $(\cos x - x \sin x)y dx + (x \cos x - 2y)dy = 0$.
 354. $x^2y'^2 - 2xyy' = x^2 + 3y^2$.
 355. $\frac{xy'}{y} + 2xy \ln x + 1 = 0$. 356. $xy' = x\sqrt{y - x^2} + 2y$.
 357. $(1 - x^2y)dx + x^2(y - x)dy = 0$.
 358. $(2xe^y + y^4)y' = ye^y$. 359. $xy'(\ln y - \ln x) = y$.
 360. $2y' = x + \ln y'$.
 361. $(2x^2y - 3y^2)y' = 6x^2 - 2xy^2 + 1$.
 362. $yy' = 4x + 3y - 2$.
 363. $y^2y' + x^2 \sin^3 x = y^3 \operatorname{ctg} x$.
 364. $2xy' - y = \sin y'$.
 365. $(x^2y^2 + 1)y + (xy - 1)^2xy' = 0$.
 366. $y \sin x + y' \cos x = 1$.
 367. $x dy - y dx = x\sqrt{x^2 + y^2} dx$.
 368. $y^2 + x^2y'^5 = xy(y'^2 + y'^3)$.
 369. $y' = \sqrt[3]{2x - y} + 2$.
 370. $\left(x - y \cos \frac{y}{x}\right)dx + x \cos \frac{y}{x} dy = 0$.
 371. $2(x^2y + \sqrt{1 + x^4y^2})dx + x^3 dy = 0$.
 372. $(y' - x\sqrt{y})(x^2 - 1) = xy$.

373. $y'^3 + (y'^2 - 2y')x = 3y' - y$.
 374. $(2x + 3y - 1)dx + (4x + 6y - 5)dy = 0$.
 375. $(2xy^2 - y)dx + (y^2 + x + y)dy = 0$.
 376. $y = y' \sqrt{1 + y'^2}$. 377. $y^2 = (xyy' + 1) \ln x$.
 378. $4y = x^2 + y'^2$.
 379. $2x dy + y dx + xy^2(x dy + y dx) = 0$.
 380. $x dx + (x^2 \operatorname{ctg} y - 3 \cos y) dy = 0$.
 381. $x^2 y'^2 - 2(xy - 2)y' + y^2 = 0$.
 382. $xy' + 1 = e^{x-y}$. 383. $y' = \operatorname{tg}(y - 2x)$.
 384. $3x^2 - y = y' \sqrt{x^2 + 1}$. 385. $yy' + xy = x^3$.
 386. $x(x - 1)y' + y^3 = xy$.
 387. $xy' = 2y + \sqrt{1 + y'^2}$.
 388. $(2x + y + 5)y' = 3x + 6$.
 389. $y' + \operatorname{tg} y = x \sec y$. 390. $y'^4 = 4y(xy' - 2y)^2$.
 391. $y' = \frac{y^2 - x}{2y(x + 1)}$. 392. $xy' = x^2 e^{-y} + 2$.
 393. $y' = 3x + \sqrt{y - x^2}$.
 394. $x dy - 2y dx + xy^2(2x dy + y dx) = 0$.
 395. $(x^3 - 2xy^2)dx + 3x^2y dy = x dy - y dx$.
 396. $(yy')^3 = 27x(y^2 - 2x^2)$.
 397. $y' - 8x \sqrt{y} = \frac{4xy}{x^2 - 1}$.
 398. $[2x - \ln(y + 1)] dx - \frac{x + y}{y + 1} dy = 0$.
 399. $xy' = (x^2 + \operatorname{tg} y) \cos^2 y$. 400. $x^2(y - xy') = yy'^2$.
 401. $y' = \frac{3x^2}{x^3 + y + 1}$. 402. $y' = \frac{(1 + y)^2}{x(y + 1) - x^2}$.
 403. $(y - 2xy')^2 = 4yy'^3$.
 404. $6x^5y dx + (y^4 \ln y - 3x^6) dy = 0$.
 405. $y' = \frac{1}{2} \sqrt{x} + \sqrt[3]{y}$. 406. $2xy' + 1 = y + \frac{x^2}{y - 1}$.
 407. $yy' + x = \frac{1}{2} \left(\frac{x^2 + y^2}{x} \right)^2$.
 408. $y' = \left(\frac{3x + y^3 - 1}{y} \right)^2$.
 409. $(x\sqrt{y^2 + 1} + 1)(y^2 + 1) dx = xy dy$.
 410. $(x^2 + y^2 + 1)yy' + (x^2 + y^2 - 1)x = 0$.
 411. $y^2(x - 1) dx = x(xy + x - 2y) dy$.
 412. $(xy' - y)^2 = x^2y^2 - x^4$.
 413. $xyy' - x^2\sqrt{y^2 + 1} = (x + 1)(y^2 + 1)$.
 414. $(x^2 - 1)y' + y^2 - 2xy + 1 = 0$.

$$415. y' \operatorname{tg} y + 4x^3 \cos y = 2x.$$

$$416. (xy' - y)^2 = y'^2 - \frac{2yy'}{x} + 1.$$

$$417. (x + y)(1 - xy)dx + (x + 2y)dy = 0.$$

$$418. (3xy + x + y)y dx + (4xy + x + 2y)x dy = 0.$$

$$419. (x^2 - 1)dx + (x^2y^2 + x^3 + x)dy = 0.$$

$$420. x(y'^2 + e^{2y}) = -2y'.$$

§ 10. УРАВНЕНИЯ, ДОПУСКАЮЩИЕ ПОНИЖЕНИЕ ПОРЯДКА

1. Если в уравнение не входит искомая функция y , т. е. оно имеет вид $F(x, y^{(k)}, y^{(k+1)}, \dots, y^{(n)}) = 0$, то порядок уравнения можно понизить, взяв за новую неизвестную функцию низшую из производных, входящих в уравнение, т. е. сделав замену $y^{(k)} = z$.

2. Если в уравнение не входит независимое переменное x , т. е. уравнение имеет вид $F(y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$, то порядок уравнения можно понизить, взяв за новое независимое переменное y , а за неизвестную функцию $y' = p(y)$.

Пример. Решить уравнение $2yy'' = y'^2 + 1$.

В уравнение не входит x . Полагаем $y' = p(y)$. Тогда

$$y'' = \frac{d(y')}{dx} = \frac{dp(y)}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p'p.$$

Подставляя $y' = p$ и $y'' = pp'$ в уравнение, получим $2ypp' = p^2 + 1$. Порядок уравнения понижен. Решив полученное уравнение, найдем $p = \pm\sqrt{Cy - 1}$. Следовательно, $y' = \pm\sqrt{Cy - 1}$. Из этого уравнения получим $4(Cy - 1) = C^2(x + C_2)$.

3. Если уравнение однородно относительно y и его производных, т. е. не меняется при одновременной замене y, y', y'', \dots на ky, ky', ky'', \dots , то порядок уравнения понижается подстановкой $y' = yz$, где z — новая неизвестная функция.

4. Порядок уравнения понижается, если оно является однородным относительно x и y в обобщенном смысле, т. е. не меняется от замены x на kx , y на $k^m y$ (при этом y' заменяется на $k^{m-1}y'$, y'' — на $k^{m-2}y''$ и т. д.). Чтобы узнать, будет ли уравнение однородным, и найти число m , надо приравнять друг другу показатели степеней, в которых число k будет входить в каждый член уравнения после указанной выше замены. Например, в первый член уравнения $2x^4y'' - 3y^2 = x^4$ после этой замены число k будет входить в степени $4 + (m - 2)$, во второй — в степени $2m$, в третий — в степени 4. Следовательно, m должно удовлетворять уравнениям

$$4 + (m - 2) = 2m = 4.$$

Отсюда $m = 2$. Если же полученные уравнения для m будут несовместными, то дифференциальное уравнение не является однородным в указанном смысле.

После того как число m найдено, надо сделать замену переменных $x = e^t$, $y = ze^{mt}$, где $z = z(t)$ — новая неизвестная

функция, а t — новое независимое переменное. Получим уравнение, в которое не входит независимое переменное t . Порядок такого уравнения понижается одним из ранее рассмотренных способов.

5. Порядок уравнения легко понижается, если удастся преобразовать уравнение к такому виду, чтобы обе его части являлись полными производными по x от каких-нибудь функций. Например, пусть дано уравнение $yy'' = y'^2$. Деля обе части на yy' , получим $\frac{y''}{y'} = \frac{y'}{y}$ $(\ln y')' = (\ln y)'$; $\ln y' = \ln y + \ln C$; $y' = yC$. Порядок уравнения понижен.

Решить уравнения 421—450.

$$421. x^2 y'' = y'^2.$$

$$422. 2xy'y'' = y'^2 - 1.$$

$$423. y^3 y'' = 1.$$

$$424. y'^2 + 2yy'' = 0.$$

$$425. y'' = 2yy'.$$

$$426. yy'' + 1 = y'^2.$$

$$427. y''(e^x + 1) + y' = 0.$$

$$428. y''' = y''^2.$$

$$429. yy'' = y'^2 - y'^3.$$

$$430. y''' = 2(y'' - 1) \operatorname{ctg} x.$$

$$431. 2yy'' = y^2 + y'^2.$$

$$432. y'^3 + xy'' = 2y'.$$

$$433. y'^2 + y' = xy''.$$

$$434. y'' + y'^2 = 2e^{-y}.$$

$$435. xy''' = y'' - xy''.$$

$$436. y'^2 = y'^2 + 1.$$

$$437. y'' = e^y.$$

$$438. y'' - xy''' + y'''^3 = 0.$$

$$439. 2y'(y'' + 2) = xy''^2.$$

$$440. y^4 - y^3 y'' = 1.$$

$$441. y'^2 = (3y - 2y')y''.$$

$$442. y''(2y' + x) = 1.$$

$$443. y''^2 - 2y'y''' + 1 = 0.$$

$$444. (1 - x^2)y'' + xy' = 2.$$

$$445. yy'' - 2yy' \ln y = y'^2.$$

$$446. (y' + 2y)y'' = y'^2.$$

$$447. xy'' = y' + x \sin \frac{y'}{x}.$$

$$448. y''' y'^2 = y'^3.$$

$$449. yy'' + y = y'^2.$$

$$450. xy'' = y' + x(y'^2 + x^2).$$

Решить уравнения 451—454, воспользовавшись формулой, сводящей многократное интегрирование к однократному (см. [1], гл. IV, § 2, п. 1).

$$451. xy^{IV} = 1.$$

$$452. xy'' = \sin x.$$

$$453. y'''' = 2xy''.$$

$$454. xy^{IV} + y'''' = e^x.$$

Решить уравнения 455—462, преобразовав их к такому виду, чтобы обе части уравнения являлись полными производными.

$$455. yy'''' + 3y'y'' = 0.$$

$$456. y'y''' = 2y''^2.$$

$$457. yy'' = y'(y' + 1).$$

$$458. 5y''^2 - 3y''y^{IV} = 0.$$

$$459. yy'' + y'^2 = 1.$$

$$460. y'' = xy' + y + 1.$$

$$461. xy'' = 2yy' - y'.$$

$$462. xy'' - y' = x^2 y y'.$$

В задачах 463—480 понизить порядок данных уравнений, пользуясь их однородностью, и решить эти уравнения.

$$463. xyy'' - xy'^2 = yy'. \quad 464. yy'' = y'^2 + 15y^2 \sqrt{x}.$$

$$465. (x^2 + 1)(y'^2 - yy'') = xyy'.$$

$$466. xyy'' + xy'^2 = 2yy'. \quad 467. x^2yy'' = (y - xy')^2.$$

$$468. y'' + \frac{y'}{x} + \frac{y}{x^2} = \frac{y'^2}{y}.$$

$$469. y(xy'' + y') = xy'^2(1 - x).$$

$$470. x^2yy'' + y'^2 = 0. \quad 471. x^2(y'^2 - 2yy'') = y^2.$$

$$472. xyy'' = y'(y + y'). \quad 473. 4x^2y^3y'' = x^2 - y^4.$$

$$474. x^3y'' = (y - xy')(y - xy' - x).$$

$$475. \frac{y'^2}{x^2} + y'^2 = 3xy'' + \frac{2yy'}{x}.$$

$$476. y'' = \left(2xy - \frac{5}{x}\right)y' + 4y^2 - \frac{4y}{x^2}.$$

$$477. x^2(2yy'' - y'^2) = 1 - 2xyy'.$$

$$478. x^2(yy'' - y'^2) + xyy' = (2xy' - 3y)\sqrt{x^3}.$$

$$479. x^4(y'^2 - 2yy'') = 4x^3yy' + 1.$$

$$480. yy' + xyy'' - xy'^2 = x^3.$$

В задачах 481—500, понизив порядок данных уравнений, свести их к уравнениям первого порядка.

$$481. y''(3 + yy'^2) = y'^4. \quad 482. y''^2 - y'y''' = \left(\frac{y'}{x}\right)^2.$$

$$483. yy' + 2x^2y'' = xy'^2. \quad 484. y'^2 + 2xyy'' = 0.$$

$$485. 2xy^2(xy'' + y') + 1 = 0.$$

$$486. x(y'' + y'^2) = y'^2 + y'.$$

$$487. y^2(y'y''' - 2y''^2) = y'^4.$$

$$488. y(2xy'' + y') = xy'^2 + 1.$$

$$489. y'' + 2yy'^2 = \left(2x + \frac{1}{x}\right)y'.$$

$$490. y'y''' = y''^2 + y'^2y''. \quad 491. yy'' = y'^2 + 2xy^2.$$

$$492. y''^4 = y'^5 - yy'^3y''. \quad 493. 2yy''' = y'.$$

$$494. y'''y'^2 = 1. \quad 495. y^2y''' = y'^3.$$

$$496. x^2yy'' + 1 = (1 - y)xy'.$$

$$497. yy'y''' + 2y'^2y'' = 3yy''^2.$$

$$498. (y'y''' - 3y''^2)y = y'^5.$$

$$499. y^2(y'y''' - 2y''^2) = yy'^2y'' + 2y'^4.$$

$$500. x^2(y^2y''' - y'^3) = 2y^2y' - 3xyy'^2.$$

В задачах 501—505 найти решения, удовлетворяющие заданным начальным условиям.

501. $yy'' = 2xy'^2$; $y(2) = 2$, $y'(2) = 0,5$.

502. $2y''' - 3y'^2 = 0$; $y(0) = -3$, $y'(0) = 1$, $y''(0) = -1$.

503. $x^2y'' - 3xy' = \frac{6y^2}{x^2} - 4y$; $y(1) = 1$, $y'(1) = 4$.

504. $y''' = 3yy'$; $y(0) = -2$, $y'(0) = 0$, $y''(0) = 4,5$.

505. $y'' \cos y + y'^2 \sin y = y'$; $y(-1) = \frac{\pi}{6}$, $y'(-1) = 2$.

506. Найти кривые, у которых в любой точке радиус кривизны вдвое больше отрезка нормали, заключенного между этой точкой кривой и осью абсцисс. Рассмотреть два случая: а) кривая обращена выпуклостью к оси абсцисс; б) вогнутостью к оси абсцисс.

507. Найти кривые, у которых радиус кривизны обратно пропорционален косинусу угла между касательной и осью абсцисс.

508. Определить форму равновесия нерастяжимой нити с закрепленными концами, на которую действует нагрузка так, что на каждую единицу длины горизонтальной проекции нагрузка одинакова (цепи цепного моста). Весом самой нити пренебречь.

509. Найти форму равновесия однородной перастяжимой нити (с закрепленными концами) под действием ее веса.

510*. Доказать, что уравнение движения маятника $y'' + \sin y = 0$ имеет частное решение $y(x)$, стремящееся к π при $x \rightarrow +\infty$.

§ 11. ЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ С ПОСТОЯННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ

1. Чтобы решить линейное однородное уравнение с постоянными коэффициентами

$$a_0y^{(n)} + a_1y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}y' + a_ny = 0, \quad (1)$$

надо составить характеристическое уравнение

$$a_0\lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1}\lambda + a_n = 0 \quad (2)$$

и найти все его корни $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.

Общее решение уравнения (1) есть сумма, состоящая из слагаемых вида $C_i e^{\lambda_i x}$ для каждого простого корня λ_i уравнения (2) и слагаемых вида

$$(C_{m+1} + C_{m+2}x + C_{m+3}x^2 + \dots + C_{m+k}x^{k-1})e^{\lambda x} \quad (3)$$

для каждого кратного корня λ уравнения (2), где k — кратность корня. Все C_4 — произвольные постоянные. Коэффициенты уравнения (1) и корни λ здесь могут быть вещественными или комплексными.

Если же все коэффициенты уравнения (1) вещественные, то решение можно написать в вещественной форме и в случае комплексных корней λ . Для каждой пары комплексных сопряженных корней $\lambda = \alpha \pm \beta i$ в формулу общего решения включаются слагаемые

$$C_{m+1}e^{\alpha x} \cos \beta x + C_{m+2}e^{\alpha x} \sin \beta x,$$

если эти корни простые, и слагаемые

$$P_{k-1}(x)e^{\alpha x} \cos \beta x + Q_{k-1}(x)e^{\alpha x} \sin \beta x,$$

если каждый из корней $\alpha + \beta i$ и $\alpha - \beta i$ имеет кратность k . Здесь P_{k-1} и Q_{k-1} — многочлены степени $k-1$, аналогичные многочлену в (3), их коэффициенты — произвольные постоянные.

Пример. Решить уравнение $y^V - 2y^{IV} - 16y' + 32y = 0$.
Пишем характеристическое уравнение

$$\lambda^5 - 2\lambda^4 - 16\lambda + 32 = 0.$$

Разлагая левую часть на множители, находим корни:

$$(\lambda - 2)(\lambda^4 - 16) = 0, \quad (\lambda - 2)^2(\lambda + 2)(\lambda^2 + 4) = 0,$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = -2, \quad \lambda_4 = 2i, \quad \lambda_5 = -2i.$$

По изложенным выше правилам пишем общее решение

$$y = (C_1 + C_2x)e^{2x} + C_3e^{-2x} + C_4 \cos 2x + C_5 \sin 2x$$

(степень многочлена $C_1 + C_2x$ на 1 меньше кратности корня $\lambda = 2$).

2. Для линейных неоднородных уравнений с постоянными коэффициентами и с правой частью, состоящей из сумм и произведений функций $b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m$, $e^{\alpha x}$, $\cos \beta x$, $\sin \beta x$, частное решение можно искать методом неопределенных коэффициентов.

Для уравнений с правой частью $P_m(x)e^{\gamma x}$, где $P_m(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m$, частное решение имеет вид

$$y_1 = x^s Q_m(x) e^{\gamma x}, \quad (4)$$

где $Q_m(x)$ — многочлен той же степени m . Число $s = 0$, если γ — не корень характеристического уравнения (2), а если γ — корень, то s равно кратности этого корня. Чтобы найти коэффициенты многочлена $Q_m(x)$, надо решение (4) подставить в дифференциальное уравнение и приравнять коэффициенты при подобных членах в левой и правой частях уравнения.

Если в правую часть уравнения входят синус и косинус, то их можно выразить через показательную функцию по формулам Эйлера

$$\cos \beta x = \frac{e^{i\beta x} + e^{-i\beta x}}{2}, \quad \sin \beta x = \frac{e^{i\beta x} - e^{-i\beta x}}{2i} \quad (5)$$

и свести задачу к уже рассмотренному случаю.

Если же коэффициенты левой части уравнения вещественны, то можно обойтись без перехода к комплексным функциям (5). Для уравнения с правой частью

$$e^{\alpha x}(P(x) \cos \beta x + Q(x) \sin \beta x) \quad (6)$$

можно искать частное решение в виде

$$y_1 = x^s e^{\alpha x}(R_m(x) \cos \beta x + T_m(x) \sin \beta x), \quad (7)$$

где $s = 0$, если $\alpha + \beta i$ не корень характеристического уравнения, и s равно кратности корня $\alpha + \beta i$ в противном случае, а R_m и T_m — многочлены степени m , равной наибольшей из степеней многочленов P и Q . Чтобы найти коэффициенты многочленов R_m и T_m , надо подставить решение (7) в уравнение и приравнять коэффициенты при подобных членах.

Еще один метод отыскания частного решения уравнения с вещественными коэффициентами и правой частью вида (6) состоит в следующем. Сначала решают уравнение с правой частью $P(x)e^{(\alpha+\beta i)x}$. Вещественная часть этого решения будет решением уравнения с правой частью $P(x)e^{\alpha x} \cos \beta x$, а мнимая — решением уравнения с правой частью $P(x)e^{\alpha x} \sin \beta x$.

Если правая часть уравнения равна сумме нескольких функций вида $P(x)e^{ix}$ и вида (6), то частное решение отыскивается по следующему правилу.

Частное решение линейного уравнения с правой частью $f_1 + \dots + f_p$ равно сумме частных решений уравнений с той же левой частью и правыми частями f_1, \dots, f_p .

Общее решение линейного неоднородного уравнения во всех случаях равно сумме частного решения этого уравнения и общего решения однородного уравнения с той же левой частью.

Пример. Решить уравнение

$$y''' - 6y'' + 9y' = xe^{3x} + e^{3x} \cos 2x. \quad (8)$$

Характеристическое уравнение $\lambda^3 - 6\lambda^2 + 9\lambda = 0$ имеет корень $\lambda = 3$ кратности 2 и корень $\lambda = 0$ кратности 1. Поэтому общее решение однородного уравнения имеет вид $y_0 = (C_1 + C_2x)e^{3x} + C_3$.

Правая часть (8) состоит из двух слагаемых вида (6); для первого $\gamma = \alpha + \beta i = 3$, а для второго $\alpha + \beta i = 3 + 2i$. Так как эти числа различны, то надо искать отдельно частные решения уравнений

$$y''' - 6y'' + 9y' = xe^{3x}, \quad (9)$$

$$y''' - 6y'' + 9y' = e^{3x} \cos 2x. \quad (10)$$

Число $\gamma = 3$ является корнем кратности $s = 2$, поэтому частное решение уравнения (9) согласно (4) имеет вид $y_1 = x^2(ax + b)e^{3x}$. Подставив $y = y_1$ в (9), найдем $a = 1/18$, $b = -1/18$.

Далее, число $\alpha + \beta i = 3 + 2i$ не является корнем характеристического уравнения, поэтому частное решение уравнения (10) согласно (7) имеет вид $y_2 = e^{3x}(c \cos 2x + d \sin 2x)$. Подставив $y = y_2$ в (10), найдем $c = -3/52$, $d = -1/26$.

Общее решение уравнения (8) равно $y = y_0 + y_1 + y_2$, где y_0, y_1, y_2 уже найдены.

3. Линейное неоднородное уравнение

$$a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_n y = f(x) \quad (11)$$

с любой правой частью $f(x)$ решается методом вариации постоянных. Пусть найдено решение $y = C_1 y_1 + \dots + C_n y_n$ линейного однородного уравнения с той же левой частью. Тогда решение уравнения (1) ищется в виде

$$y = C_1(x)y_1 + \dots + C_n(x)y_n.$$

Функции $C_i(x)$ определяются из системы

$$C_1' y_1 + \dots + C_n' y_n = 0,$$

$$C_1' y_1' + \dots + C_n' y_n' = 0,$$

.....

$$C_1' y_1^{(n-2)} + \dots + C_n' y_n^{(n-2)} = 0,$$

$$a_0 (C_1' y_1^{(n-1)} + \dots + C_n' y_n^{(n-1)}) = f(x).$$

4. Уравнение Эйлера

$$a_0 x^n y^{(n)} + a_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x y' + a_n y = f(x) \quad (12)$$

сводится к линейному уравнению с постоянными коэффициентами заменой независимого переменного $x = e^t$ при $x > 0$ (или $x = -e^t$ при $x < 0$). Для полученного уравнения с постоянными коэффициентами характеристическое уравнение имеет вид $a_0 \lambda (\lambda - 1) (\lambda - 2) \dots (\lambda - n + 1) + \dots$

$$\dots + a_{n-2} \lambda (\lambda - 1) + a_{n-1} \lambda + a_n = 0.$$

При составлении этого уравнения каждое произведение $x^k y^{(k)}$ в (12) заменяется на произведение k убывающих на 1 чисел: $\lambda (\lambda - 1) (\lambda - 2) \dots (\lambda - k + 1)$.

Пр и м е р. Решить уравнение

$$x^3 y''' - x^2 y'' + 2x y' - 2y = x^3. \quad (13)$$

Сразу пишем характеристическое уравнение и решаем его:

$$\lambda (\lambda - 1) (\lambda - 2) - \lambda (\lambda - 1) + 2\lambda - 2 = 0, \quad (14)$$

$$(\lambda - 1) (\lambda^2 - 3\lambda + 2) = 0, \quad \lambda_1 = \lambda_2 = 1, \quad \lambda_3 = 2.$$

При таких λ общее решение однородного уравнения с постоянными коэффициентами имеет вид (согласно п. 1)

$$y_0 = (C_1 + C_2 t) e^t + C_3 e^{2t}.$$

Чтобы решить неоднородное уравнение (13), сначала раскроем скобки в (14): $\lambda^3 - 4\lambda^2 + 5\lambda - 2 = 0$. По этому характеристическому уравнению составляем левую часть дифференциального уравнения, а правую часть получаем из правой части (13) заменой $x = e^t$:

$$y_t''' - 4y_t'' + 5y_t' - 2y = e^{3t}.$$

Так как число 3 не является корнем характеристического уравнения, то частное решение ищем в виде $y_1 = a e^{3t}$. Подставляя в уравнение, находим $a = 1/4$.

Следовательно, общее решение имеет вид

$$y = y_0 + y_1 = (C_1 + C_2 t) e^t + C_3 e^{2t} + \frac{1}{4} e^{3t} = \\ + (C_1 + C_2 \ln x) x + C_3 x^2 + \frac{1}{4} x^3 \quad (x > 0).$$

При $x < 0$ получается аналогичная формула, но с $\ln |x|$ вместо $\ln x$.

5. Для решения задач 635—640 и 879 можно пользоваться следующими законами теории электрических цепей.

Для каждого узла цепи сумма всех притекающих токов равна сумме вытекающих токов.

Алгебраическая сумма напряжений источников тока, содержащихся в любом замкнутом контуре цепи, равна алгебраической сумме падений напряжений на всех остальных участках этого контура.

Падение напряжения на сопротивлении R равно RI ; падение напряжения на самоиндукции L равно $L \frac{dI}{dt}$; падение напряжения на конденсаторе емкости C равно q/C , где $q = q(t)$ — заряд конденсатора в момент t ; при этом $\frac{dq}{dt} = I$; во всех трех случаях $I = I(t)$ — сила тока, протекающего через рассматриваемый участок цепи в данный момент t . В этих формулах I выражается в амперах, R — в омах, L — в генри, q — в кулонах, C — в фарадах, t — в секундах, напряжение — в вольтах.

Пример. Последовательно включены: источник тока, напряжение которого меняется по закону $E = V \sin \omega t$, сопротивление R и емкость C . Найти силу тока в цепи при установившемся режиме¹⁾.

Решение. Сила тока $I = I(t)$ на любом участке цепи одна и та же (по закону о последовательном соединении). Падение напряжения на сопротивлении равно RI , а на емкости q/C .

Следовательно, $RI + \frac{q}{C} = V \sin \omega t$. Дифференцируя и пользуясь тем, что $\frac{dq}{dt} = I$, получим уравнение

$$R \frac{dI}{dt} + \frac{I}{C} = V \omega \cos \omega t. \quad (15)$$

Это — линейное уравнение с постоянными коэффициентами. Для отыскания установившегося режима найдем периодическое решение этого уравнения. Исходя из вида правой части уравнения, ищем решение в виде

$$I = A_1 \cos \omega t + B_1 \sin \omega t. \quad (16)$$

Подставляя (16) в (15) и приравнивая коэффициенты при подобных членах, получим систему двух уравнений, из которой можно найти A_1 и B_1 . Но в электротехнике важнее знать не ко-

¹⁾ Установившимся режимом называется такой, при котором сила тока постоянна или меняется периодически.

коэффициенты A_1 и B_1 , а амплитуду изменения силы тока. Поэтому выражение (16) переписывают в виде

$$I = A \sin(\omega t - \varphi). \quad (17)$$

Подставляя (17) в (15), переходя к тригонометрическим функциям углов ωt и φ , приравнявая коэффициенты сначала при $\sin \omega t$, а затем при $\cos \omega t$, получим

$$RA\omega \sin \varphi + \frac{A}{C} \cos \varphi = 0, \quad RA\omega \cos \varphi - \frac{A}{C} \sin \varphi = V\omega.$$

Отсюда найдем

$$\operatorname{tg} \varphi = -\frac{1}{RC\omega}, \quad A = \frac{V}{\sqrt{R^2 + (\omega C)^{-2}}}.$$

Поясним, почему найденное периодическое решение называется установившимся режимом. Общее решение уравнения (15) равно сумме найденного частного решения (17) и общего решения линейного однородного уравнения

$$R \frac{dI}{dt} + \frac{I}{C} = 0. \quad (18)$$

Так как решение уравнения (18) $I = Ke^{-t/RC}$ (здесь K — произвольная постоянная) стремится к нулю при $t \rightarrow +\infty$, то любое решение уравнения (15) при $t \rightarrow +\infty$ неограниченно приближается (и притом весьма быстро) к найденному периодическому решению (17).

Решить уравнения 511—548.

511. $y'' + y' - 2y = 0$. 512. $y'' + 4y' + 3y = 0$.
 513. $y'' - 2y' = 0$. 514. $2y'' - 5y' + 2y = 0$.
 515. $y'' - 4y' + 5y = 0$. 516. $y'' + 2y' + 10y = 0$.
 517. $y'' + 4y = 0$. 518. $y''' - 8y = 0$.
 519. $y^{IV} - y = 0$. 520. $y^{IV} + 4y = 0$.
 521. $y^{VI} + 64y = 0$. 522. $y'' - 2y' + y = 0$.
 523. $4y'' + 4y' + y = 0$. 524. $y^V - 6y^{IV} + 9y''' = 0$.
 525. $y^V - 10y''' + 9y' = 0$.
 526. $y^{IV} + 2y'' + y = 0$.
 527. $y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$.
 528. $y''' - y'' - y' + y = 0$.
 529. $y^{IV} - 5y'' + 4y = 0$. 530. $y^V + 8y''' + 16y' = 0$.
 531. $y''' - 3y' + 2y = 0$. 532. $y^{IV} + 4y'' + 3y = 0$.
 533. $y'' - 2y' - 3y = e^{4x}$. 534. $y'' + y = 4xe^x$.
 535. $y'' - y = 2e^x - x^2$. 536. $y'' + y' - 2y = 3xe^x$.
 537. $y'' - 3y' + 2y = \sin x$. 538. $y'' + y = 4 \sin x$.
 539. $y'' - 5y' + 4y = 4x^2e^{2x}$.
 540. $y'' - 3y' + 2y = x \cos x$.
 541. $y'' + 3y' - 4y = e^{-4x} + xe^{-x}$.
 542. $y'' + 2y' - 3y = x^2e^x$.
 543. $y'' - 4y' + 8y = e^{2x} + \sin 2x$.

$$544. y'' - 9y = e^{3x} \cos x. \quad 545. y'' - 2y' + y = 6xe^x.$$

$$546. y'' + y = x \sin x. \quad 547. y'' + 4y' + 4y = xe^{2x}.$$

$$548. y'' - 5y' = 3x^2 + \sin 5x.$$

В задачах 549—574 для каждого из данных уравнений написать его частное решение с неопределенными коэффициентами (числовых значений коэффициентов не находить).

$$549. y'' - 2y' + 2y = e^x + x \cos x.$$

$$550. y'' + 6y' + 10y = 3xe^{-3x} - 2e^{3x} \cos x.$$

$$551. y'' - 8y' + 20y = 5xe^{4x} \sin 2x.$$

$$552. y'' + 7y' + 10y = xe^{-2x} \cos 5x.$$

$$553. y'' - 2y' + 5y = 2xe^x + e^x \sin 2x.$$

$$554. y'' - 2y' + y = 2xe^x + e^x \sin 2x.$$

$$555. y'' - 8y' + 17y = e^{4x}(x^2 - 3x \sin x).$$

$$556. y'' + y' = \sin x + x \cos x.$$

$$557. y'' - 2y'' + 4y' - 8y = e^{2x} \sin 2x + 2x^2.$$

$$558. y'' - 6y' + 8y = 5xe^{2x} + 2e^{4x} \sin x.$$

$$559. y'' + 2y' + y = x(e^{-x} - \cos x).$$

$$560. y''' - y'' - y' + y = 3e^x + 5x \sin x.$$

$$561. y'' - 6y' + 13y = x^2e^{3x} - 3 \cos 2x.$$

$$562. y'' - 9y = e^{-3x}(x^2 + \sin 3x).$$

$$563. y^{IV} + y'' = 7x - 3 \cos x. \quad 564. y'' + 4y = \cos x \cdot \cos 3x.$$

$$565. y''' - 4y'' + 3y' = x^2 + xe^{2x}.$$

$$566. y'' - 4y' + 5y = e^{2x} \sin^2 x.$$

$$567. y'' + 3y' + 2y = e^{-x} \cos^2 x.$$

$$568. y'' - 2y' + 2y = (x + e^x) \sin x.$$

$$569. y^{IV} + 5y'' + 4y = \sin x \cdot \cos 2x.$$

$$570. y'' - 3y' + 2y = 2^x. \quad 571. y'' - y = 4 \operatorname{sh} x.$$

$$572. y'' + 4y' + 3y = \operatorname{ch} x. \quad 573. y'' + 4y = \operatorname{sh} x \cdot \sin 2x.$$

$$574. y'' + 2y' + 2y = \operatorname{ch} x \cdot \sin x.$$

Решить уравнения 575—581 способом вариации постоянных.

$$575. y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}. \quad 576. y'' + 3y' + 2y = \frac{1}{e^x + 1}.$$

$$577. y'' + y = \frac{1}{\sin x}. \quad 578. y'' + 4y = 2 \operatorname{tg} x.$$

$$579. y'' + 2y' + y = 3e^{-x} \sqrt{x+1}. \quad 580. y'' + y = 2 \sec^3 x.$$

$$581^*. x^3(y'' - y) = x^2 - 2.$$

Найти решения уравнений 582—588, удовлетворяющие указанным начальным условиям.

$$582. y'' - 2y' + y = 0; y(2) = 1, y'(2) = -2.$$

$$583. y'' + y = 4e^x; y(0) = 4, y'(0) = -3.$$

584. $y'' - 2y' = 2e^x$; $y(1) = -1$, $y'(1) = 0$.
 585. $y'' + 2y' + 2y = xe^{-x}$; $y(0) = y'(0) = 0$.
 586. $y''' - y' = 0$; $y(0) = 3$, $y'(0) = -1$, $y''(0) = 1$.
 587. $y''' - 3y' - 2y = 9e^{2x}$; $y(0) = 0$, $y'(0) = -3$;
 $y''(0) = 3$.
 588. $y^{IV} + y'' = 2 \cos x$; $y(0) = -2$, $y'(0) = 1$,
 $y''(0) = y'''(0) = 0$.

В задачах 589—600 решить уравнения Эйлера.

589. $x^2y'' - 4xy' + 6y = 0$. 590. $x^2y'' - xy' - 3y = 0$.
 591. $x^3y''' + xy' - y = 0$. 592. $x^2y''' = 2y'$.
 593. $x^2y'' - xy' + y = 8x^3$.
 594. $x^2y'' + xy' + 4y = 10x$.
 595. $x^3y'' - 2xy = 6 \ln x$.
 596. $x^2y'' - 3xy' + 5y = 3x^2$.
 597. $x^2y'' - 6y = 5x^3 + 8x^2$. 598. $x^2y'' - 2y = \sin \ln x$.
 599. $(x-2)^2y'' - 3(x-2)y' + 4y = x$.
 600. $(2x+3)^3y''' + 3(2x+3)y' - 6y = 0$.

Применяя различные методы, решить уравнения:

601. $y'' + 2y' + y = \cos ix$. 602. $y'' - 2y' + y = xe^x \sin^2 ix$.
 603. $y'' + 2iy = 8e^x \sin x$. 604. $y'' + 2iy' - y = 8 \cos x$.
 605. $y''' - 8iy = \cos 2x$. 606. $y'' - \frac{2y}{x^2} = 3 \ln(-x)$.

607. $y'' + 2y' + y = xe^x + \frac{1}{xe^x}$.

608. $y'' + 2y' + 5y = e^{-x}(\cos^2 x + \operatorname{tg} x)$.

609. $x^2y'' - 2y = \frac{3x^2}{x+1}$.

610. $x^2y'' - xy' + y = \frac{\ln x}{x} + \frac{x}{\ln x}$.

611*. $y'' + y = f(x)$.

612*. Какие условия достаточно наложить на функцию $f(x)$, чтобы все решения уравнения задачи 611 оставались ограниченными при $x \rightarrow +\infty$?

В задачах 613—618 построить линейные однородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами (возможно более низкого порядка), имеющие данные частные решения.

613. $y_1 = x^2e^x$. 614. $y_1 = e^{2x} \cos x$.

615. $y_1 = x \sin x$. 616. $y_1 = xe^x \cos 2x$.

617. $y_1 = xe^x$, $y_2 = e^{-x}$. 618. $y_1 = x$, $y_2 = \sin x$.

619. При каких a и b все решения уравнения $y'' + ay' + by = 0$ ограничены на всей числовой оси $-\infty < x \leq \infty$?

620. При каких a и b все решения уравнения $y'' + ay' + by = 0$ стремятся к нулю при $x \rightarrow +\infty$?

621. При каких a и b уравнение $y'' + ay' + by = 0$ имеет хотя бы одно решение $y(x) \neq 0$, стремящееся к нулю при $x \rightarrow +\infty$?

622. При каких a и b каждое решение уравнения $y'' + ay' + by = 0$, кроме решения $y(x) \equiv 0$, монотонно возрастает по абсолютной величине, начиная с некоторого x ?

623. При каких a и b каждое решение уравнения $y'' + ay' + by = 0$ обращается в нуль на бесконечном множестве точек x ?

624*. При каких a и b все решения уравнения $y'' + ay' + by = 0$ удовлетворяют соотношению $y = o(e^{-x})$ при $x \rightarrow +\infty$?

625*. Для заданного $b > 0$ подобрать такое a , при котором решение уравнения $y'' + ay' + by = 0$ с начальными условиями $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$ возможно быстрее стремится к нулю при $x \rightarrow +\infty$.

626. При каких k и ω уравнение $y'' + k^2y = \sin \omega t$ имеет хотя бы одно периодическое решение?

627. Найти периодическое решение уравнения $\ddot{x} + ax + bx = \sin \omega t$ и нарисовать график зависимости его амплитуды от величины ω .

628. Найти периодическое решение уравнения $\ddot{x} + \dot{x} + 4x = e^{i\omega t}$ и на комплексной плоскости начертить кривую, которую пробегает амплитудный множитель этого решения при изменении ω от 0 до $+\infty$.

629*. Дано уравнение $y'' + ay' + by = f(x)$, причем $|f(x)| \leq m$ ($-\infty < x < \infty$), а корни характеристического уравнения $\lambda_2 < \lambda_1 < 0$. Найти решение, ограниченное при $-\infty < x < \infty$. Показать, что а) все остальные решения неограниченно приближаются к этому решению при $x \rightarrow +\infty$, б) если $f(x)$ периодическая, то это решение тоже периодическое.

У к а з а н и е. Применить метод вариации постоянных. Нижние пределы полученных интегралов взять бесконечными такого знака, чтобы интегралы сходились.

В задачах 630—632 принять, что при отклонении груза от положения равновесия на расстояние x пружина действует на него с силой kx , направленной к положению равновесия.

630. Найти период свободных колебаний массы m , подвешенной к пружине, если движение происходит без сопротивления.

631. Один конец пружины закреплен неподвижно, а к другому прикреплен груз массы m . При движении груза со скоростью v сила сопротивления равна hv . При $t = 0$ грузу, находившемуся в положении равновесия, сообщена скорость v_0 . Исследовать движение груза в случаях $h^2 < 4kt$ и $h^2 > 4kt$.

632. Решить предыдущую задачу при дополнительном условии, что к грузу приложена еще периодическая внешняя сила $f = b \sin \omega t$. Показать, что при любых начальных условиях движение груза будет приближаться к периодическому и найти это периодическое движение (вынужденные колебания).

633. На конце упругого стержня укреплена масса m . Другой конец стержня вибрирует так, что его смещение в момент t равно $B \sin \omega t$. Упругая сила, возникающая в стержне, пропорциональна разности смещений его концов. Найти амплитуду A вынужденных колебаний массы m . Может ли быть $A > B$? (Массой стержня и трением пренебречь.)

634. Частица массы m движется по оси Ox , отталкиваясь от точки $x = 0$ с силой $3mr_0$ и притягиваясь к точке $x = 1$ с силой $4mr_1$, где r_0 и r_1 — расстояния до этих точек. Определить движение частицы с начальными условиями

$$x(0) = 2, \quad \dot{x}(0) = 0.$$

635. Электрическая цепь состоит из последовательно включенных источника постоянного тока, дающего напряжение V , сопротивления R , самоиндукции L и выключателя, который включается при $t = 0$. Найти зависимость силы тока от времени (при $t > 0$).

636. Решить предыдущую задачу, заменив самоиндукцию L конденсатором емкости C . Конденсатор до замыкания цепи не заряжен.

637. Последовательно включены сопротивление R и конденсатор емкости C , заряд которого при $t = 0$ равен q . Цепь замыкается при $t = 0$. Найти силу тока в цепи при $t > 0$.

638. Последовательно включены самоиндукция L , сопротивление R и конденсатор емкости C , заряд которого при $t = 0$ равен q . Цепь замыкается при $t = 0$. Найти силу тока в цепи и частоту колебаний в том случае, когда разряд носит колебательный характер.

639. Последовательно включены источник тока, напряжение которого меняется по закону $E = V \sin \omega t$,

сопротивление R и самоиндукция L . Найти силу тока в цепи (установившийся режим).

640. Последовательно включены: источник тока, напряжение которого меняется по закону $E = V \sin \omega t$, сопротивление R , самоиндукция L и емкость C . Найти силу тока в цепи (установившийся режим). При какой частоте ω сила тока наибольшая?

§ 12. ЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ С ПЕРЕМЕННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ

1. Большинство задач этого параграфа решается с помощью методов общей теории линейных дифференциальных уравнений (см. [1], гл. V, § 2, § 3 или [4], гл. 2, § 3, § 5) и методов качественного исследования линейных уравнений второго порядка (см. [1], гл. VI, § 2, п. 1, п. 3). К остальным задачам даны указания или ссылки на литературу.

2. Если известно частное решение y_1 линейного однородного уравнения n -го порядка, то порядок уравнения можно понизить, сохраняя линейность уравнения. Для этого в уравнение надо подставить $y = y_1 z$ и затем понизить порядок заменой $z' = u$.

Чтобы найти общее решение линейного однородного уравнения второго порядка $a_0(x)y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = 0$, у которого известно одно частное решение y_1 , можно понизить порядок уравнения указанным выше способом. Однако удобнее воспользоваться формулой Остроградского — Лиувилля:

$$\begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = C e^{-\int p(x) dx}, \quad p(x) = \frac{a_1(x)}{a_0(x)},$$

где y_1 и y_2 — любые два решения данного уравнения.

Пример. Пусть известно частное решение $y_1 = x$ уравнения

$$(x^2 + 1)y'' - 2xy' + 2y = 0. \quad (1)$$

По формуле Остроградского — Лиувилля получим

$$\begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = C e^{-\int \left(\frac{-2x}{x^2+1}\right) dx}; \quad y_1 y_2' - y_1' y_2 = C(x^2 + 1).$$

Так как функция y_1 известна, то мы получили линейное уравнение первого порядка относительно y_2 . Проще всего оно решается следующим способом. Разделив обе части уравнения на y_1^2 , получим слева производную от дроби y_2/y_1

$$\left(\frac{y_2}{y_1}\right)' = \frac{y_1 y_2' - y_1' y_2}{y_1^2} = \frac{C(x^2 + 1)}{y_1^2}.$$

Так как $y_1 = x$, то

$$\frac{y_2}{y_1} = \int C \cdot \frac{x^2 + 1}{x^2} dx + C_2 = C \left(x - \frac{1}{x}\right) + C_2;$$

$$y_2 = C(x^2 - 1) + C_2 x.$$

Это — общее решение уравнения (1).

3. Общего метода для отыскания частного решения линейного уравнения второго порядка не существует. В некоторых случаях решение удается найти путем подбора.

Пример. Найти частное решение уравнения

$$(1 - 2x^2)y'' + 2y' + 4y = 0, \quad (2)$$

являющееся алгебраическим многочленом (если такое решение существует).

Сначала найдем степень многочлена. Подставляя $y = x^n + \dots$ в уравнение (2) и выписывая только члены с самой старшей степенью буквы x , получим: $-2x^2 \cdot n(n-1) \times x^{n-2} + \dots + 4x^n + \dots = 0$. Приравняв нулю коэффициент при старшей степени x , получим: $-2n(n-1) + 4 = 0$; $n^2 - n - 2 = 0$. Отсюда $n_1 = 2$; корень $n_2 = -1$ не годен (степень многочлена — целое положительное число). Итак, многочлен может быть только второй степени. Ищем его в виде $y = x^2 + ax + b$. Подставляя в уравнение (2), получим $(4a + 4)x + 2 + 2a + 4b = 0$. Следовательно, $4a + 4 = 0$, $2 + 2a + 4b = 0$. Отсюда $a = -1$, $b = 0$. Итак, многочлен $y = x^2 - x$ является частным решением.

4. При решении задач 738—750 воспользоваться следующими утверждениями, вытекающими, например, из § 7 гл. V книги [5].

Пусть $|f(t)| \leq \frac{c}{t^{1+\alpha}}$ при $t_0 \leq t < \infty$; $c, \alpha = \text{const} > 0$.

Тогда

1) уравнение $u'' + (1 + f(t))u = 0$ имеет два таких линейно независимых решения, что при $t \rightarrow +\infty$

$$u_1(t) = \cos t + O\left(\frac{1}{t^\alpha}\right), \quad u_2(t) = \sin t + O\left(\frac{1}{t^\alpha}\right);$$

2) уравнение $u'' - (1 - f(t))u = 0$ имеет два таких линейно независимых решения, что при $t \rightarrow +\infty$

$$u_1(t) = e^t \left(1 + O\left(\frac{1}{t^\alpha}\right)\right), \quad u_2 = e^{-t} \left(1 + O\left(\frac{1}{t^\alpha}\right)\right).$$

В задачах 641—662 исследовать, являются ли данные функции линейно зависимыми. В каждой задаче функции рассматриваются в той области, в которой они все определены.

641. $x + 2, x - 2$.

642. $6x + 9, 8x + 12$.

643. $\sin x, \cos x$.

644. $1, x, x^2$.

645. $4 - x, 2x + 3, 6x + 8$.

646. $x^2 + 2x, 3x^2 - 1, x + 4$.

647. $x^2 - x + 3, 2x^2 + x, 2x - 4$.

648. e^x, e^{2x}, e^{3x} .

649. x, e^x, xe^x .

650. $1, \sin^2 x, \cos 2x$.

651. $\text{sh } x, \text{ch } x, 2 + e^x$.

652. $\ln(x^2), \ln 3x, 7$.

653. $x, 0, e^x$.

654. $\text{sh } x, \text{ch } x, 2e^x - 1, 3e^x + 5$.

655. $2^x, 3^x, 6^x$.

656. $\sin x, \cos x, \sin 2x$.

657. $\sin x, \sin(x+2), \cos(x-5)$.

658. $\sqrt{x}, \sqrt{x+1}, \sqrt{x+2}$.

659. $\operatorname{arctg} x, \operatorname{arcsctg} x, 1$.

660. $x^2, x|x|$.

661. $x, |x|, 2x + \sqrt{4x^2}$.

662. $x, x^3, |x^3|$.

663. а) Являются ли линейно зависимыми на отрезке $[a, b]$ функции, графики которых изображены на рис. 1? б) Тот же вопрос для рис. 2.

664. Известно, что для функций y_1, \dots, y_n детерминант Вронского в точке x_0 равен нулю, а в точке x_1 не равен нулю. Можно ли что-нибудь сказать о линейной зависимости (или независимости) этих функций на отрезке $[x_0, x_1]$?




Рис. 1




Рис. 2

665. Детерминант Вронского для функций y_1, \dots, y_n равен нулю при всех x . Могут ли быть эти функции линейно зависимыми? Линейно независимыми?

666. Что можно сказать о детерминанте Вронского функций y_1, \dots, y_n , если только известно, а) что они линейно зависимы? б) что они линейно независимы?

667. Функции $y_1 = x, y_2 = x^5, y_3 = |x^5|$ удовлетворяют уравнению $x^2 y'' - 5xy' + 5y = 0$. Являются ли они линейно зависимыми на интервале $(-1, 1)$? Объяснить ответ.

668. Доказать, что два решения уравнения $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ (с непрерывными коэффициентами), имеющие максимум при одном и том же значении x , линейно зависимы.

669. Даны 4 решения уравнения $y''' + xy = 0$, графики которых касаются друг друга в одной точке. Сколько линейно независимых имеется среди этих решений?

670. Пользуясь известным утверждением об интервале существования решения линейного уравнения ([1], гл. V, конец § 1), определить на каком интервале существует решение данного уравнения с указанными начальными условиями (не решая уравнения): а) $(x+1)y'' - 2y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 2$. б) $y'' + y \operatorname{tg} x = 0$, $y(5) = 1$, $y'(5) = 0$.

671. Могут ли графики двух решений уравнения $y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_n(x)y = 0$ (с непрерывными коэффициентами) на плоскости x, y а) пересекаться, б) касаться друг друга?

672. При каких n уравнение задачи 671 может иметь частное решение $y = x^3$?

673. Линейное однородное уравнение какого порядка на интервале $(-1, 1)$ может иметь такие четыре частных решения: $y_1 = x^2 - 2x + 2$, $y_2 = (x-2)^2$, $y_3 = x^2 + x - 1$, $y_4 = 1 - x$?

В каждой из задач 674—680 составить линейное однородное дифференциальное уравнение (возможно меньшего порядка), имеющее данные частные решения.

674. $1, \cos x$. 675. x, e^x . 676. $3x, x-2, e^x + 1$.

677. $x^2 - 3x, 2x^2 + 9, 2x + 3$. 678. $e^x, \operatorname{sh} x, \operatorname{ch} x$.

679. x, x^2, e^x . 680. $x, x^3, |x^3|$.

В задачах 681—701 найти общие решения данных уравнений, зная их частные решения. В тех задачах, где частное решение не дано, можно искать его путем подбора, например, в виде показательной функции $y_1 = e^{ax}$ или алгебраического многочлена $y_1 = x^n + ax^{n-1} + bx^{n-2} + \dots$.

681. $(2x+1)y'' + 4xy' - 4y = 0$.

682. $x^2(x+1)y'' - 2y = 0$; $y_1 = 1 + \frac{1}{x}$.

683. $xy'' - (2x+1)y' + (x+1)y = 0$.

684. $xy'' + 2y' - xy = 0$; $y_1 = \frac{e^x}{x}$.

685. $y'' - 2(1 + \operatorname{tg}^2 x)y = 0$; $y_1 = \operatorname{tg} x$.

686. $x(x-1)y'' - xy' + y = 0$.

687. $(e^x + 1)y'' - 2y' - e^x y = 0$; $y_1 = e^x - 1$.

688. $x^2 y'' \ln x - xy' + y = 0$.

689. $y'' - y' \operatorname{tg} x + 2y = 0$; $y_1 = \sin x$.

690. $(x^2 - 1)y'' + (x - 3)y' - y = 0$.

691. $xy'' - (x+1)y' - 2(x-1)y = 0$.

$$692. y'' + 4xy' + (4x^2 + 2)y = 0; y_1 = e^{ax^3}.$$

$$693. xy'' - (2x + 1)y' + 2y = 0.$$

$$694. x(2x + 1)y'' + 2(x + 1)y' - 2y = 0.$$

$$695. x(x + 4)y'' - (2x + 4)y' + 2y = 0.$$

$$696. x(x^2 + 6)y'' - 4(x^2 + 3)y' + 6xy = 0.$$

$$697. (x^2 + 1)y'' - 2y = 0.$$

$$698. 2x(x + 2)y'' + (2 - x)y' + y = 0.$$

$$699. xy''' - y'' - xy' + y = 0; y_1 = x, y_2 = e^x.$$

$$700. x^2(2x - 1)y''' + (4x - 3)xy'' - 2xy' + 2y = 0;$$

$$y_1 = x, y_2 = 1/x.$$

$$701. (x^2 - 2x + 3)y''' - (x^2 + 1)y'' + 2xy' - 2y = 0;$$

$$y_1 = x, y_2 = e^x.$$

В задачах 702, 703 найти общее решение линейного неоднородного уравнения, если известно, что частное решение соответствующего однородного уравнения является многочленом.

$$702. (x + 1)xy'' + (x + 2)y' - y = x + \frac{1}{x}.$$

$$703. (2x + 1)y'' + (2x - 1)y' - 2y = x^2 + x.$$

В задачах 704, 705, зная два частных решения линейного неоднородного уравнения второго порядка, найти его общее решение.

$$704. (x^2 - 1)y'' + 4xy' + 2y = 6x; y_1 = x, y_2 = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}.$$

$$705. (3x^3 + x)y'' + 2y' - 6xy = 4 - 12x^2; y_1 = 2x, y_2 = (x + 1)^2.$$

В уравнениях 706—710 линейной заменой искомой функции $y = a(x)z$ уничтожить член с первой производной.

$$706. x^2y'' - 2xy' + (x^2 + 2)y = 0.$$

$$707. x^2y'' - 4xy' + (6 - x^2)y = 0.$$

$$708. (1 + x^2)y'' + 4xy' + 2y = 0.$$

$$709. x^2y'' + 2x^2y' + (x^2 - 2)y = 0.$$

$$710. xy'' + y' + xy = 0.$$

В уравнениях 711—715 заменой независимого переменного $t = \varphi(x)$ уничтожить член с первой производной.

$$711. xy'' - y' - 4x^3y = 0.$$

$$712. (1 + x^2)y'' + xy' + y = 0.$$

$$713. x^2(1 - x^2)y'' + 2(x - x^3)y' - 2y = 0.$$

714. $y'' - y' + e^{4x}y = 0$. 715. $2xy'' + y' + xy = 0$.

716. Зная три частных решения $y_1 = 1$, $y_2 = x$, $y_3 = x^2$ линейного неоднородного уравнения второго порядка, написать его общее решение.

717. Что можно сказать о функции $p(x)$, если известно, что все решения уравнения $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ при $x \rightarrow +\infty$ стремятся к нулю вместе со своими первыми производными?

Указание. Воспользоваться формулой Лиувилля.

718. Доказать, что в случае $q(x) < 0$ решения уравнения $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ не могут иметь положительных максимумов.

719. Где могут лежать точки перегиба графиков решений уравнения $y'' + q(x)y = 0$?




Рис. 3

720. Могут ли графики двух решений уравнения $y'' + q(x)y = 0$ (функция $q(x)$ непрерывна) располагаться так, как на рис. 3а? рис. 3б? рис. 3в? рис. 3г?

721. Доказать, что отношение двух любых линейно независимых решений уравнения $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ (с непрерывными коэффициентами) не может иметь точек локального максимума.

722. Доказать, что в случае $q(x) > 0$ для любого решения уравнения $y'' + q(x)y = 0$ отношение

$y'(x)/y(x)$ убывает при возрастании x на интервале, где $y(x) \neq 0$.

723. Доказать, что в случае $q(x) \leq 0$ все решения уравнения $y'' + q(x)y = 0$ с положительными начальными условиями $y(x_0) > 0$, $y'(x_0) > 0$ остаются положительными при всех $x > x_0$.

724. Доказать, что решение уравнения $y'' - x^2y = 0$ с начальными условиями $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$ есть четная функция, всюду положительная.

725*. Доказать, что в случае $q(x) \leq 0$ краевая задача

$$y'' + q(x)y = 0, \quad y(x_1) = a, \quad y(x_2) = b$$

при любых a , b и $x_1 \neq x_2$ имеет единственное решение. Доказать, что это решение — монотонная функция, если $b = 0$.

726. Найти расстояние между двумя соседними нулями любого (не тождественно равного нулю) решения уравнения $y'' + my = 0$, где $m = \text{const} > 0$. Сколько нулей может содержаться на отрезке $a \leq x \leq b$?

В задачах 727—730, используя результат предыдущей задачи и теорему сравнения (см. [1], гл. VI, § 2, п. 3), оценить сверху и снизу расстояние между двумя соседними нулями любого (не тождественно равного нулю) решения следующих уравнений на заданном отрезке.

727. $y'' + 2xy = 0$, $20 \leq x \leq 45$.

728. $xy'' + y = 0$, $25 \leq x \leq 100$.

729. $y'' - 2xy' + (x+1)^2y = 0$, $4 \leq x \leq 19$.

730. $y'' - 2e^xy' + e^{2x}y = 0$, $2 \leq x \leq 6$.

731*. Доказать, что любое решение уравнения $y'' + xy = 0$ на отрезке $-25 \leq x \leq 25$ имеет не менее 15 нулей.

732. Пусть x_1, x_2, \dots — расположенные в порядке возрастания последовательные нули решения уравнения $y'' + q(x)y = 0$, где $q(x) > 0$; при $x_1 \leq x < \infty$ функция $q(x)$ непрерывна и возрастает. Доказать, что $x_{n+1} - x_n < x_n - x_{n-1}$ (т. е. расстояние между соседними нулями убывает).

733. В предыдущей задаче обозначим через c конечный или бесконечный предел функции $q(x)$ при $x \rightarrow \infty$. Доказать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = \pi/\sqrt{c}$.

734*. Пусть y и z — решения уравнений $y'' + q(x)y = 0$ и $z'' + Q(x)z = 0$ с совпадающими начальными условиями $y(x_0) = z(x_0)$, $y'(x_0) = z'(x_0)$ и на интервале (x_0, x_1) имеем $Q(x) > q(x)$, $y(x) > 0$, $z(x) > 0$. Доказать, что на этом интервале отношение $z(x)/y(x)$ убывает.

735*. Пусть выполнены условия задачи 732 и пусть $b_n = \max_{x_n < x < x_{n+1}} |y(x)|$. Доказать, что $b_1 > b_2 > b_3 > \dots$

736*. Пусть в задаче 733 предел c конечный. Доказать, что $b_n \rightarrow B > 0$ при $n \rightarrow \infty$ (в обозначениях задачи 735).

737*. Заменой независимого переменного $t = \varphi(x)$ привести уравнение $\frac{d^2y}{dx^2} \pm \frac{y}{(\psi(x))^4} = 0$ к виду $\frac{d^2y}{dt^2} + b(t) \frac{dy}{dt} \pm y = 0$, затем избавиться от первой производной заменой $y = a(t)u$. (Это преобразование называется преобразованием Лиувилля. Во многих случаях оно позволяет привести уравнение $y'' + q(x)y = 0$ к уравнению аналогичного вида, но с «почти постоянным» (слабо меняющимися на интервале (t_0, ∞)) коэффициентом при y . Это облегчает исследование асимптотического поведения решения при $x \rightarrow \infty$.)

В задачах 738—748 исследовать асимптотическое поведение при $x \rightarrow +\infty$ решений данных уравнений, пользуясь преобразованием Лиувилля (см. задачу 737) и утверждениями п. 4 (стр. 49).

$$738. y'' + x^4y = 0.$$

$$739. y'' - x^2y = 0.$$

$$740. y'' + x^2y = 0.$$

$$741. y'' + e^{2x}y = 0.$$

$$742. xy'' - y = 0.$$

$$743. y'' - xy = 0.$$

$$744. xy'' + 2y' + y = 0.$$

$$745. y'' - 2(x-1)y' + x^2y = 0.$$

$$746*. y'' + (x^4 + 1)y = 0.$$

$$747*. (x^2 + 1)y'' - y = 0.$$

$$748*. x^2y'' + y \ln^2 x = 0.$$

В задачах 749—750 получить более точное асимптотическое представление решений данных уравнений, применяя два раза преобразование Лиувилля.

$$749*. y'' - 4x^2y = 0.$$

$$750*. xy'' + y = 0.$$

§ 13. КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ

1. Для отыскания решения краевой задачи

$$a_0(x)y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = f(x), \quad x_0 \leq x \leq x_1, \quad (1)$$

$$\alpha y'(x_0) + \beta y(x_0) = 0, \quad \gamma y'(x_1) + \delta y(x_1) = 0 \quad (2)$$

надо подставить общее решение уравнения (1) в краевые условия (2) и из этих условий определить (если это возможно) значения произвольных постоянных, входящих в формулу общего решения. В отличие от задачи с начальными условиями (задачи Коши), краевая задача не всегда имеет решение.

2. Функцией Грина краевой задачи (1), (2) называется функция $G(x, s)$, определенная при $x_0 \leq x \leq x_1$, $x_0 < s < x_1$, и при каждом фиксированном s из интервала (x_0, x_1) обладающая свойствами (как функция от x):

1) при $x \neq s$ она удовлетворяет уравнению

$$a_0(x)y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = 0; \quad (3)$$

2) при $x = x_0$ и $x = x_1$ она удовлетворяет заданным краевым условиям (2);

3) при $x = s$ она непрерывна по x , а ее производная по x имеет скачок, равный $1/a_0(s)$, т. е.

$$G(s+0, s) = G(s-0, s), \quad G'_x|_{x=s+0} = G'_x|_{x=s-0} + \frac{1}{a_0(s)}. \quad (4)$$

Чтобы найти функцию Грина краевой задачи (1), (2), надо найти два решения $y_1(x)$ и $y_2(x)$ (отличные от $y(x) \equiv 0$) уравнения (3), удовлетворяющие соответственно первому и второму из граничных условий (2). Если $y_1(x)$ не удовлетворяет сразу обоим краевым условиям, то функция Грина существует и ее можно искать в виде

$$G(x, s) = \begin{cases} ay_1(x) & (x_0 \leq x \leq s), \\ by_2(x) & (s \leq x \leq x_1). \end{cases} \quad (5)$$

Функции a и b зависят от s и определяются из требования, чтобы функция (5) удовлетворяла условиям (4), т. е.

$$by_2(s) = ay_1(s), \quad by'_2(s) = ay'_1(s) + \frac{1}{a_0(s)}.$$

3. Если функция Грина $G(x, s)$ существует, то решение краевой задачи (1), (2) выражается формулой

$$y(x) = \int_{x_0}^{x_1} G(x, s) f(s) ds.$$

4. Собственным значением задачи

$$a_0(x)y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = \lambda y, \quad (6)$$

$$\alpha y'(x_0) + \beta y(x_0) = 0, \quad \gamma y'(x_1) + \delta y(x_1) = 0 \quad (7)$$

называется такое число λ , при котором уравнение (6) имеет решение $y(x) \neq 0$, удовлетворяющее краевым условиям (7). Это решение $y(x)$ называется собственной функцией.

Найти решения уравнений 751—762, удовлетворяющие указанным краевым условиям.

$$751. y'' - y = 2x; \quad y(0) = 0, \quad y(1) = -1.$$

$$752. y'' + y' = 1; \quad y'(0) = 0, \quad y(1) = 1.$$

$$753. y'' - y' = 0; \quad y(0) = -1, \quad y'(1) - y(1) = 2.$$

$$754. y'' + y = 1; \quad y(0) = 0, \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0.$$

$$755. y'' + y = 1; \quad y(0) = 0, \quad y(\pi) = 0.$$

$$756. y'' + y = 2x - \pi; \quad y(0) = 0, \quad y(\pi) = 0.$$

$$757. y'' - y' - 2y = 0; \quad y'(0) = 2, \quad y(+\infty) = 0.$$

$$758. y'' - y = 1; \quad y(0) = 0, \quad y(x) \text{ ограничено при } x \rightarrow +\infty.$$

$$759. y'' - 2iy = 0; \quad y(0) = -1, \quad y(+\infty) = 0.$$

$$760. x^2 y'' - 6y = 0; \quad y(0) \text{ ограничено, } y(1) = 2.$$

$$761. x^2 y'' - 2xy' + 2y = 0; \quad y(x) = o(x) \text{ при } x \rightarrow 0, \quad y(1) = 3.$$

$$762. x^2 y'' + 5xy' + 3y = 0; \quad y'(1) = 3, \quad y(x) = O(x^{-2}) \text{ при } x \rightarrow +\infty.$$

763*. При каких a краевая задача $y'' + ay = 1$, $y(0) = 0$, $y(1) = 0$ не имеет решений?

Для каждой из краевых задач 764—779 построить функцию Грина.

$$764. y'' = f(x); \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 0.$$

$$765. y'' + y = f(x); \quad y'(0) = 0, \quad y(\pi) = 0.$$

$$766. y'' + y' = f(x); \quad y(0) = 0, \quad y'(1) = 0.$$

$$767. y'' - y = f(x); \quad y'(0) = 0, \quad y'(2) + y(2) = 0.$$

$$768*. y'' + y = f(x); \quad y(0) = y(\pi), \quad y'(0) = y'(\pi).$$

$$769. x^2 y'' + 2xy' = f(x); \quad y(1) = 0, \quad y'(3) = 0.$$

$$770. xy'' - y' = f(x); \quad y'(1) = 0, \quad y(2) = 0.$$

$$771. x^2 y'' - 2y = f(x); \quad y(1) = 0, \quad y(2) + 2y'(2) = 0.$$

$$772. y'' = f(x); \quad y(0) = 0, \quad y(x) \text{ ограничено при } x \rightarrow +\infty.$$

$$773. y'' + y' = f(x); \quad y'(0) = 0, \quad y(+\infty) = 0.$$

$$774. xy'' + y' = f(x); \quad y(1) = 0, \quad y(x) \text{ ограничено при } x \rightarrow +\infty.$$

$$775. y'' + 4y' + 3y = f(x); \quad y(0) = 0, \quad y(x) = O(e^{-2x}) \text{ при } x \rightarrow +\infty.$$

$$776. x^2 y'' + xy' - y = f(x); \quad y(1) = 0, \quad y(x) \text{ ограничено при } x \rightarrow +\infty.$$

$$777. x^2 y'' + 2xy' - 2y = f(x); \quad y(0) \text{ ограничено, } y(1) = 0.$$

778. $y'' - y = f(x)$, $y(x)$ ограничено при $x \rightarrow \pm\infty$.

779. $x^2y'' - 2y = f(x)$, $y(x)$ ограничено при $x \rightarrow 0$ и при $x \rightarrow +\infty$.

780. При каких a существует функция Грина краевой задачи $y'' + ay = f(x)$, $y(0) = 0$, $y(1) = 0$?

781*. Оценить сверху и снизу решение задачи $x^2y'' + 2xy' - 2y = f(x)$, $y(x)$ ограничено при $x \rightarrow 0$ и $x \rightarrow +\infty$, и его первую производную, если известно, что $0 \leq f(x) \leq m$.

У к а з а н и е. Записать решение с помощью функции Грина.

В задачах 782—785 найти собственные значения и собственные функции.

782. $y'' = \lambda y$; $y(0) = 0$, $y(l) = 0$.

783. $y'' = \lambda y$; $y'(0) = 0$, $y'(l) = 0$.

784. $y'' = \lambda y$; $y(0) = 0$, $y'(l) = 0$.

785. $x^2y'' = \lambda y$; $y(1) = 0$, $y(a) = 0$ ($a > 1$).

§ 14. ЛИНЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ С ПОСТОЯННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ

1. Путем исключения неизвестных систему, вообще говоря, можно свести к уравнению более высокого порядка с одной неизвестной функцией (см. [1], гл. VII, § 1, п. 2 или [4], гл. 3, § 2). Этот способ удобен для решения лишь несложных систем.

Пр и м е р. Решить систему $\dot{x} = y + 1$, $\dot{y} = 2e^t - x$. Исключаем y . Из первого уравнения имеем $y = \dot{x} - 1$. Подставляя во второе уравнение, получаем $\ddot{x} = 2e^t - x$. Решив это уравнение второго порядка (методами § 11), найдем $x = C_1 \cos t + C_2 \sin t + e^t$. Значит, $y = \dot{x} - 1 = -C_1 \sin t + C_2 \cos t + e^t - 1$.

2. Для решения системы $\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$ (где \dot{x} означает $\frac{dx}{dt}$)

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n, \\ \dots \\ \dot{x}_n = a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n, \end{cases} \quad (1)$$

или, в векторной записи, $\dot{x} = Ax$, где x — вектор, A — матрица:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

надо найти корни характеристического уравнения

$$\begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = 0. \quad (2)$$

Для кратного корня $\lambda = 1$ сначала определим число линейно независимых собственных векторов. При $\lambda = 1$ из (5) получаем матрицу

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ее порядок $n = 3$, ранг $r = 2$. Число линейно независимых собственных векторов равно $m = n - r = 1$. Корень $\lambda = 1$ имеет кратность $k = 2$. Так как $k > m$, то решение надо искать в виде произведения многочлена степени $k - m = 1$ на $e^{\lambda t}$, т. е. в виде

$$x = (a + bt)e^t, \quad y = (c + dt)e^t, \quad z = (f + gt)e^t. \quad (8)$$

Чтобы найти коэффициенты a, b, \dots , подставляем (8) в систему (4) и приравниваем коэффициенты при подобных членах. Получаем систему

$$\begin{aligned} b + d + g &= 0, & b &= a + c + f, \\ -2b - d - g &= 0, & d &= -2a - c - f, \\ 2b + d + g &= 0, & g &= 2a + c + f. \end{aligned} \quad (9)$$

Найдем общее решение этой системы. Из двух левых уравнений имеем $b = 0, g = -d$. Подставляя это в остальные уравнения, получаем

$$0 = a + c + f, \quad d = -2a - c - f \quad (10)$$

(остальные уравнения будут следствиями написанных). Решаем систему (10), например, относительно a и f :

$$a = -d, \quad f = d - c.$$

Таким образом, все неизвестные выражены через c и d . Положив $c = C_1, d = C_2$, имеем $a = -C_2, b = 0, f = C_2 - C_1, g = -C_2$. Общее решение системы (9) найдено.

Подставив найденные значения a, b, \dots в (8) и прибавив частное решение (7), умноженное на C_3 , получим общее решение системы (4):

$$\begin{aligned} x &= -C_2 e^t + C_3 e^{2t}, & y &= (C_1 + C_2 t)e^t - 2C_3 e^{2t}, \\ z &= (C_2 - C_1 - C_2 t)e^t + 2C_3 e^{2t}. \end{aligned}$$

3. Другой способ решения системы (1). Для любой матрицы существует базис, в котором матрица имеет жорданову форму. Каждой клетке порядка $p \geq 1$ жордановой формы соответствует серия h_1, h_2, \dots, h_p векторов базиса, удовлетворяющих уравнениям

$$\begin{aligned} Ah_1 &= \lambda h_1, & h_1 &\neq 0, \\ Ah_2 &= \lambda h_2 + h_1, \\ Ah_3 &= \lambda h_3 + h_2, \\ &\dots \dots \dots \\ Ah_p &= \lambda h_p + h_{p-1}. \end{aligned} \quad (11)$$

Вектор h_1 называется собственным, а h_2, h_3, \dots, h_p — присоеди-

Аналогично определяются степени многочленов и в случае, когда $f_i(t)$ содержат $e^{\alpha t} \cos \beta t$ и $e^{\alpha t} \sin \beta t$, а число $\gamma = \alpha + \beta i$ является корнем характеристического уравнения.

Пример. Решить систему

$$\begin{cases} \dot{x} = 4x - y + e^{3t}(t + \sin t), \\ \dot{y} = x + 2y + te^{3t} \cos t. \end{cases} \quad (15)$$

Сначала для однородной системы $\dot{x} = 4x - y$, $\dot{y} = x + 2y$ находим корни $\lambda_1 = \lambda_2 = 3$ и, как в п. 2, отыскиваем общее решение

$$x_0 = (C_1 t + C_2) e^{3t}, \quad y_0 = (C_1 t + C_2 - C_1) e^{3t}.$$

В системе (15) для функций te^{3t} , $e^{3t} \sin t$, $e^{3t} \cos t$ числа $\alpha + \beta i$ соответственно равны 3 , $3 + i$, $3 + i$. Поэтому надо отдельно найти частные решения систем

$$\dot{x} = 4x - y + te^{3t}, \quad \dot{y} = x + 2y, \quad (16)$$

$$\dot{x} = 4x - y + e^{3t} \sin t, \quad \dot{y} = x + 2y + te^{3t} \cos t. \quad (17)$$

Для системы (16) $\alpha + \beta i = 3 = \lambda_1 = \lambda_2$, $s = 2$, $m = 1$. Согласно (14), частное решение можно искать в виде

$$x_1 = (at^3 + bt^2 + ct + d)e^{3t}, \quad y_1 = (ft^3 + gt^2 + ht + j)e^{3t}.$$

Для системы (17) $\alpha + \beta i = 3 + i \neq \lambda_{1,2}$, $s = 0$, $m = 1$. Частное решение имеет вид

$$x_2 = (kt + l)e^{3t} \sin t + (mt + n)e^{3t} \cos t,$$

$$y_2 = (pt + q)e^{3t} \sin t + (rt + s)e^{3t} \cos t.$$

Отыскав значения коэффициентов a, b, \dots , общее решение системы (15) запишем в виде

$$x = x_0 + x_1 + x_2, \quad y = y_0 + y_1 + y_2.$$

7. Решение неоднородной системы

$$\dot{x}_i = a_{i1}(t)x_1 + \dots + a_{in}(t)x_n + f_i(t), \quad i = 1, \dots, n,$$

можно найти методом вариации постоянных, если известно общее решение однородной системы с теми же коэффициентами $a_{ik}(t)$. Для этого в формуле общего решения однородной системы надо заменить произвольные постоянные C_i на неизвестные функции $C_i(t)$. Полученные выражения для x_i надо подставить в данную неоднородную систему, и из этой системы найти $C_i(t)$.

8. Показательной функцией e^A матрицы A называется сумма ряда

$$e^A = E + \frac{A}{1!} + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^3}{3!} + \dots, \quad (18)$$

где E — единичная матрица. Ряд сходится для любой матрицы A .

Свойства e^A :

а) если $A = CMC^{-1}$, то $e^A = Ce^{MC}C^{-1}$;

б) если $AB = BA$, то $e^{A+B} = e^A \cdot e^B = e^B \cdot e^A$;

в) матрица $X(t) = e^{tA}$ удовлетворяет уравнению $\frac{dX}{dt} = AX$; $X(0) = E$.

Методы отыскания e^{tA} :

1) Путем решения системы дифференциальных уравнений. В силу свойства в) i -й столбец матрицы e^{tA} есть решение системы уравнений (в векторной записи) $\dot{x} = Ax$ с начальными условиями $x_i(0) = 1$, $x_k(0) = 0$ при $k \neq i$ (x_i — i -я координата вектора x).

2) Путем приведения матрицы к жордановой форме. Пусть известна такая матрица C , что $C^{-1}AC = M$ имеет жорданову форму, т. е. состоит из клеток K_i . Каждая жорданова клетка имеет вид $K = \lambda E + F$, у матрицы F все элементы нули, кроме 1-го косога ряда над диагональю. Поэтому $F^m = 0$, где m — порядок матрицы F , и e^{tF} легко найти с помощью ряда (18). Так как еще $e^{\lambda E} = e^{\lambda t} E$, то

$$e^{K} = e^{\lambda E + F} = e^{\lambda E} \cdot e^F = e^{\lambda E} \cdot e^F = e^{\lambda t} e^F.$$

Составив из клеток e^{K_i} матрицу e^M , найдем e^{tA} с помощью свойства а). Доказательство и пример см. в [5], гл. 1, §§ 12—14.

В задачах 786—812 решить данные системы уравнений (\dot{x} означает $\frac{dx}{dt}$ и т. д.; для облегчения работы в некоторых задачах указаны корни характеристического уравнения).

$$786. \begin{cases} \dot{x} = 2x + y, \\ \dot{y} = 3x + 4y. \end{cases} \quad 787. \begin{cases} \dot{x} = x - y, \\ \dot{y} = y - 4x. \end{cases}$$

$$788. \begin{cases} \dot{x} + x - 8y = 0, \\ \dot{y} - x - y = 0. \end{cases} \quad 789. \begin{cases} \dot{x} = x + y, \\ \dot{y} = 3y - 2x. \end{cases}$$

$$790. \begin{cases} \dot{x} = x - 3y, \\ \dot{y} = 3x + y. \end{cases} \quad 791. \begin{cases} \dot{x} + x + 5y = 0, \\ \dot{y} - x - y = 0. \end{cases}$$

$$792. \begin{cases} \dot{x} = 2x + y, \\ \dot{y} = 4y - x. \end{cases} \quad 793. \begin{cases} \dot{x} = 3x - y, \\ \dot{y} = 4x - y. \end{cases}$$

$$794. \begin{cases} \dot{x} = 2y - 3x, \\ \dot{y} = y - 2x. \end{cases} \quad 795. \begin{cases} \dot{x} - 5x - 3y = 0, \\ \dot{y} + 3x + y = 0. \end{cases}$$

$$796. \begin{cases} \dot{x} = x + z - y, \\ \dot{y} = x + y - z, \\ \dot{z} = 2x - y \end{cases} \quad 797. \begin{cases} \dot{x} = x - 2y - z, \\ \dot{y} = y - x + z, \\ \dot{z} = x - z \end{cases}$$

$$(\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -1). \quad (\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -1).$$

$$798. \begin{cases} \dot{x} = 2x - y + z, \\ \dot{y} = x + 2y - z, \\ \dot{z} = x - y + 2z \end{cases} \quad 799. \begin{cases} \dot{x} = 3x - y + z, \\ \dot{y} = x + y + z, \\ \dot{z} = 4x - y + 4z \end{cases}$$

$$(\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3). \quad (\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 5).$$

$$800. \begin{cases} \dot{x} = 4y - 2z - 3x, \\ \dot{y} = z + x, \\ \dot{z} = 6x - 6y + 5z \end{cases} \quad 801. \begin{cases} \dot{x} = x - y - z, \\ \dot{y} = x + y, \\ \dot{z} = 3x + z \end{cases}$$

$$(\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -1). \quad (\lambda_1 = 1, \lambda_{2,3} = 1 \pm 2i).$$

$$802. \begin{cases} \dot{x} = 2x + y, \\ \dot{y} = x + 3y - z, \\ \dot{z} = 2y + 3z - x \end{cases} \quad 803. \begin{cases} \dot{x} = 2x + 2z - y, \\ \dot{y} = x + 2z, \\ \dot{z} = y - 2x - z \end{cases}$$

$$(\lambda_1 = 2, \lambda_{2,3} = 3 \pm i), \quad (\lambda_1 = 1, \lambda_{2,3} = \pm i).$$

$$804. \begin{cases} \dot{x} = 4x - y - z, \\ \dot{y} = x + 2y - z, \\ \dot{z} = x - y + 2z \end{cases} \quad 805. \begin{cases} \dot{x} = 2x - y - z, \\ \dot{y} = 3x - 2y - 3z, \\ \dot{z} = 2z - x + y \end{cases}$$

$$(\lambda_1 = 2, \lambda_2 = \lambda_3 = 3). \quad \lambda_1 = 0, \lambda_2 = \lambda_3 = 1).$$

$$806. \begin{cases} \dot{x} = y - 2x - 2z, \\ \dot{y} = x - 2y + 2z, \\ \dot{z} = 3x - 3y + 5z \end{cases} \quad 807. \begin{cases} \dot{x} = 3x - 2y - z, \\ \dot{y} = 3x - 4y - 3z, \\ \dot{z} = 2x - 4y \end{cases}$$

$$(\lambda_1 = 2, \lambda_2 = \lambda_3 = 3). \quad (\lambda_1 = 0, \lambda_2 = \lambda_3 = 1).$$

$$808. \begin{cases} \dot{x} = x - y + z, \\ \dot{y} = x + y - z, \\ \dot{z} = 2z - y \end{cases} \quad 809. \begin{cases} \dot{x} = y - 2z - x, \\ \dot{y} = 4x + y, \\ \dot{z} = 2x + y - z \end{cases}$$

$$(\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2). \quad (\lambda_1 = 1, \lambda_2 = \lambda_3 = -1).$$

$$810. \begin{cases} \dot{x} = 2x + y, \\ \dot{y} = 2y + 4z, \\ \dot{z} = x - z \end{cases} \quad 811. \begin{cases} \dot{x} = 2x - y - z, \\ \dot{y} = 2x - y - 2z, \\ \dot{z} = 2z - x + y \end{cases}$$

$$(\lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 3).$$

$$(\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1).$$

$$812. \begin{cases} \dot{x} = 4x - y, \\ \dot{y} = 3x + y - z, \\ \dot{z} = x + z \end{cases} \quad (\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 2).$$

В задачах 813—825 решить системы, не приведенные к нормальному виду.

$$813. \begin{cases} \ddot{x} = 2x - 3y, \\ \ddot{y} = x - 2y. \end{cases} \quad 814. \begin{cases} \ddot{x} = 3x + 4y, \\ \ddot{y} = -x - y. \end{cases}$$

$$815. \begin{cases} \ddot{x} = 2y, \\ \ddot{y} = -2x. \end{cases} \quad 816. \begin{cases} \ddot{x} = 3x - y - z, \\ \ddot{y} = -x + 3y - z, \\ \ddot{z} = -x - y + 3z. \end{cases}$$

$$817. \begin{cases} 2\dot{x} - 5\dot{y} = 4y - x, \\ 3\dot{x} - 4\dot{y} = 2x - y. \end{cases} \quad 818. \begin{cases} \ddot{x} + \dot{x} + \dot{y} - 2y = 0, \\ \dot{x} - \dot{y} + x = 0. \end{cases}$$

$$819. \begin{cases} \ddot{x} - 2\ddot{y} + \dot{y} + x - 3y = 0, \\ 4\ddot{y} - 2\ddot{x} - \dot{x} - 2x + 5y = 0. \end{cases}$$

$$820. \begin{cases} \ddot{x} - x + 2\ddot{y} - 2y = 0, \\ \dot{x} - x + \dot{y} + y = 0. \end{cases} \quad 821. \begin{cases} \ddot{x} - 2\dot{y} + 2x = 0, \\ 3\dot{x} + \ddot{y} - 8y = 0. \end{cases}$$

$$822. \begin{cases} \ddot{x} + 3\ddot{y} - x = 0, \\ \dot{x} + 3\dot{y} - 2y = 0. \end{cases} \quad 823. \begin{cases} \ddot{x} + 5\dot{x} + 2\dot{y} + y = 0, \\ 3\ddot{x} + 5x + \dot{y} + 3y = 0. \end{cases}$$

$$824. \begin{cases} \ddot{x} + 4\dot{x} - 2x - 2\dot{y} - y = 0, \\ \ddot{x} - 4x - \ddot{y} + 2\dot{y} + 2y = 0. \end{cases}$$

$$825. \begin{cases} 2\ddot{x} + 2\dot{x} + x + 3\ddot{y} + \dot{y} + y = 0, \\ \ddot{x} + 4\dot{x} - x + 3\ddot{y} + 2\dot{y} - y = 0. \end{cases}$$

В задачах 826—845 решить линейные неоднородные системы.

$$826. \begin{cases} \dot{x} = y + 2e^t, \\ \dot{y} = x + t^2. \end{cases}$$

$$827. \begin{cases} \dot{x} = y - 5 \cos t, \\ \dot{y} = 2x + y. \end{cases}$$

$$828. \begin{cases} \dot{x} = 3x + 2y + 4e^{3t}, \\ \dot{y} = x + 2y. \end{cases}$$

$$829. \begin{cases} \dot{x} = 2x - 4y + 4e^{-2t}, \\ \dot{y} = 2x - 2y. \end{cases}$$

$$830. \begin{cases} \dot{x} = 4x + y - e^{2t}, \\ \dot{y} = y - 2x. \end{cases}$$

$$831. \begin{cases} \dot{x} = 2y - x + 1, \\ \dot{y} = 3y - 2x. \end{cases}$$

$$832. \begin{cases} \dot{x} = 5x - 3y + 2e^{3t}, \\ \dot{y} = x + y + 5e^{-t}. \end{cases}$$

$$833. \begin{cases} \dot{x} = 2x + y + e^t, \\ \dot{y} = -2x + 2t. \end{cases}$$

$$834. \begin{cases} \dot{x} = x + 2y, \\ \dot{y} = x - 5 \sin t. \end{cases}$$

$$835. \begin{cases} \dot{x} = 2x - 4y, \\ \dot{y} = x - 3y + 3e^t. \end{cases}$$

$$836. \begin{cases} \dot{x} = 2x - y, \\ \dot{y} = y - 2x + 18t. \end{cases}$$

$$837. \begin{cases} \dot{x} = x + 2y + 16te^t, \\ \dot{y} = 2x - 2y. \end{cases}$$

$$838. \begin{cases} \dot{x} = 2x + 4y - 8, \\ \dot{y} = 3x + 6y. \end{cases}$$

$$839. \begin{cases} \dot{x} = 2x - 3y, \\ \dot{y} = x - 2y + 2 \sin t. \end{cases}$$

$$840. \begin{cases} \dot{x} = x - y + 2 \sin t, \\ \dot{y} = 2x - y. \end{cases}$$

$$841. \begin{cases} \dot{x} = 2x - y, \\ \dot{y} = x + 2e^t. \end{cases}$$

$$842. \begin{cases} \dot{x} = 4x - 3y + \sin t, \\ \dot{y} = 2x - y - 2 \cos t. \end{cases}$$

$$843. \begin{cases} \dot{x} = 2x + y + 2e^t, \\ \dot{y} = x + 2y - 3e^{4t}. \end{cases}$$

$$844. \begin{cases} \dot{x} = x - y + 8t, \\ \dot{y} = 5x - y. \end{cases}$$

$$845. \begin{cases} \dot{x} = 2x - y, \\ \dot{y} = 2y - x - 5e^t \sin t. \end{cases}$$

В задачах 846—850 данные системы решить методом вариации постоянных.

$$846. \begin{cases} \dot{x} = y + \operatorname{tg}^2 t - 1, \\ \dot{y} = -x + \operatorname{tg} t. \end{cases}$$

$$847. \begin{cases} \dot{x} = 2y - x, \\ \dot{y} = 4y - 3x + \frac{e^{3t}}{e^{2t} + 1}. \end{cases}$$

$$848. \begin{cases} \dot{x} = -4x - 2y + \frac{2}{e^t - 1}, \\ \dot{y} = 6x + 3y - \frac{3}{e^t - 1}. \end{cases} \quad 849. \begin{cases} \dot{x} = x - y + \frac{1}{\cos t}, \\ \dot{y} = 2x - y. \end{cases}$$

$$850. \begin{cases} \dot{x} = 3x - 2y, \\ \dot{y} = 2x - y + 15e^t \sqrt{t}. \end{cases}$$

Решить системы 851—866, записанные в векторной форме: $\dot{x} = Ax$, где x — вектор, A — данная матрица.

$$851. \dot{x} = Ax, A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}. \quad 852. \dot{x} = Ax, A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$853. \dot{x} = Ax, A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}. \quad 854. \dot{x} = Ax, A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$855. \dot{x} = Ax, A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$856. \dot{x} = Ax, A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 1 & 4 & -2 \\ 1 & 5 & -3 \end{pmatrix}.$$

$$857. \dot{x} = Ax, A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 2 \\ -2 & -1 & 2 \\ -3 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$858. \dot{x} = Ax, A = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ -3 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$859. \dot{x} = Ax, A = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 1 \\ 3 & -2 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$860. \dot{x} = Ax, A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$861. \dot{x} = Ax, A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$862. \dot{x} = Ax, A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$863. \dot{x} = Ax, A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$864. \dot{x} = Ax, A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

$$865. \dot{x} = Ax, \quad A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 1 & 3 & -1 \\ 3 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$866. \dot{x} = Ax, \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

В задачах 867—873 найти показательную функцию e^A данной матрицы A .

$$867. A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}. \quad 868. A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$869. A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}. \quad 870. A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$871. A = \begin{pmatrix} -2 & -4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}. \quad 872. A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$873. A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

В задачах 874 и 875 найти $\det e^A$, не вычисляя матрицу e^A .

$$874. A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad 875. A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

876. Тело массы m движется на плоскости x, y , притягиваясь к точке $(0,0)$ с силой a^2mr , где r — расстояние до этой точки. Найти движение тела при начальных условиях $x(0) = d, y(0) = 0, \dot{x}(0) = 0, \dot{y}(0) = v$ и траекторию этого движения.

877. Один конец пружины закреплен неподвижно в точке O , а к другому прикреплен груз массы $3m$, соединенный другой пружиной с грузом массы $2m$. Оба груза движутся без трения по одной прямой, проходящей через точку O . Каждая из пружин растягивается на величину x под действием силы a^2mx . Найти возможные периодические движения системы.

878. На концах вала закреплены два шкива, моменты инерции которых I_1 и I_2 . При повороте одного




Рис. 4

шкива относительно другого на любой угол φ вследствие деформации вала возникают упругие силы с крутящим моментом $K\varphi$. Найти частоту крутильных колебаний вала при отсутствии внешних сил.

879. К источнику тока с напряжением $E = V \sin \omega t$ последовательно присоединено сопротивление R . Далее цепь разветвляется на две ветви, в одной из которых включена самоиндукция L , а в другой — емкость C (рис. 4). Найти силу тока в цепи (установившийся режим), проходящего через сопротивление R . При какой частоте ω сила тока наибольшая? Наименьшая?

Указание. О составлении дифференциальных уравнений в задачах об электрических цепях см. п. 5 § 11.

880*. Какое условие достаточно наложить на собственные значения матрицы A , чтобы система уравнений (в векторной записи) $\dot{x} = Ax + f(t)$ имела периодическое решение при всякой непрерывной вектор-функции $f(t)$ периода ω ?

Указание. Применив метод вариации постоянных в векторной форме, выразить общее решение через фундаментальную матрицу e^{tA} , функцию $f(t)$ и начальные условия. Воспользоваться условием периодичности.

§ 15. УСТОЙЧИВОСТЬ

1. Рассмотрим систему уравнений

$$\frac{dx_i}{dt} = f_i(t, x_1, \dots, x_n), \quad i = 1, \dots, n, \quad (1)$$

или, в векторной записи

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x), \quad x = (x_1, \dots, x_n). \quad (2)$$

Пусть все f_i и $\frac{\partial f_i}{\partial x_k}$ непрерывны при $t_0 \leq t < \infty$.

Решение $x = \varphi(t)$ системы (2) называется устойчивым по Ляпунову, если для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta > 0$, что для всякого решения $x(t)$ той же системы, начальное значение которого удовлетворяет неравенству

$$|x(t_0) - \varphi(t_0)| < \delta, \quad (3)$$

при всех $(t_0 \leq t < \infty)$ выполняется неравенство

$$|x(t) - \varphi(t)| < \varepsilon.$$

Если же для некоторого $\varepsilon > 0$ такого δ не существует, то решение $\varphi(t)$ называется неустойчивым.

Решение $\varphi(t)$ называется асимптотически устойчивым, если оно устойчиво по Ляпунову и, кроме того, все решения с достаточно близкими начальными условиями неограниченно приближаются к $\varphi(t)$ при $t \rightarrow +\infty$, т. е. если из неравенства (3) следует $x(t) - \varphi(t) \rightarrow 0$ ($t \rightarrow +\infty$).

Наличие или отсутствие устойчивости не зависит от выбора t_0 .

Вопрос об устойчивости данного решения $x = \varphi(t)$ системы (2) сводится к вопросу об устойчивости нулевого решения $y(t) \equiv 0$ другой системы, получаемой из (2) заменой искомой функции $x - \varphi(t) = y$.

2. Исследование на устойчивость по первому приближению. Пусть $x_i(t) \equiv 0$ ($i = 1, \dots, n$) — решение системы (1). Чтобы его исследовать на устойчивость, надо выделить из функций f_i линейную часть вблизи точки $x_1 = \dots = x_n = 0$, например, по формуле Тейлора. Полученную систему часто можно исследовать с помощью следующей теоремы.

Теорема Ляпунова. Рассмотрим систему

$$\frac{dx_i}{dt} = a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n + \psi_i(t, x_1, \dots, x_n), \quad i = 1, \dots, n, \quad (4)$$

где a_{ik} — постоянные, а ψ_i — бесконечно малые выше первого порядка, точнее, при $|x| < \epsilon_0$

$$|\psi_i| \leq \gamma(x)|x|, \quad i = 1, \dots, n, \quad \gamma(x) \rightarrow 0 \text{ при } |x| \rightarrow 0, \quad (5)$$

где $|x| = \sqrt{|x_1|^2 + \dots + |x_n|^2}$.

Тогда если все собственные значения матрицы (a_{ik}) , $i, k = 1, \dots, n$, имеют отрицательные вещественные части, то нулевое решение системы (4) асимптотически устойчиво; если же хоть одно собственное значение имеет положительную вещественную часть, то нулевое решение неустойчиво.

Пример. Исследовать на устойчивость нулевое решение системы

$$\begin{cases} \dot{x} = \sqrt{4+4y} - 2e^{x+y}, \\ \dot{y} = \sin ax + \ln(1-4y), \quad a = \text{const.} \end{cases}$$

Выделяя линейную часть функций по формуле Тейлора, получаем

$$\begin{cases} \dot{x} = -2x - y + \psi_1(x, y), \\ \dot{y} = ax - 4y + \psi_2(x, y), \end{cases}$$

где функции ψ_1 и ψ_2 равны $O(x^2 + y^2)$ и, значит, удовлетворяют условию (5). Находим собственные значения матрицы коэффициентов

$$\begin{vmatrix} -2-\lambda & -1 \\ a & -4-\lambda \end{vmatrix} = 0, \quad \lambda^2 + 6\lambda + 8 + a = 0, \\ \lambda_{1,2} = -3 \pm \sqrt{1-a}.$$

При $a > 1$ корни комплексные, $\operatorname{Re} \lambda_{1,2} = -3 < 0$, а при $-8 < a \leq 1$ корни вещественные отрицательные, значит, в этих случаях нулевое решение асимптотически устойчиво.

При $a < -8$ один корень положителен, значит, нулевое решение неустойчиво.

При $a = -8$ имеем $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = -6$ и вопрос об устойчивости не решается с помощью изложенной теоремы.

3. Исследование на устойчивость с помощью функции Ляпунова. Производной от функции $v(t, x_1, \dots, x_n)$ в силу системы (1) называется функция

$$\left. \frac{dv}{dt} \right|_{(1)} = \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial v}{\partial x_1} f_1 + \dots + \frac{\partial v}{\partial x_n} f_n,$$

где f_1, \dots, f_n — правые части системы (1).

Теорема Ляпунова. Если существует дифференцируемая функция $v(x_1, \dots, x_n)$, удовлетворяющая в области $|x| < \varepsilon_0$ условиям

$$1) v > 0 \text{ при } x \neq 0, v(0) = 0,$$

$$2) \left. \frac{dv}{dt} \right|_{(1)} \leq 0 \text{ при } |x| < \varepsilon_0, t > t_0,$$

то нулевое решение системы (1) устойчиво по Ляпунову.

Если вместо условия 2) выполнено более сильное условие

$$3) \left. \frac{dv}{dt} \right|_{(1)} \leq -w(x) < 0 \text{ при } 0 < |x| < \varepsilon_0, t > t_0,$$

а функция $w(x)$ непрерывна при $|x| < \varepsilon_0$, то нулевое решение системы (1) асимптотически устойчиво.

Теорема Четаева. Пусть система (1) обладает нулевым решением. Пусть в некоторой области V пространства x_1, \dots, x_n существует дифференцируемая функция $v(x_1, \dots, x_n)$, причем

$$1) \text{ точка } x = 0 \text{ принадлежит границе области } V,$$

$$2) v = 0 \text{ на границе области } V \text{ при } |x| < \varepsilon_0,$$

$$3) \text{ в области } V \text{ при } t > t_0 \text{ имеем } v > 0, \left. \frac{dv}{dt} \right|_{(1)} \geq w(x) > 0,$$

функция $w(x)$ непрерывна.

Тогда нулевое решение системы (1) неустойчиво.

Не существует общего метода построения функции Ляпунова v (когда решение системы (1) неизвестно). В ряде случаев функцию Ляпунова удается построить в виде квадратичной формы $v = \sum_{i,j} b_{ij} x_i x_j$ или в виде суммы квадратичной формы и интегралов от нелинейных функций, входящих в правую часть данной системы.

4. Условия отрицательности всех вещественных частей корней уравнения

$$a_0 \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0, \quad a_0 > 0, \quad (6)$$

с вещественными коэффициентами.

а) Необходимо условие: все $a_i > 0$. В случае $n \leq 2$ это условие является и достаточным.

б) Условия Рауса — Гурвица: необходимо и достаточно, чтобы были положительными все главные диагональные

миноры матрицы Гурвица

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_3 & a_2 & a_1 & a_0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_5 & a_4 & a_3 & a_2 & a_1 & a_0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & a_n \end{pmatrix}.$$

На главной диагонали этой матрицы стоят числа $a_1, a_2, \dots, \dots, a_n$. В каждой строке индекс каждого числа на 1 меньше индекса предыдущего числа. Числа a_i с индексами $i > n$ или $i < 0$ заменяются нулями.

Главные диагональные миноры матрицы Гурвица:

$$\Delta_1 = a_1, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_0 \\ a_3 & a_2 \end{vmatrix}, \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_0 & 0 \\ a_3 & a_2 & a_1 \\ a_5 & a_4 & a_3 \end{vmatrix}, \dots \quad (7)$$

в) Условия Лъенара — Шипара. *Необходимо и достаточно, чтобы все $a_i > 0$ и чтобы $\Delta_{n-1} > 0, \Delta_{n-3} > 0, \Delta_{n-5} > 0, \dots$, где Δ_i те же, что в (7).*

Эти условия равносильны условиям Рауса — Гурвица, но удобнее, так как содержат меньше детерминантов.

Пример. При каких a и b корни уравнения $\lambda^4 + 2\lambda^3 + a\lambda^2 + 3\lambda + b = 0$ имеют отрицательные вещественные части?

Пишем условия Лъенара — Шипара:

$$a > 0, \quad b > 0, \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & a & 2 \\ 0 & b & 3 \end{vmatrix} = 6a - 4b - 9 > 0, \quad \Delta_1 = 2 > 0.$$

Отсюда получаем условия $b > 0, 6a > 4b + 9$.

г) Критерий Михайлова. *Необходимо и достаточно, чтобы на комплексной плоскости точка $f(i\omega)$, где $f(\lambda)$ — левая часть (6), при изменении ω от 0 до $+\infty$ не проходила через начало координат и сделала поворот вокруг него на угол $n\pi/2$ в положительном направлении.*

Другая (эквивалентная) формулировка критерия Михайлова: *Необходимо и достаточно, чтобы $a_n a_{n-1} > 0$ и чтобы корни многочленов*

$$p(\xi) = a_n - a_{n-2}\xi + a_{n-4}\xi^2 - \dots, \\ q(\eta) = a_{n-1} - a_{n-3}\eta + a_{n-5}\eta^2 - \dots$$

были все положительными, различными и чередующимися, начиная с корня ξ_1 , т. е.

$$0 < \xi_1 < \eta_1 < \xi_2 < \eta_2 < \dots$$

(Заметим, что многочлен (6) при $\lambda = i\omega$ равен $p(\omega^2) + i\omega q(\omega^2)$.)

Пример. $f(\lambda) = \lambda^5 + 2\lambda^4 + 7\lambda^3 + 8\lambda^2 + 10\lambda + 6$. Здесь $a_n = 6 > 0, a_{n-1} = 10 > 0$, а многочлены $p(\xi) = 6 - 8\xi + 2\xi^2, q(\eta) = 10 - 7\eta + \eta^2$ имеют корни $\xi_1 = 1, \xi_2 = 3, \eta_1 = 2, \eta_2 = 5$. Значит, $0 < \xi_1 < \eta_1 < \xi_2 < \eta_2$. По критерию Михайлова все корни многочлена $f(\lambda)$ имеют отрицательные вещественные части.

5. Условия устойчивости нулевого решения линейной системы с периодическими коэффициентами см. в [5], гл. III, § 16.

Задачи 881—898 решаются с помощью определения устойчивости.

881. Пользуясь определением устойчивости по Ляпунову, выяснить, устойчивы ли решения данных уравнений с указанными начальными условиями

а) $3(t-1)\dot{x} = x$, $x(2) = 0$. б) $\dot{x} = 4x - t^2x$, $x(0) = 0$.

в) $\dot{x} = t - x$, $x(0) = 1$. г) $2t\dot{x} = x - x^3$, $x(1) = 0$.

В задачах 882—888 начертить на плоскости x , y траектории данных систем вблизи точки $(0,0)$ и по чертежу выяснить, устойчиво ли нулевое решение.

882. $\dot{x} = -x$, $\dot{y} = -2y$. 883. $\dot{x} = x$, $\dot{y} = 2y$.

884. $\dot{x} = -x$, $\dot{y} = y$. 885. $\dot{x} = -y$, $\dot{y} = 2x^3$.

886. $\dot{x} = y$, $\dot{y} = -\sin x$. 887. $\dot{x} = y$, $\dot{y} = x^3(1+y^2)$.

888. $\dot{x} = -y \cos x$, $\dot{y} = \sin x$.

889. Траектории системы уравнений $\frac{dx}{dt} = P(x, y)$, $\frac{dy}{dt} = Q(x, y)$, где функции P , P'_x , P'_y , Q , Q'_x , Q'_y




Рис. 5

непрерывны, изображены на фазовой плоскости (рис. 5). Что можно сказать о поведении решений при $t \rightarrow +\infty$? Является ли нулевое решение асимптотически устойчивым? Является ли оно устойчивым по Ляпунову?

В задачах 890—892 выяснить, является ли устойчивым нулевое решение системы, если известно, что общее решение этой системы имеет указанный вид.

890. $x = C_1 \cos^2 t - C_2 e^{-t}$, $y = C_1 t^4 e^{-t} + 2C_2$.

891. $x = \frac{C_1 - C_2 t^2}{1 + t^2}$, $y = (C_1 t^3 + C_2) e^{-t}$.

892. $x = (C_1 - C_2 t) e^{-t}$, $y = \frac{C_1 \sqrt[3]{t}}{\ln(t^2 + 2)} + C_2$.

893. Доказать, что для устойчивости по Ляпунову нулевого решения уравнения $\frac{dx}{dt} = a(t)x$ (где функция $a(t)$ непрерывна) необходимо и достаточно, чтобы

$$\overline{\lim}_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t a(s) ds < +\infty.$$

894. Доказать, что если какое-нибудь одно решение линейной системы дифференциальных уравнений устойчиво по Ляпунову, то устойчивы все решения этой системы.

895. Доказать, что если каждое решение линейной однородной системы остается ограниченным при $t \rightarrow +\infty$, то нулевое решение устойчиво по Ляпунову.

896. Доказать, что если каждое решение линейной однородной системы стремится к нулю при $t \rightarrow +\infty$, то нулевое решение асимптотически устойчиво.

897. Доказать, что если линейная однородная система имеет хотя бы одно неограниченное при $t \rightarrow +\infty$ решение, то нулевое решение неустойчиво.

898. Устойчиво ли нулевое решение системы $\dot{x}_1 = a_{11}(t)x_1 + a_{12}(t)x_2$, $\dot{x}_2 = a_{21}(t)x_1 + a_{22}(t)x_2$, если известно, что $a_{11}(t) + a_{22}(t) \rightarrow b > 0$ при $t \rightarrow +\infty$?

В задачах 899—906 с помощью теоремы Ляпунова об устойчивости по первому приближению исследовать на устойчивость нулевое решение.

$$899. \begin{cases} \dot{x} = 2xy - x + y, \\ \dot{y} = 5x^4 + y^3 + 2x - 3y. \end{cases} \quad 900. \begin{cases} \dot{x} = x^2 + y^2 - 2x, \\ \dot{y} = 3x^2 - x + 3y. \end{cases}$$

$$901. \begin{cases} \dot{x} = e^{x+2y} - \cos 3x, \\ \dot{y} = \sqrt{4+8x} - 2e^y. \end{cases}$$

$$902. \begin{cases} \dot{x} = \ln(4y + e^{-3x}), \\ \dot{y} = 2y - 1 + \sqrt[3]{1-6x}. \end{cases}$$

$$903. \begin{cases} \dot{x} = \ln(3e^y - 2 \cos x), \\ \dot{y} = 2e^x - \sqrt[3]{8+12y}. \end{cases}$$

$$904. \begin{cases} \dot{x} = \operatorname{tg}(y-x), \\ \dot{y} = 2^y - 2 \cos\left(\frac{\pi}{3} - x\right). \end{cases}$$

$$905. \begin{cases} \dot{x} = \operatorname{tg}(z-y) - 2x, \\ \dot{y} = \sqrt{9+12x} - 3e^y, \\ \dot{z} = -3y. \end{cases} \quad 906. \begin{cases} \dot{x} = e^x - e^{-3x}, \\ \dot{y} = 4z - 3 \sin(x+y), \\ \dot{z} = \ln(1+z-3x). \end{cases}$$

В задачах 907—912 исследовать, при каких значениях параметров a и b асимптотически устойчиво нулевое решение.

$$907. \begin{cases} \dot{x} = ax - 2y + x^2, \\ \dot{y} = x + y + xy. \end{cases} \quad 908. \begin{cases} \dot{x} = ax + y + x^2, \\ \dot{y} = x + ay + y^2. \end{cases}$$

$$909. \begin{cases} \dot{x} = x + ay + y^2, \\ \dot{y} = bx - 3y - x^2. \end{cases} \quad 910. \begin{cases} \dot{x} = y + \sin x, \\ \dot{y} = ax + by. \end{cases}$$

$$911. \begin{cases} \dot{x} = 2e^{-x} - \sqrt{4+ay}, \\ \dot{y} = \ln(1 + 9x + ay). \end{cases} \quad 912. \begin{cases} \dot{x} = \ln(e + ax) - e^y, \\ \dot{y} = bx + \operatorname{tg} y. \end{cases}$$

913. Исследовать, устойчиво ли решение $x = -t^2$, $y = t$ системы

$$\dot{x} = y^2 - 2ty - 2y - x, \quad \dot{y} = 2x + 2t^2 + e^{2t-2y}.$$

914. Исследовать, устойчиво ли решение $x = \cos t$, $y = 2 \sin t$ системы

$$\begin{cases} \dot{x} = \ln\left(x + 2 \sin^2 \frac{t}{2}\right) - \frac{y}{2}, \\ \dot{y} = (4 - x^2) \cos t - 2x \sin^2 t - \cos^3 t. \end{cases}$$

В задачах 915—922 для данных систем найти все положения равновесия и исследовать их на устойчивость.

$$915. \begin{cases} \dot{x} = y - x^2 - x, \\ \dot{y} = 3x - x^2 - y, \end{cases} \quad 916. \begin{cases} \dot{x} = (x - 1)(y - 1), \\ \dot{y} = xy - 2. \end{cases}$$

$$917. \begin{cases} \dot{x} = y, \\ \dot{y} = \sin(x + y). \end{cases} \quad 918. \begin{cases} \dot{x} = \ln(y^2 - x), \\ \dot{y} = x - y - 1. \end{cases}$$

$$919. \begin{cases} \dot{x} = 3 - \sqrt{4 + x^2 + y}, \\ \dot{y} = \ln(x^2 - 3). \end{cases} \quad 920. \begin{cases} \dot{x} = e^y - e^x, \\ \dot{y} = \sqrt{3x + y^2} - 2. \end{cases}$$

$$921. \begin{cases} \dot{x} = \ln(1 + y + \sin x), \\ \dot{y} = 2 + \sqrt[3]{3 \sin x - 8}. \end{cases}$$

$$922. \begin{cases} \dot{x} = -\sin y, \\ \dot{y} = 2x + \sqrt{1 - 3x - \sin y}. \end{cases}$$

В задачах 923—931 исследовать устойчивость нулевого решения, построив функцию Ляпунова и применив теоремы Ляпунова или Четаева.

$$923. \begin{cases} \dot{x} = x^3 - y, \\ \dot{y} = x + y^3. \end{cases} \quad 924. \begin{cases} \dot{x} = y - x + xy, \\ \dot{y} = x - y - x^2 - y^3. \end{cases}$$

$$925. \begin{cases} \dot{x} = 2y^3 - x^5, \\ \dot{y} = -x - y^3 + y^5. \end{cases} \quad 926. \begin{cases} \dot{x} = xy - x^3 + y^3, \\ \dot{y} = x^2 - y^3. \end{cases}$$

$$927. \begin{cases} \dot{x} = y - 3x - x^3, \\ \dot{y} = 6x - 2y. \end{cases} \quad 928. \begin{cases} \dot{x} = 2y - x - y^3, \\ \dot{y} = x - 2y. \end{cases}$$

$$929. \begin{cases} \dot{x} = -x - xy, \\ \dot{y} = y^3 - x^3. \end{cases} \quad 930. \begin{cases} \dot{x} = x - y - xy^2, \\ \dot{y} = 2x - y - y^3. \end{cases}$$

$$931^*. \begin{cases} \dot{x} = -f_1(x) - f_2(y), \\ \dot{y} = f_3(x) - f_4(y), \end{cases}$$

где $\operatorname{sgn} f_i(z) = \operatorname{sgn} z$, $i = 1, 2, 3, 4$.

В задачах 932—948 исследовать устойчивость нулевого решения, пользуясь известными условиями отрицательности вещественных частей всех корней многочлена, например, условиями Рауса — Гурвица или критерием Михайлова.

$$932. y''' + y'' + y' + 2y = 0.$$

$$933. y''' + 2y'' + 2y' + 3y = 0.$$

$$934. y^{IV} + 2y''' + 4y'' + 3y' + 2y = 0.$$

$$935. y^{IV} + 2y''' + 3y'' + 7y' + 2y = 0.$$

$$936. y^{IV} + 2y''' + 6y'' + 5y' + 6y = 0.$$

$$937. y^{IV} + 8y''' + 14y'' + 36y' + 45y = 0.$$

$$938. y^{IV} + 13y''' + 16y'' + 55y' + 76y = 0.$$

$$939. y^{IV} + 3y''' + 26y'' + 74y' + 85y = 0.$$

$$940. y^{IV} + 3,1y''' + 5,2y'' + 9,8y' + 5,8y = 0.$$

$$941. y^V + 2y^{IV} + 4y''' + 6y'' + 5y' + 4y = 0.$$

$$942. y^V + 2y^{IV} + 5y''' + 6y'' + 5y' + 2y = 0.$$

$$943. y^V + 3y^{IV} + 6y''' + 7y'' + 4y' + 4y = 0.$$

$$944. y^V + 4y^{IV} + 9y''' + 16y'' + 19y' + 13y = 0.$$

945. $y^{\text{v}} + 4y^{\text{iv}} + 16y''' + 25y'' + 13y' + 9y = 0.$
 946. $y^{\text{v}} + 3y^{\text{iv}} + 10y''' + 22y'' + 23y' + 12y = 0.$
 947. $y^{\text{v}} + 5y^{\text{iv}} + 15y''' + 48y'' + 44y' + 74y = 0.$
 948. $y^{\text{v}} + 2y^{\text{iv}} + 14y''' + 36y'' + 23y' + 68y = 0.$

В задачах 949—958 исследовать, при каких значениях параметров a и b нулевое решение асимптотически устойчиво.

949. $y''' + ay'' + by' + 2y = 0.$
 950. $y''' + 3y'' + ay' + by = 0.$
 951. $y^{\text{iv}} + 2y''' + 3y'' + 2y' + ay = 0.$
 952. $y^{\text{iv}} + ay''' + y'' + 2y' + y = 0.$
 953. $ay^{\text{iv}} + y''' + y'' + y' + by = 0.$
 954. $y^{\text{iv}} + y''' + ay'' + y' + by = 0.$
 955. $y^{\text{iv}} + ay''' + 4y'' + 2y' + by = 0.$
 956. $y^{\text{iv}} + 2y''' + ay'' + by' + y = 0.$
 957. $y^{\text{iv}} + ay''' + 4y'' + by' + y = 0.$
 958. $y^{\text{iv}} + 2y''' + 4y'' + ay' + by = 0.$

Для исследования устойчивости уравнений с периодическими коэффициентами в задачах 959 и 960 надо найти матрицу монодромии и вычислить мультипликаторы, см. [5], гл. III, § 15, § 16.

959. Исследовать на устойчивость нулевое решение уравнения

$$\ddot{x} + p(t)x = 0, \quad p(t) = a^2 (0 < t < \pi),$$

$$p(t) = b^2 (\pi < t < 2\pi);$$

$p(t + 2\pi) \equiv p(t)$, при следующих значениях параметров:

- а) $a = 0,5, \quad b = 0;$ б) $a = 0,5, \quad b = 1;$
 в) $a = 0,5, \quad b = 1,5;$ г) $a = 0,75, \quad b = 0;$
 д) $a = 1, \quad b = 0;$ е) $a = 1, \quad b = 1,5.$

960. Исследовать, при каких a и b устойчиво нулевое решение системы с периодическими коэффициентами

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = A(t) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad A(t + 2) \equiv A(t),$$

$$A(t) = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ при } 0 < t < 1, \quad A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix} \text{ при } 1 < t < 2.$$

§ 16. ОСОБЫЕ ТОЧКИ

1. Особой точкой системы

$$\frac{dx}{dt} = P(x, y), \quad \frac{dy}{dt} = Q(x, y) \quad (1)$$

или уравнения

$$\frac{dy}{dx} = \frac{Q(x, y)}{P(x, y)}, \quad (2)$$

где функции P и Q непрерывно дифференцируемы, называется такая точка, в которой $P(x, y) = 0, Q(x, y) = 0$.

2. Для исследования особой точки системы

$$\frac{dx}{dt} = ax + by, \quad \frac{dy}{dt} = cx + dy \quad (3)$$

или уравнения

$$\frac{dy}{dx} = \frac{cx + dy}{ax + by} \quad \left(\frac{dx}{dy} = \frac{ax + by}{cx + dy} \right) \quad (4)$$

надо найти корни характеристического уравнения

$$\begin{vmatrix} a - \lambda & b \\ c & d - \lambda \end{vmatrix} = 0. \quad (5)$$

Если корни вещественные, различные и одного знака, то особая точка — узел (рис. 6а), если разных знаков — седло (рис. 6б),




Рис. 6

если корни комплексные с вещественной частью, отличной от нуля, то особая точка — фокус (рис. 6в), если чисто мнимые, — центр (рис. 6г); если корни равные и ненулевые (т. е. $\lambda_1 = \lambda_2 \neq 0$), то особая точка может быть вырожденным узлом (рис. 6д) или дикритическим узлом (рис. 6е), причем дикритический узел имеет место только в случае системы $\frac{dx}{dt} = ax$, $\frac{dy}{dt} = ay$ (или уравнения $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$), а во всех остальных случаях при $\lambda_1 = \lambda_2 \neq 0$ особая точка является вырожденным узлом.

Если же один или оба корня уравнения (5) равны нулю, то $\begin{vmatrix} a - b \\ c & d \end{vmatrix} = 0$ и, следовательно, дробь в правой части уравнения (4) сокращается. Уравнение принимает вид $\frac{dy}{dx} = k$, и ре-

нения на плоскости (x, y) изображаются параллельными прямыми; все точки линии $ax + by = 0$ — особые.

Чтобы начертить интегральные кривые уравнений (4) на плоскости (x, y) (т. е. траектории системы (3)) в случае узла, седла и вырожденного узла, надо прежде всего найти те решения, которые изображаются прямыми, проходящими через особую точку. Эти прямые всегда направлены вдоль собственных

векторов матрицы $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, составленной из коэффициентов данной системы (3). В случае узла кривые касаются той прямой, которая направлена вдоль собственного вектора, соответствующего меньшему по абсолютной величине значению λ .

В случае особой точки типа фокус надо определить направление закручивания траекторий. Для этого надо, во-первых, исследовать устойчивость этой точки по знаку $\operatorname{Re} \lambda$, и во-вторых, определить, в каком направлении вокруг особой точки происходит движение по траекториям. Для этого достаточно построить в какой-нибудь точке (x, y) вектор скорости $\left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}\right)$, определяемый по формулам (3).

Аналогично исследуется направление движения в случае вырожденного узла.

Пример 1. Исследовать особую точку $x = 0, y = 0$ системы

$$\dot{x} = 2x, \quad \dot{y} = x + y. \quad (6)$$

Составляем и решаем характеристическое уравнение

$$\begin{vmatrix} 2 - \lambda & 0 \\ 1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = 0, \quad (2 - \lambda)(1 - \lambda) = 0, \quad \lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 2.$$

Корни вещественные, различные и одного знака. Следовательно, особая точка — узел (того же типа, что на рис. 6а). Для

$\lambda_1 = 1$ находим собственный вектор $(0, 1)$, а для $\lambda_2 = 2$ — вектор $(1, 1)$. На плоскости x, y строим прямые, направленные вдоль этих векторов, а затем кривые, касающиеся в начале координат первой из этих прямых, так как $|\lambda_1| < |\lambda_2|$, см. рис. 7.

Другой способ построения интегральных кривых. Разделив одно из уравнений (6) на другое, получим уравнение вида (4)




Рис. 7

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x + y}{2x}$$

(или $\frac{dx}{dy} = \frac{2x}{x + y}$).

Прямые, проходящие через особую точку, ищем в виде $y = kx$ (а также $x = 0$). Подставляя в написанные уравнения, находим $k = 1$. Значит $y = x$ и $x = 0$ — искомые прямые. Остальные интегральные кривые строятся с помощью изоклин (рис. 7).

Пример 2. Исследовать особую точку уравнения

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4x - 3y}{x - 2y}. \quad (7)$$

Находим корни характеристического уравнения

$$\begin{vmatrix} 1 - \lambda & -2 \\ 4 & -3 - \lambda \end{vmatrix} = 0; \quad \lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0; \quad \lambda = -1 \pm 2i.$$

Особая точка — фокус. Переходим от уравнения (7) к системе

$$\frac{dx}{dt} = x - 2y, \quad \frac{dy}{dt} = 4x - 3y. \quad (8)$$

Строим в точке $(1, 0)$ вектор скорости $\left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}\right)$. В силу (8) он равен $(x - 2y, 4x - 3y)$. В точке $x = 1, y = 0$ получаем вектор $(1, 4)$ (рис. 8а). Следовательно, возрастая t соответствует движение по траекториям против часовой стрелки. Так как




Рис. 8

вещественная часть корней λ равна $-1 < 0$, то особая точка асимптотически устойчива, следовательно, при возрастании t решения неограниченно приближаются к особой точке. Итак, при движении против часовой стрелки траектории приближаются к началу координат (рис. 8б).

3. Для исследования особой точки более общей системы (1) или уравнения (2) надо перенести начало координат в исследуемую особую точку и разложить функции P и Q в окрестности этой точки по формуле Тейлора, ограничиваясь членами первого порядка. Тогда система (1) примет вид

$$\frac{dx_1}{dt} = ax_1 + by_1 + \varphi(x_1, y_1), \quad \frac{dy_1}{dt} = cx_1 + dy_1 + \psi(x_1, y_1), \quad (9)$$

где x_1, y_1 — новые координаты (после переноса), a, b, c, d — постоянные. Предположим, что для некоторого $\varepsilon > 0$

$$\frac{\varphi(x_1, y_1)}{r^{1+\varepsilon}} \rightarrow 0, \quad \frac{\psi(x_1, y_1)}{r^{1+\varepsilon}} \rightarrow 0 \quad \text{при } x_1 \rightarrow 0, \quad y_1 \rightarrow 0,$$

где $r = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$. Очевидно, это условие выполняется (при

любом $\varepsilon < 1$), если функции P и Q в исследуемой точке дважды дифференцируемы. Предположим еще, что вещественные части всех корней характеристического уравнения (5) отличны от нуля. Тогда особая точка $x_1 = 0, y_1 = 0$ системы (9) будет того же типа, что особая точка системы (3), получаемой отбрасыванием функций φ и ψ . Далее, угловые коэффициенты направлений, по которым траектории входят в особую точку, для систем (3) и (9) одни и те же (однако прямым $y = kx$ для системы (3) могут соответствовать кривые для системы (9)), а в случае фокуса — направление закручивания одно и то же.

В том случае, когда для системы (3) особая точка — центр, для системы (9) она может быть фокусом или центром. Для наличия центра достаточно (но не необходимо), чтобы траектории системы (9) имели ось симметрии, проходящую через исследуемую точку. Ось симметрии, очевидно, существует, если уравнение вида (2), к которому можно привести систему (9), не меняется от замены x на $-x$ (или y на $-y$). Для наличия фокуса необходимо и достаточно, чтобы нулевое решение системы (9) было асимптотически устойчиво при $t \rightarrow +\infty$ или при $t \rightarrow -\infty$. Исследование на устойчивость можно провести с помощью функции Ляпунова. Это сделать нелегко, так как в рассматриваемом случае функцию Ляпунова часто приходится брать в виде суммы членов второй, третьей и четвертой степеней относительно x, y .

В задачах 961—978 исследовать особые точки написанных ниже уравнений и систем. Начертить интегральные кривые (или траектории) на плоскости (x, y) .

$$961. y' = \frac{2x + y}{3x + 4y} \qquad 962. y' = \frac{x - 4y}{2y - 3x}.$$

$$963. y' = \frac{y - 2x}{y} \qquad 964. y' = \frac{x + 4y}{2x + 3y}.$$

$$965. y' = \frac{x - 2y}{3x - 4y} \qquad 966. y' = \frac{2x - y}{x - y}.$$

$$967. y' = \frac{y - 2x}{2y - 3x} \qquad 968. y' = \frac{4y - 2x}{x + y}.$$

$$969. y' = \frac{y}{x} \qquad 970. y' = \frac{4x - y}{3x - 2y}.$$

$$971. \begin{cases} \dot{x} = 3x, \\ \dot{y} = 2x + y. \end{cases} \qquad 972. \begin{cases} \dot{x} = 2x - y, \\ \dot{y} = x. \end{cases}$$

$$973. \begin{cases} \dot{x} = x + 3y, \\ \dot{y} = -6x - 5y. \end{cases} \qquad 974. \begin{cases} \dot{x} = x, \\ \dot{y} = 2x - y. \end{cases}$$

$$975. \begin{cases} \dot{x} = -2x - 5y, \\ \dot{y} = 2x + 2y. \end{cases} \qquad 976. \begin{cases} \dot{x} = 3x + y, \\ \dot{y} = y - x. \end{cases}$$

$$977. \begin{cases} \dot{x} = 3x - 2y, \\ \dot{y} = 4y - 6x. \end{cases} \quad 978. \begin{cases} \dot{x} = y - 2x, \\ \dot{y} = 2y - 4x. \end{cases}$$

В задачах 979—992 найти и исследовать особые точки данных уравнений и систем.

$$979. y' = \frac{2y - x}{3x + 6}. \quad 980. y' = \frac{2x + y}{x - 2y - 5}.$$

$$981. y' = \frac{4y^2 - x^2}{2xy - 4y - 8}. \quad 982. y' = \frac{2y}{x^2 - y^2 - 1}.$$

$$983. y' = \frac{x^2 + y^2 - 2}{x - y}. \quad 984. y' = \frac{y + \sqrt{1 + 2x^2}}{x + y + 1}.$$

$$985. \begin{cases} \dot{x} = x^2 - y, \\ \dot{y} = \ln(1 - x + x^2) - \ln 3. \end{cases} \quad 986. \begin{cases} \dot{x} = \ln(2 - y^2), \\ \dot{y} = e^x - e^y. \end{cases}$$

$$987. \begin{cases} \dot{x} = (2x - y)(x - 2), \\ \dot{y} = xy - 2. \end{cases} \quad 988. \begin{cases} \dot{x} = \sqrt{x^2 - y + 2} - 2, \\ \dot{y} = \operatorname{arctg}(x^2 + xy). \end{cases}$$

$$989. \begin{cases} \dot{x} = x^2 - y, \\ \dot{y} = x^2 - (y - 2)^2. \end{cases} \quad 990. \begin{cases} \dot{x} = \ln \frac{y^2 - y + 1}{3}, \\ \dot{y} = x^2 - y^2. \end{cases}$$

$$991. \begin{cases} \dot{x} = \ln(1 - y + y^2), \\ \dot{y} = 3 - \sqrt{x^2 + 8y}. \end{cases} \quad 992. \begin{cases} \dot{x} = \sqrt{(x - y)^2 + 3} - 2, \\ \dot{y} = e^{y^2 - x} - e. \end{cases}$$

Для уравнений 993—997 дать чертеж расположения интегральных кривых в окрестности начала координат.

Указание. В задачах 993—997 особые точки не принадлежат к рассмотренным в начале § 16 типам. Для их исследования можно построить несколько изоклин. Затем надо выяснить, с каких сторон интегральные кривые входят в особую точку.

$$993*. y' = \frac{xy}{x + y}. \quad 994*. y' = \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y}$$

$$995*. y' = \frac{2xy}{y + x^2}. \quad 996*. y' = \frac{xy}{y - x^2}.$$

$$997*. y' = \frac{y^2}{y + x^2}.$$

998. Доказать, что если особая точка уравнения

$$(ax + by)dx + (mx + ny)dy = 0$$

является центром, то это уравнение является уравнением в полных дифференциалах. Обратное неверно.

999*. Доказать, что если уравнение предыдущей задачи не является уравнением в полных дифференциалах, но имеет интегрирующий множитель, непрерывный в окрестности начала координат, то особая точка — седло (если $an \neq bm$).

1000*. Пусть в уравнении

$$y' = \frac{ax + by + p(x, y)}{cx + dy + q(x, y)} \quad (1)$$

функции p и q определены и непрерывно дифференцируемы в некоторой окрестности точки $(0, 0)$, а в самой точке $(0, 0)$ $p = p_x = p_y = q = q_x = q_y = 0$. Доказать, что если уравнение (1) не меняется от замены y на $-y$, а корни характеристического уравнения

$$\begin{vmatrix} c - \lambda & \bar{d} \\ a & b - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

чисто мнимы, то особая точка $(0, 0)$ — центр.

§ 17. ФАЗОВАЯ ПЛОСКОСТЬ

1. О понятиях фазового пространства, фазовой плоскости, автономной системы, траектории см. [1], гл. VII, § 1, п. 4 или [3], § 15 или [4], гл. 3, § 1.

2. Чтобы построить траектории системы

$$\dot{x} = f_1(x, y), \quad \dot{y} = f_2(x, y) \quad (1)$$

на фазовой плоскости x, y , можно или исследовать непосредственно эту систему, или, разделив одно уравнение на другое, свести ее к уравнению первого порядка

$$\frac{dy}{dx} = \frac{f_2(x, y)}{f_1(x, y)}. \quad (2)$$

Траектории системы (1) будут интегральными кривыми уравнения (2). Их можно построить или решив уравнение (2) (часто оно решается проще, чем система (1)), или с помощью метода изоклин (§ 1), при этом необходимо исследовать особые точки системы (методами § 16).

Для построения траекторий уравнения $\dot{x} = f(x, \dot{x})$ на фазовой плоскости надо от этого уравнения перейти к системе $\dot{x} = y, \dot{y} = f(x, y)$, которая исследуется так же, как система (1).

3. Предельным циклом называется замкнутая траектория, у которой существует окрестность, целиком заполненная траек-

ториями, неограниченно приближающимися к этой замкнутой траектории при $t \rightarrow +\infty$ или при $t \rightarrow -\infty$. Предельный цикл называется устойчивым, если траектории приближаются к нему только при $t \rightarrow +\infty$, неустойчивым — если только при $t \rightarrow -\infty$, полуустойчивым — если с одной стороны цикла траектории приближаются к нему при $t \rightarrow +\infty$, а с другой стороны при $t \rightarrow -\infty$. О предельных циклах см. [3], § 28, [2], § 25.

В задачах 1001—1020 для данных уравнений начертить траектории на фазовой плоскости. По чертежу сделать выводы о поведении решений при $t \rightarrow +\infty$.

- | | |
|--|--|
| 1001. $\ddot{x} + 4x = 0.$ | 1002. $\ddot{x} - x = 0.$ |
| 1003. $\ddot{x} - x + x^2 = 0.$ | 1004. $\ddot{x} - 3x^2 = 0.$ |
| 1005. $\ddot{x} + 2x^3 = 0.$ | 1006. $\ddot{x} + 2x^3 - 2x = 0.$ |
| 1007. $\ddot{x} + e^x - 1 = 0.$ | 1008. $\ddot{x} - 2^x + x + 1 = 0.$ |
| 1009. $\ddot{x} - \sin x = 0.$ | 1010. $\ddot{x} + 2 \cos x - 1 = 0.$ |
| 1011. $\ddot{x} - 4\dot{x} + 3x = 0.$ | 1012. $\ddot{x} + 2\dot{x} + 5x = 0.$ |
| 1013. $\ddot{x} - \dot{x} - 2x = 0.$ | 1014. $\ddot{x} + 2\dot{x} + \dot{x}^2 + x = 0.$ |
| 1015. $\ddot{x} + \dot{x} + 2x - x^2 = 0.$ | 1016. $\ddot{x} + \dot{x}^2 - x^2 + 1 = 0.$ |
| 1017. $\ddot{x} + 2\dot{x} - x^2 = 0.$ | 1018. $\ddot{x} + \sqrt{x^2 + \dot{x}^2} - 1 = 0.$ |
| 1019. $\ddot{x} + 5\dot{x} - 4 \ln \frac{x^2 + 1}{2} = 0.$ | |
| 1020. $\ddot{x} + \dot{x} + \arctg(x^2 - 2x) = 0.$ | |

В задачах 1021—1034 начертить на фазовой плоскости траектории данных систем и исследовать особые точки.

- | | |
|---|--|
| 1021. $\begin{cases} \dot{x} = 2x + y^2 - 1, \\ \dot{y} = 6x - y^2 + 1. \end{cases}$ | 1022. $\begin{cases} \dot{x} = y^2 - 4x^2, \\ \dot{y} = 4y - 8. \end{cases}$ |
| 1023. $\begin{cases} \dot{x} = 4 - 4x - 2y, \\ \dot{y} = xy. \end{cases}$ | 1024. $\begin{cases} \dot{x} = 1 - x^2 - y^2, \\ \dot{y} = 2x. \end{cases}$ |
| 1025. $\begin{cases} \dot{x} = 2 + y - x^2, \\ \dot{y} = 2x(x - y). \end{cases}$ | 1026. $\begin{cases} \dot{x} = xy - 4, \\ \dot{y} = (x - 4)(y - x). \end{cases}$ |
| 1027. $\begin{cases} \dot{x} = 1 - x^2 - y^2, \\ \dot{y} = 2xy. \end{cases}$ | 1028. $\begin{cases} \dot{x} = 2(x - 1)(y - 2), \\ \dot{y} = y^2 - x^2. \end{cases}$ |
| 1029. $\begin{cases} \dot{x} = (x + y)^2 - 1, \\ \dot{y} = -y^2 - x + 1. \end{cases}$ | 1030. $\begin{cases} \dot{x} = (2x - y)^2 - 9, \\ \dot{y} = 9 - (x - 2y)^2. \end{cases}$ |

$$1031. \begin{cases} \dot{x} = (2x - y)^2 - 9, \\ \dot{y} = (x - 2y)^2 - 9. \end{cases}$$

$$1032. \begin{cases} \dot{x} = x^2 + y^2 - 6x - 8y, \\ \dot{y} = x(2y - x + 5). \end{cases}$$

$$1033. \begin{cases} \dot{x} = x^2 - y, \\ \dot{y} = (x - y)(x - y + 2). \end{cases}$$

$$1034. \begin{cases} \dot{x} = x^2 + y^2 - 5, \\ \dot{y} = (x - 1)(x + 3y - 5). \end{cases}$$

1035. Вывести уравнение движения маятника без сопротивления. Для случая, когда все постоянные, входящие в уравнение, равны 1, начертить траектории на фазовой плоскости. Дать физическое истолкование траекториям различных типов.

1036. Вывести уравнение движения маятника с сопротивлением, пропорциональным квадрату скорости. Дать чертеж траекторий на фазовой плоскости.

У к а з а н и е. Воспользоваться чертежом, построенным для задачи 1035.

1037. Вывести уравнение движения маятника, на который действует постоянная сила, равная половине веса маятника и направленная всегда в одну сторону по касательной к дуге окружности, по которой движется маятник. Длина маятника равна l .

Приняв постоянные l и g равными 1, нарисовать траектории полученного уравнения на фазовой плоскости. Какие движения маятника изображаются траекториями различных типов?

1038. Груз массы m прикреплен к пружине. При отклонении груза на расстояние x пружина действует на него с силой kx , направленной к положению равновесия. Сила трения равна $f = \text{const}$ и направлена в сторону, противоположную скорости груза. При $t = 0$ груз находится на расстоянии h от положения равновесия и имеет нулевую скорость.

Вывести уравнение движения груза. Приняв $m = 2$, $k = 2$, $f = 1$, $h = 5$, изобразить движение груза на фазовой плоскости.

1039. Изобразить на фазовой плоскости малые колебания маятника переменной длины, считая, что при движении маятника вверх его длина равна l , а при движении вниз равна $L > l$. Во сколько раз увеличится амплитуда за одно полное колебание? (Пример: раскачка качелей.)

Указание. При малых колебаниях считать $\sin x \approx x$. Изменение длины маятника происходит мгновенно (скачком), при этом угол отклонения маятника и его момент количества движения относительно оси не испытывают скачков.

Начертить на фазовой плоскости траектории систем **1040—1046**, записанных в полярных координатах, и исследовать, имеются ли предельные циклы.

$$1040. \frac{dr}{dt} = r(1 - r^2), \quad \frac{d\varphi}{dt} = 1.$$

$$1041. \frac{dr}{dt} = r(r - 1)(r - 2), \quad \frac{d\varphi}{dt} = 1.$$

$$1042. \frac{dr}{dt} = r(1 - r)^2, \quad \frac{d\varphi}{dt} = 1.$$

$$1043. \frac{dr}{dt} = \sin r, \quad \frac{d\varphi}{dt} = 1.$$

$$1044. \frac{dr}{dt} = r(|r - 1| - |r - 2| - 2r + 3), \quad \frac{d\varphi}{dt} = 1.$$

$$1045. \frac{dr}{dt} = r \sin \frac{1}{r}, \quad \frac{d\varphi}{dt} = 1.$$

$$1046. \frac{dr}{dt} = r(1 - r) \sin \frac{1}{1 - r}, \quad \frac{d\varphi}{dt} = 1.$$

1047*. При каких условиях система

$$\frac{dr}{dt} = f(r), \quad \frac{d\varphi}{dt} = 1,$$

где функция $f(r)$ непрерывна, имеет предельный цикл? При каких условиях этот цикл устойчив? Неустойчив? Полуустойчив?

1048*. При каких значениях постоянной a система

$$\frac{d\varphi}{dt} = 1, \quad \frac{dr}{dt} = (r - 1)(a + \sin^2 \varphi)$$

имеет устойчивый предельный цикл? Неустойчивый?

Для уравнений **1049—1052** с помощью изоклин построить траектории на фазовой плоскости и исследовать особые точки. По чертежу сделать заключение о

поведении решений при $t \rightarrow +\infty$ и о возможности существования замкнутых траекторий.

1049. $\ddot{x} + \dot{x}^3 - \dot{x} + x = 0$. 1050. $\ddot{x} + (x^2 - 1)\dot{x} + x = 0$.

1051. $\ddot{x} + \dot{x} - 2 \operatorname{arctg} \dot{x} + x = 0$.

1052. $\ddot{x} + 2\dot{x} - \dot{x} + x = 0$.

1053*. Для уравнения $\ddot{x} + 2a\dot{x} - b \operatorname{sgn} \dot{x} + x = 0$ ($0 < a < 1$, $b > 0$) построить траектории на фазовой плоскости и найти точки, в которых предельный цикл пересекает ось Ox .

Указание. Найти зависимость между абсциссами двух последовательных пересечений траектории с осью Ox .

1054. Показать, что уравнение $\ddot{x} + F(\dot{x}) + x = 0$, где функция F непрерывна и $F'(y) > 0$ при $y > 0$, $F'(y) < 0$ при $y < 0$, не может иметь предельных циклов на фазовой плоскости.

Указание. Исследовать знак полной производной $\frac{d}{dt}(x^2 + y^2)$.

1055*. Пусть $f(x, y)$ и f'_x, f'_y непрерывны, $f(0, 0) < 0$, а при $x^2 + y^2 > b^2$ имеем $f(x, y) > 0$. Доказать, что уравнение $\ddot{x} + f(x, \dot{x})\dot{x} + x = 0$ имеет периодическое решение $x(t) \neq 0$.

Указание. Перейти на фазовую плоскость и исследовать знак полной производной $\frac{d}{dt}(x^2 + y^2)$. Построить кольцо, из которого не может выйти ни одна траектория. Применить теорему 21 из [3].

§ 18. ЗАВИСИМОСТЬ РЕШЕНИЯ ОТ НАЧАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ И ПАРАМЕТРОВ. ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

1. Рассмотрим систему в векторной записи

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x), \quad (1)$$

где $x = (x_1, \dots, x_n)$, $f = (f_1, \dots, f_n)$. Пусть в рассматриваемой области вектор-функция f непрерывна по t, x и удовлетворяет условию Липшица¹⁾ по x

$$\|f(t, y) - f(t, x)\| \geq k\|y - x\|. \quad (2)$$

¹⁾ Если в выпуклой по x области имеем $\left| \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right| \leq a$ ($i, j = 1, \dots, n$), то в этой области выполнено условие Липшица с $k = na$.

Через $\| \cdot \|$ обозначается любая из обычно применяемых норм вектора:

$$\|x\| = \sqrt{|x_1|^2 + \dots + |x_n|^2},$$

$$\|x\| = |x_1| + \dots + |x_n|$$

или

$$\|x\| = \max_{i=1, \dots, n} |x_i|.$$

Пусть $x(t)$ — решение системы (1), а $y(t)$ — вектор-функция, удовлетворяющая неравенствам

$$\left\| \frac{dy}{dt} - f(t, y) \right\| \leq \eta, \quad \|y(0) - x(0)\| \leq \delta.$$

Тогда имеет место оценка

$$\|x(t) - y(t)\| \leq \delta e^{k|t|} + \frac{\eta}{k} (e^{k|t|} - 1). \quad (3)$$

Это неравенство можно применять для грубой оценки ошибки приближенного решения $y(t)$ системы (1), а также для оценки сверху разности решения $x(t)$ системы (1) и решения $y(t)$ системы $\frac{dy}{dt} = g(t, y)$, если $\|g(t, y) - f(t, y)\| \leq \eta$.

2. Если в системе уравнений

$$\frac{dx_i}{dt} = f_i(t, x_1, \dots, x_n, \mu), \quad i = 1, \dots, n \quad (4)$$

с начальными условиями

$$x_i(0) = a_i(\mu), \quad i = 1, \dots, n \quad (5)$$

μ является параметром, функции f_i и a_i ($i = 1, \dots, n$) непрерывны и имеют непрерывные производные по x_1, \dots, x_n, μ , то решение имеет непрерывную производную по параметру μ . Производные $\frac{\partial x_i}{\partial \mu} = u_i, i = 1, \dots, n$ удовлетворяют линейной системе уравнений

$$\frac{du_i}{dt} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial x_j} u_j + \frac{\partial f_i}{\partial \mu}, \quad i = 1, \dots, n, \quad (6)$$

и начальным условиям $u_i(0) = a_i'(\mu), i = 1, \dots, n$. Значения производных $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$ и $\frac{\partial f_i}{\partial \mu}$ в формуле (6) берутся при $x_1 = x_1(t), \dots, x_n = x_n(t)$, где $x_1(t), \dots, x_n(t)$ — решение системы (4) с начальными условиями (5).

В частности, если положить $a_k(\mu) = \mu, a_i(\mu) = \text{const}$ при $i \neq k$ и считать, что все функции f_1, \dots, f_n не зависят от μ , то из предыдущего утверждения будет следовать, что для системы (4) с начальными условиями $x_i(0) = a_i, i = 1, \dots, n$ производные $\frac{\partial x_i}{\partial a_k} = u_i$ ($i = 1, \dots, n$) от компонент решения

x_1, \dots, x_n по начальному условию a_k существуют и удовлетворяют системе уравнений

$$\frac{du_i}{dt} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial x_j} u_j, \quad i = 1, \dots, n,$$

и начальным условиям $u_i(0) = 0$ при $i \neq k$, $u_k(0) = 1$.

3. Если в (4) и (5) функции f_i и a_i имеют непрерывные производные по x_1, \dots, x_n, μ (вблизи значения $\mu = 0$) до порядка m включительно, то решение тоже имеет непрерывные производные по μ до порядка m и, следовательно, разлагается по степеням параметра μ по формуле Тейлора:

$$x(t) = v_0(t) + \mu v_1(t) + \mu^2 v_2(t) + \dots + \mu^m v_m(t) + o(\mu^m). \quad (7)$$

Здесь x и v_i — n -мерные вектор-функции. Чтобы найти функции $v_i(t)$, можно разложить правые части в (4) и (5) по степеням μ , подставить туда разложение (7) и приравнять коэффициенты при одинаковых степенях μ . Получим систему дифференциальных уравнений, из которой последовательно определяются $v_0(t), v_1(t), \dots$.

В случае, когда f_i и a_i — аналитические функции от x_1, \dots, x_n, μ , решение $x(t)$ разлагается в сходящийся при малых μ степенной ряд по μ (в силу теоремы об аналитической зависимости решения от параметра, см. [4], гл. 1, § 6). Коэффициенты этого ряда совпадают с коэффициентами разложения (7).

Изложенный метод можно использовать для отыскания решения дифференциального уравнения при малых μ в тех случаях, когда при $\mu = 0$ уравнение решается известными методами.

Пример. Разложить по степеням параметра μ решение задачи

$$\dot{x} = x^2 + 2\mu t^{-1}, \quad x(1) = -1. \quad (8)$$

Ищем решение в виде $x(t) = v_0(t) + \mu v_1(t) + \mu^2 v_2(t) + \dots$

Подставляя это в (8) и приравнявая коэффициенты при одинаковых степенях μ , получаем систему

$$\begin{aligned} \dot{v}_0 &= v_0^2, & v_0(1) &= -1, \\ \dot{v}_1 &= 2v_0 v_1 + 2t^{-1}, & v_1(1) &= 0, \\ \dot{v}_2 &= 2v_0 v_2 + v_1^2, & v_2(1) &= 0, \\ & \dots & & \dots \end{aligned}$$

Из первого уравнения и начального условия находим $v_0(t) = -t^{-1}$. Подставляя это во второе уравнение, получаем

$$\dot{v}_1 = -2t^{-1}v_1 + 2t^{-1}, \quad v_1(1) = 0.$$

Отсюда

$$v_1(t) = 1 - t^{-2}.$$

Подставляя найденные v_0 и v_1 в третье уравнение, получаем

$$\dot{v}_2 = -2t^{-1}v_2 + (1 - t^{-2})^2, \quad v_2(1) = 0.$$

Решив это линейное уравнение и воспользовавшись начальным условием, найдем $v_2(t) = \frac{t}{3} - \frac{2}{t} + \frac{8}{3t^2} - \frac{1}{t^3}$. Следовательно, решение задачи (8) имеет вид

$$x(t) = -\frac{1}{t} + \mu \left(1 - \frac{1}{t^2}\right) + \mu^2 \left(\frac{t}{3} - \frac{2}{t} + \frac{8}{3t^2} - \frac{1}{t^3}\right) + o(\mu^2).$$

Это разложение можно продолжить дальше тем же способом. Аналогичным методом можно получать разложения по степеням параметра периодических решений нелинейных уравнений, в частности, уравнений вида

$$\ddot{x} + a^2x = \mu f(t, x, \dot{x}, \mu), \quad (9)$$

где функция f периодическая по t . Переходить от уравнения 2-го порядка к системе при этом не нужно. Произвольные постоянные, возникающие при отыскании $v_0(t)$, $v_1(t)$, ..., определяются уже не из начальных условий, а из условий периодичности (см. [4], гл. 2, § 8).

В случае, когда правая часть (9) не зависит от t , период решения $x(t)$ заранее не известен. Тогда в уравнении (9) надо перейти от t к новому независимому переменному $\tau = t(1 + b_1\mu + b_2\mu^2 + \dots)$ и искать решения $x(\tau)$ периода $2\pi/a$. Коэффициент b_1 обычно определяется из условия существования периодического решения для $v_1(\tau)$, и т. д. (см. [4], гл. 2, § 8).

4. Если функция $f(x, y)$ в окрестности точки (x_0, y_0) аналитическая, т. е. разлагается в ряд по степеням $(x - x_0)$ и $(y - y_0)$, то решение уравнения $y' = f(x, y)$ с начальным условием $y(x_0) = y_0$ тоже является аналитической функцией, т. е. разлагается в степенной ряд в окрестности точки x_0 (см. [2], § 18 и [1], гл. II, § 1, п. 6). Аналогичное утверждение справедливо для уравнения $y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ с начальными условиями $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_0', \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}$.

Пример. Найти в виде ряда решение уравнения $y'' = xy^2 - y'$ с начальными условиями $y(0) = 2, y'(0) = 1$.

Ищем решение в виде ряда

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots = 2 + x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots, \quad (10)$$

так как из начальных условий следует, что $a_0 = 2, a_1 = 1$. Подставляя ряд в дифференциальное уравнение, получим

$$\begin{aligned} 2a_2 + 6a_3x + 12a_4x^2 + \dots = \\ = x(2 + x + a_2x^2 + \dots)^2 - 1 - 2a_2x - 3a_3x^2 - \dots \end{aligned}$$

Представляя правую часть в виде степенного ряда и приравнявая коэффициенты при одинаковых степенях x в обеих частях уравнения, получим $2a_2 = -1, 6a_3 = 4 - 2a_2, 12a_4 = 4 - 3a_3, \dots$ Отсюда найдем

$$a_2 = -\frac{1}{2}, \quad a_3 = \frac{5}{6}, \quad a_4 = \frac{1}{8}, \quad \dots$$

Следовательно,

$$y = 2 + x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{6}x^3 + \frac{1}{8}x^4 + \dots$$

5. Для уравнения

$$p_0(x)y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_n(x)y = 0, \quad (11)$$

у которого все $p_i(x)$ аналитические в окрестности точки x_0 и $p_0(x_0) = 0$, т. е. коэффициент при старшей производной обращается в нуль в точке x_0 , решений в виде степенного ряда может не существовать. В этом случае могут существовать решения в виде обобщенных степенных рядов

$$a_0(x - x_0)^r + a_1(x - x_0)^{r+1} + a_2(x - x_0)^{r+2} + \dots, \quad (12)$$

где число r не обязательно целое (см. [1], гл. VI, § 2, п. 2, или [4], гл. 2, § 7). Чтобы их найти, надо подставить ряд (12) в уравнение (11) и, приравняв коэффициенты при наименьшей степени $(x - x_0)$, найти возможные значения показателя r , а затем для каждого из этих значений r определить коэффициенты a_i .

1056. Оценить, на сколько может измениться при $0 \leq x \leq 1$ решение уравнения $y' = x + \sin y$ с начальным условием $y(0) = y_0 = 0$, если число y_0 изменить меньше, чем на 0,01.

1057. Оценить, на сколько может измениться при $0 \leq t \leq T$ решение уравнения маятника $\ddot{x} + \sin x = 0$ с начальными условиями $x(0) = 0$, $\dot{x}(0) = 0$, если в правую часть уравнения добавить такую функцию $\varphi(t)$, что $|\varphi(t)| \leq 0,1$ (т. е. если приложить некоторую внешнюю силу).

1058. Чтобы приближенно найти решение уравнения $\ddot{x} + \sin x = 0$, его заменили уравнением $\ddot{x} + x = 0$. Оценить при $0 \leq t \leq 2$ возникающую от этого ошибку в решении с начальными условиями $x(0) = 0,25$, $\dot{x}(0) = 0$, если известно, что $|x - \sin x| < 0,003$ при $|x| \leq 0,25$.

В задачах **1059—1063** оценить ошибку приближенного решения на указанном отрезке.

1059. $y' = \frac{x}{4} - \frac{1}{1+y^2}$, $y(0) = 1$; $\tilde{y} = 1 - \frac{x}{2}$, $|x| \leq \frac{1}{2}$.

1060. $\dot{x} = x - y$, $\dot{y} = tx$, $x(0) = 1$, $y(0) = 0$; $\tilde{x} = 1 + t + \frac{t^2}{2}$, $\tilde{y} = \frac{t^2}{2}$, $|t| \leq 0,1$.

1061. $y'' - x^2y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$; $\tilde{y} = e^{\frac{x^4}{12}}$, $|x| \leq 0,5$.

1062. $y' = \frac{1}{y} + x$, $y(0) = 1$; $\tilde{y} = 1 + x$, $0 \leq x \leq \frac{1}{4}$.

1063. $y' = 2xy^2 + 1$, $y(0) = 1$; $\tilde{y} = \frac{1}{1-x}$, $|x| \leq \frac{1}{4}$.

Указание. Сначала выделить ограниченную область, в которой содержится приближенное решение \tilde{y} и, предположительно, точное решение y . Для этой области оценить постоянно в условии Липшица, затем оценить $|y - \tilde{y}|$. С помощью этой оценки проверить, содержится ли y в выделенной области.

В задачах 1064—1073 найти производные по параметру или по начальным условиям от решений данных уравнений и систем.

1064. $y' = y + \mu(x + y^2)$, $y(0) = 1$; найти $\frac{\partial y}{\partial \mu} \Big|_{\mu=0}$.

1065. $y' = 2x + \mu y^2$, $y(0) = \mu - 1$; найти $\frac{\partial y}{\partial \mu} \Big|_{\mu=0}$.

1066. $y' = y + y^2 + xy^3$, $y(2) = y_0$; найти; $\frac{\partial y}{\partial y_0} \Big|_{y_0=0}$.

1067. $\frac{dx}{dt} = \frac{x}{t} + \mu t e^{-x}$, $x(1) = 1$; найти $\frac{\partial x}{\partial \mu} \Big|_{\mu=0}$.

1068. $\frac{dx}{dt} = x^2 + \mu t x^3$, $x(0) = 1 + \mu$; найти $\frac{\partial x}{\partial \mu} \Big|_{\mu=0}$.

1069. $\begin{cases} \dot{x} = 4ty^2, \\ \dot{y} = 1 + 5\mu x, \end{cases} \quad x(0) = y(0) = 0$; найти $\frac{\partial x}{\partial \mu} \Big|_{\mu=0}$.

1070. $\begin{cases} \dot{x} = xy + t^2, \\ 2\dot{y} = -y^2, \end{cases} \quad x(1) = x_0, \quad y(1) = y_0$; найти $\frac{\partial x}{\partial y_0} \Big|_{\substack{x_0=3 \\ y_0=2}}$.

1071. $\begin{cases} \dot{x} = x + y, \\ \dot{y} = 2x + \mu y^2, \end{cases} \quad x(0) = 1 + \mu, \quad y(0) = -2$; найти $\frac{\partial y}{\partial \mu} \Big|_{\mu=0}$.

1072. $\ddot{x} - \dot{x} = (x + 1)^2 - \mu x^2$; $x(0) = \frac{1}{2}$, $\dot{x}(0) = -1$; найти $\frac{\partial x}{\partial \mu} \Big|_{\mu=1}$.

1073. $\ddot{x} = \frac{2}{t} - \frac{2}{x}$, $x(1) = 1$, $\dot{x}(1) = b$; найти $\frac{\partial x}{\partial b} \Big|_{b=1}$.

Указание. При $b = 1$ решением служит функция $x = t$.

В задачах 1074—1078 найти 2—3 члена разложения решения по степеням малого параметра μ ,

1074. $y' = 4\mu x - y^2$, $y(1) = 1$.

1075. $y' = \frac{2}{y} - 5\mu x$, $y(1) = 2$.

1076. $xy' = \mu x^2 + \ln y$, $y(1) = 1$.

1077. $y' = \frac{6\mu}{x} - y^2$, $y(1) = 1 + 3\mu$.

1078. $y' = e^{y-x} + \mu y$, $y(0) = -\mu$.

Для уравнений 1079—1085 с помощью метода малого параметра (см. [4], гл. 2, § 8) найти приближенно периодические решения с периодом, равным периоду правой части уравнения; μ — малый параметр.

$$1079. \ddot{x} + 3x = 2 \sin t + \mu x^2.$$

$$1080. \ddot{x} + 5x = \cos 2t + \mu x^2.$$

$$1081. \ddot{x} + 3x + x^3 = 2\mu \cos t.$$

$$1082. \ddot{x} + x^2 = 1 + \mu \sin t.$$

$$1083. \ddot{x} + \sin x = \mu \sin 2t.$$

1084*. $\ddot{x} + x = \sin 3t - \sin 2t + \mu x^2$; найти лишь нулевое приближение.

$$1085*. \ddot{x} + x = 6\mu \sin t - x^3.$$

В задачах 1086—1090 с помощью метода малого параметра (см. [4], гл. 2, § 8, п. 4) приближенно найти периодические решения данных уравнений.

$$1086. \ddot{x} + x - x^2 = 0. \quad 1087. \ddot{x} + x + x^3 = 0.$$

$$1088. \ddot{x} + \sin x = 0. \quad 1089. \ddot{x} + x = \mu(1 - x^2)\dot{x}.$$

$$1090. \ddot{x} + x = \mu(\dot{x} - \dot{x}^3).$$

В каждой из задач 1091—1097 найти в виде степенного ряда решение, удовлетворяющее данным начальным условиям. Вычислить несколько первых коэффициентов ряда (до коэффициента при x^4 включительно).

$$1091. y' = y^2 - x; y(0) = 1.$$

$$1092. y' = x + \frac{1}{y}; y(0) = 1.$$

$$1093. y' = y + xe^y; y(0) = 0.$$

$$1094. y' = 2x + \cos y; y(0) = 0.$$

$$1095. y' = x^2 + y^3; y(1) = 1.$$

$$1096. y'' = xy' - y^2; y(0) = 1, y'(0) = 2.$$

$$1097. y'' = y'^2 + xy; y(0) = 4, y'(0) = -2.$$

1098*. Построив мажорирующее уравнение (см. [2], § 18), оценить снизу радиус сходимости степенного ряда, представляющего решение уравнения $y' = y^2 - x$ с начальным условием $y(0) = 1$.

1099*. Оценить, с какой точностью можно получить при $|x| \leq 0,2$ решение уравнения $y' = e^y - x^2y$ с начальным условием $y(0) = 0$, если в степенном ряде, представляющем решение, взять только четыре члена (до a_4x^4 включительно).

В задачах 1100—1109 найти линейно независимые решения каждого из данных уравнений в виде степенных рядов. В тех случаях, когда это легко сделать,

сумму полученного ряда выразить с помощью элементарных функций.

1100. $y'' - x^2y = 0$. 1101. $y'' - xy' - 2y = 0$.
 1102. $(1 - x^2)y'' - 4xy' - 2y = 0$.
 1103. $(x^2 + 1)y'' + 5xy' + 3y = 0$.
 1104. $(1 - x)y'' - 2y' + y = 0$.
 1105. $(x^2 - x + 1)y'' + (4x - 2)y' + 2y = 0$.
 1106. $y'' - xy' + xy = 0$. 1107. $y'' + y \sin x = 0$.
 1108. $xy'' + y \ln(1 - x) = 0$.
 1109. $y''' - xy'' + (x - 2)y' + y = 0$.

В задачах 1110—1116 найти те решения данных уравнений, которые выражаются степенными (или обобщенными степенными) рядами.

1110. $xy'' + 2y' + xy = 0$.
 1111. $2x^2y'' + (3x - 2x^2)y' - (x + 1)y = 0$.
 1112. $9x^2y'' - (x^2 - 2)y = 0$.
 1113. $x^2y'' - x^2y' + (x - 2)y = 0$.
 1114. $x^2y'' + 2xy' - (x^2 + 2x + 2)y = 0$.
 1115. $xy'' - xy' - y = 0$. 1116. $xy'' + y' - xy = 0$.
 1117. Найти с точностью до $O(x^5)$ при $x \rightarrow 0$ решение уравнения $xy'' + y' - xy = 0$, линейно независимое с решением, указанным в ответе задачи 1116.

В задачах 1118—1120 указать, имеют ли данные уравнения решение в виде степенного ряда (или обобщенного степенного ряда).

1118. $x^2y'' + xy' - (x + 2)y = 0$.
 1119. $x^2y'' + xy' + (1 - x)y = 0$.
 1120. $x^2y'' + (3x - 1)y' + y = 0$.

В задачах 1121—1125 найти в виде тригонометрических рядов (см. [1], гл. VI, § 1, п. 3 или [4], гл. 2, § 7) периодические решения данных уравнений.

1121. $y'' - 3y = f(x)$, $f(x) = |x|$ при $|x| \leq \pi$,
 $f(x + 2\pi) = f(x)$.
 1122. $y'' + y' + y = |\sin x|$.
 1123. $y''' - y' - y = \frac{2 \sin x}{5 - 4 \cos x}$.

Указание. Разложение в ряд Фурье правой части уравнения 1123 имеет вид $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \sin nx$.

1124. $y'' - \pi^2 y = f(x)$, $f(x) = x(1-x)$ при $0 \leq x \leq 1$, $f(x+1) = f(x)$.

$$1125. y'' + 9y = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin 2kx}{k^2}.$$

В задачах 1126—1129 с помощью метода ломаных Эйлера (с итерациями или без них, см. [4], гл. 1, § 6, § 7) найти приближенно на указанном отрезке решения данных уравнений с указанными начальными условиями. Вычисления вести с двумя или тремя десятичными знаками после запятой с шагом $h=0,2$ или $h=0,1$.

$$1126. y' = y^2 + x, \quad 0 \leq x \leq 1; \quad y(0) = 0,3.$$

$$1127. y' = \frac{1}{y} + x, \quad 0 \leq x \leq 1; \quad y(0) = 1.$$

$$1128. y' = \frac{x}{y} - y, \quad 0 \leq x \leq 1; \quad y(0) = 1.$$

$$1129. y' = \frac{x^2}{x+y}, \quad 1 \leq x \leq 2; \quad y(1) = 0.$$

В задачах 1130—1135 с помощью метода Адамса или Штермера (см. [4], гл. 1, § 7) вычислить приближенно решения написанных ниже уравнений на указанном отрезке. Вычисления вести с тремя знаками после запятой. Значения решения в начальных точках вычислить с помощью степенного ряда.

$$1130. y' = y, \quad 0 \leq x \leq 1; \quad y(0) = 1.$$

$$1131. y' = y^2 - x, \quad 0 \leq x \leq 1; \quad y(0) = 0,5.$$

$$1132. y' = \frac{1}{y} - x, \quad 0 \leq x \leq 1; \quad y(0) = 1.$$

$$1133. y' = x^2 - y^2, \quad 1 \leq x \leq 2; \quad y(1) = 1.$$

$$1134. y'' = xy, \quad 0 \leq x \leq 1; \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

$$1135. xy'' + y' + xy = 0, \quad 0 \leq x \leq 1; \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

Задачи 1136—1140 можно решить, сравнивая наклон поля направлений (определяемого уравнением $y' = f(x, y)$) в точках некоторых кривых $y = \varphi_i(x)$ с наклоном этих кривых.

1136*. Оценить сверху и снизу решение уравнения $y' = 2 + \sin x - y^2$, $0 \leq x < +\infty$, $y(0) = 1$. (На плоскости x, y построить полосу $\alpha \leq y \leq \beta$, из которой не может выйти это решение.)

1137*. Оценить сверху и снизу решение уравнения $y' = \frac{1}{y} + 2x$, $0 \leq x < +\infty$, $y(0) = 1$.

1138*. Доказать, что решение уравнения $y' = x - y^2$ с начальным условием $y(4) = 2$ удовлетворяет неравенствам $\sqrt{x} - 0,07 < y(x) < \sqrt{x}$ при $4 < x < \infty$.

1139*. Доказать, что для решения $y(x)$ уравнения $y' = x - y^2$ с начальным условием $y(x_0) = y_0$, где $x_0 \geq 0$, $y_0 \geq 0$, имеем $y(x) - \sqrt{x} \rightarrow 0$ при $x \rightarrow +\infty$.

1140*. Оценить сверху и снизу то периодическое решение уравнения $y' = 2y^2 - \cos^2 5x$, которое лежит в области $y < 0$.

§ 19. НЕЛИНЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ

1. Систему дифференциальных уравнений можно свести путем исключения неизвестных к одному уравнению (иногда к нескольким уравнениям с одной неизвестной функцией в каждом). Подробнее см. [1], гл. VII, § 1, п. 2, или [4], гл. 3, § 2.

Пример 1. Решить систему уравнений

$$y' = \frac{z}{x}, \quad z' = \frac{(y-z)^2 + xz}{x^2}. \quad (1)$$

Решение. Исключаем z из данных уравнений. Из первого уравнения имеем $z = xy'$. Подставляя во второе уравнение, получим после упрощений

$$x^3 y'' = (y - xy')^2.$$

Данная система уравнений (1) приведена к одному уравнению второго порядка. Это уравнение может быть решено методами, изложенными в § 10 (путем понижения порядка). После того как из этого уравнения будет найдено y , следует найти z , пользуясь равенством $z = xy'$.

2. При решении системы уравнений путем исключения неизвестных обычно получается уравнение более высокого порядка, поэтому во многих случаях удобнее решать систему путем отыскания интегрируемых комбинаций (см. [1], гл. VII, § 5, п. 2).

Пример 2. Решить систему¹⁾

$$\frac{dx}{xz} = \frac{dy}{yz} = \frac{dz}{-xy}. \quad (2)$$

Первые две дроби образуют интегрируемую комбинацию. Сокращая равенство $\frac{dx}{xz} = \frac{dy}{yz}$ на $\frac{1}{z}$ и интегрируя, получим

¹⁾ Система (2) записана в симметрической форме. О симметрической форме системы дифференциальных уравнений см. [1], гл. VII, § 5, п. 1, или [4], гл. 3, § 3.

первый интеграл ¹⁾)

$$\frac{x}{y} = C_1. \quad (3)$$

Чтобы найти вторую интегрируемую комбинацию, воспользуемся следующим свойством равных дробей:

если $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n} = t$, то при любых k_1, k_2, \dots, k_n

имеем

$$\frac{k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_n a_n}{k_1 b_1 + k_2 b_2 + \dots + k_n b_n} = t.$$

Используя это свойство, получаем из (2)

$$\frac{y \cdot dx + x \cdot dy}{y \cdot xz + x \cdot yz} = \frac{dz}{-xy}; \quad \frac{d(xy)}{2xyz} = \frac{dz}{-xy}; \quad d(xy) = -2zdz.$$

Следовательно,

$$xy + z^2 = C_2. \quad (4)$$

Очевидно, первый интеграл (3) и первый интеграл (4) независимы. Система решена.

Вместо того чтобы искать вторую интегрируемую комбинацию, можно, воспользовавшись знанием первого интеграла (3), исключить из системы (2) одно из неизвестных, например, x . Из (3) имеем $x = C_1 y$. Подставляя во второе из уравнений (2), получим $\frac{dy}{yz} = \frac{dz}{-C_1 y^2}$. Отсюда $-C_1 y dy = z dz$; $z^2 = -C_1 y^2 + C_2$. Подставляя сюда выражение для C_1 из формулы (3), найдем еще один первый интеграл: $z^2 + xy = C_2$.

В задачах 1141—1160 решить данные системы уравнений.

$$1141. y' = \frac{x}{z}, \quad z' = -\frac{x}{y}. \quad 1142. y' = \frac{y^2}{z-x}, \quad z' = y + 1.$$

$$1143. y' = \frac{z}{x}, \quad z' = \frac{z(y + 2z - 1)}{x(y - 1)}.$$

$$1144. y' = y^2 z, \quad z' = \frac{z}{x} - yz^2.$$

$$1145. 2zy' = y^2 - z^2 + 1, \quad z' = z + y.$$

$$1146. \frac{dx}{2y-z} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{z}. \quad 1147. \frac{dx}{y} = \frac{dy}{x} = \frac{dz}{z}.$$

$$1148. \frac{dx}{y+z} = \frac{dy}{x+z} = \frac{dz}{x+y}.$$

$$1149. \frac{dx}{y-x} = \frac{dy}{x+y+z} = \frac{dz}{x-y}.$$

¹⁾ О первых интегралах см. [1], гл. VII, § 4 или [3], § 23.

$$1150. \frac{dx}{z} = \frac{dy}{u} = \frac{dz}{x} = \frac{du}{y}.$$

$$1151. \frac{dx}{y-u} = \frac{dy}{z-x} = \frac{dz}{u-y} = \frac{du}{x-z}.$$

$$1152. \frac{dx}{z} = \frac{dy}{xz} = \frac{dz}{y}. \quad 1153. \frac{dx}{z^2-y^2} = \frac{dy}{z} = \frac{dz}{x}.$$

$$1154. \frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{xy+z}. \quad 1155. \frac{dx}{xz} = \frac{dy}{yz} = \frac{dz}{xy\sqrt{z^2+1}}.$$

$$1156. \frac{dx}{x+y^2+z^2} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{z}.$$

$$1157. \frac{dx}{x(y+z)} = \frac{dy}{z(z-y)} = \frac{dz}{y(y-z)}.$$

$$1158. -\frac{dx}{x^2} = \frac{dy}{xy-2z^2} = \frac{dz}{xz}.$$

$$1159. \frac{dx}{x(z-y)} = \frac{dy}{y(y-x)} = \frac{dz}{y^2-xz}.$$

$$1160. \frac{dx}{x(y^2-z^2)} = -\frac{dy}{y(z^2+x^2)} = \frac{dz}{z(x^2+y^2)}.$$

В задачах 1161—1163 для данных систем дифференциальных уравнений и данных функций φ проверить, являются ли соотношения $\varphi = C$ первыми интегралами этих систем.

$$1161. \frac{dx}{dt} = \frac{x^2-t}{y}, \quad \frac{dy}{dt} = -x; \quad \varphi_1 = t^2 + 2xy; \quad \varphi_2 = x^2 - ty.$$

$$1162. \dot{x} = xy, \quad \dot{y} = x^2 + y^2; \quad \varphi_1 = x \ln y - x^2 y; \quad \varphi_2 = \frac{y^2}{x^2} - 2 \ln x.$$

$$1163. \frac{dx}{y} = -\frac{dy}{x} = \frac{dz}{u} = -\frac{du}{z}; \quad \varphi = yz - ux.$$

1164. Проверить, являются ли независимыми первые интегралы $\frac{x+y}{z+x} = C_1$, $\frac{z-y}{x+y} = C_2$ системы

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{z}.$$

1165*. Доказать, что в области, содержащей особую точку типа узла или фокуса, для системы

$$\frac{dx}{dt} = P(x, y), \quad \frac{dy}{dt} = Q(x, y)$$

надо найти два независимых первых интеграла системы

$$\frac{dx}{a_1} = \frac{dy}{a_2} = \frac{dz}{b}. \quad (8)$$

В эти первые интегралы

$$\Phi_1(x, y, z) = C_1, \quad \Phi_2(x, y, z) = C_2 \quad (9)$$

надо подставить вместо x, y, z их выражения (7) через параметр t . Получатся два уравнения вида

$$\Phi_1(t) = C_1, \quad \Phi_2(t) = C_2. \quad (10)$$

Исключив из них t , получим соотношение $F(C_1, C_2) = 0$. Подставив сюда вместо C_1 и C_2 левые части первых интегралов (9), получим искомое решение.

В том случае, когда в оба уравнения (10) не входит t , тогда линия (7) является интегральной кривой системы (8), т. е. характеристикой уравнения (6), и задача Коши имеет бесконечно много решений (см. [1], гл. VIII, § 3, п. 4).

Пример. Найти общее решение уравнения

$$xz \frac{\partial z}{\partial x} + yz \frac{\partial z}{\partial y} = -xy, \quad (11)$$

а также интегральную поверхность, проходящую через кривую

$$y = x^2, \quad z = x^3. \quad (12)$$

Решение. Составляем систему уравнений

$$\frac{dx}{xz} = \frac{dy}{yz} = \frac{dz}{-xy}.$$

и находим ее первые интегралы (см. § 19, пример 2)

$$\frac{x}{y} = C_1, \quad z^2 + xy = C_2. \quad (13)$$

Следовательно, общее решение уравнения (11) можно написать в неявном виде

$$F\left(\frac{x}{y}, z^2 + xy\right) = 0,$$

где F — произвольная функция. Так как z входит только в один из первых интегралов (13), то общее решение можно написать и в явном виде. Мы получим

$$z^2 + xy = f\left(\frac{x}{y}\right); \quad z = \pm \sqrt{f\left(\frac{x}{y}\right) - xy},$$

где f — произвольная функция.

Чтобы найти интегральную поверхность, проходящую через линию (12), запишем эту линию в параметрическом виде, например, взяв x в качестве параметра:

$$x = x, \quad y = x^2, \quad z = x^3.$$

Подставив эти выражения в (13), получим

$$\frac{1}{x} = C_1, \quad x^6 + x^3 = C_2.$$

Исключив x , получим

$$\frac{1}{C_1^6} + \frac{1}{C_1^3} = C_2.$$

Подставив вместо C_1 и C_2 левые части первых интегралов (13), найдем искомое решение

$$\left(\frac{y}{x}\right)^6 + \left(\frac{y}{x}\right)^3 = z^2 + xy.$$

3. О решении системы двух уравнений в частных производных первого порядка и о решении уравнения Пфаффа см. [1], гл. IX, § 1 и § 2, пп. 1, 2, 3.

Для каждого из уравнений 1167—1188 найти общее решение.

$$1167. y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = 0. \quad 1168. (x+2y) \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

$$1169. x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + z \frac{\partial u}{\partial z} = 0.$$

$$1170. (x-z) \frac{\partial u}{\partial x} + (y-z) \frac{\partial u}{\partial y} + 2z \frac{\partial u}{\partial z} = 0.$$

$$1171. y \frac{\partial z}{\partial x} + x \frac{\partial z}{\partial y} = x - y. \quad 1172. e^x \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = y e^x.$$

$$1173. 2x \frac{\partial z}{\partial x} + (y-x) \frac{\partial z}{\partial y} - x^2 = 0.$$

$$1174. xy \frac{\partial z}{\partial x} - x^2 \frac{\partial z}{\partial y} = yz.$$

$$1175. x \frac{\partial z}{\partial x} + 2y \frac{\partial z}{\partial y} = x^2 y + z.$$

$$1176. (x^2 + y^2) \frac{\partial z}{\partial x} + 2xy \frac{\partial z}{\partial y} + z^2 = 0.$$

$$1177. 2y^4 \frac{\partial z}{\partial x} - xy \frac{\partial z}{\partial y} = x \sqrt{z^2 + 1}.$$

$$1178. x^2 z \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 z \frac{\partial z}{\partial y} = x + y.$$

$$1179. yz \frac{\partial z}{\partial x} - xz \frac{\partial z}{\partial y} = e^z.$$

$$1180. (z-y)^2 \frac{\partial z}{\partial x} + xz \frac{\partial z}{\partial y} = xy.$$

$$1181. xy \frac{\partial z}{\partial x} + (x-2z) \frac{\partial z}{\partial y} = yz.$$

$$1182. y \frac{\partial z}{\partial x} + z \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{x}.$$

$$1183. \sin^2 x \frac{\partial z}{\partial x} + \operatorname{tg} z \frac{\partial z}{\partial y} = \cos^2 z.$$

$$1184. (x + z) \frac{\partial z}{\partial x} + (y + z) \frac{\partial z}{\partial y} = x + y.$$

$$1185. (xz + y) \frac{\partial z}{\partial x} + (x + yz) \frac{\partial z}{\partial y} = 1 - z^2.$$

$$1186. (y + z) \frac{\partial u}{\partial x} + (z + x) \frac{\partial u}{\partial y} + (x + y) \frac{\partial u}{\partial z} = u.$$

$$1187. x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + (z + u) \frac{\partial u}{\partial z} = xy.$$

$$1188. (u - x) \frac{\partial u}{\partial x} + (u - y) \frac{\partial u}{\partial y} - z \frac{\partial u}{\partial z} = x + y.$$

Найти решения уравнений 1189—1193, удовлетворяющие указанным условиям.

$$1189. x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = 0; \quad z = 2x \text{ при } y = 1.$$

$$1190. \frac{\partial z}{\partial x} + (2e^x - y) \frac{\partial z}{\partial y} = 0; \quad z = y \text{ при } x = 0.$$

$$1191. 2\sqrt{x} \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = 0; \quad z = y^2 \text{ при } x = 1.$$

$$1192. \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} + 2 \frac{\partial u}{\partial z} = 0; \quad u = yz \text{ при } x = 1.$$

$$1193. x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + xy \frac{\partial u}{\partial z} = 0; \quad u = x^2 + y^2 \text{ при } z = 0.$$

В задачах 1194—1210 найти поверхность, удовлетворяющую данному уравнению и проходящую через данную линию.

$$1194. y^2 \frac{\partial z}{\partial x} + xy \frac{\partial z}{\partial y} = x; \quad x = 0, \quad z = y^2.$$

$$1195. x \frac{\partial z}{\partial x} - 2y \frac{\partial z}{\partial y} = x^2 + y^2; \quad y = 1, \quad z = x^2.$$

$$1196. x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z - xy; \quad x = 2, \quad z = y^2 + 1.$$

$$1197. \operatorname{tg} x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z; \quad y = x; \quad z = x^3.$$

$$1198. x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = z^2(x - 3y); \quad x = 1, \quad yz + 1 = 0.$$

$$1199. x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z - x^2 - y^2; y = -2, z = x - x^2.$$

$$1200. yz \frac{\partial z}{\partial x} + xz \frac{\partial z}{\partial y} = xy; x = a, y^2 + z^2 = a^2.$$

$$1201. z \frac{\partial z}{\partial x} - xy \frac{\partial z}{\partial y} = 2xz; x + y = 2, yz = 1.$$

$$1202. z \frac{\partial z}{\partial x} + (z^2 - x^2) \frac{\partial z}{\partial y} + x = 0; y = x^2, z = 2x.$$

$$1203. (y - z) \frac{\partial z}{\partial x} + (z - x) \frac{\partial z}{\partial y} = x - y; z = y = -x.$$

$$1204. x \frac{\partial z}{\partial x} + (xz + y) \frac{\partial z}{\partial y} = z; x + y = 2z, xz = 1.$$

$$1205. y^2 \frac{\partial z}{\partial x} + yz \frac{\partial z}{\partial y} + z^2 = 0; x - y = 0, x - yz = 1.$$

$$1206. x \frac{\partial z}{\partial x} + z \frac{\partial z}{\partial y} = y; y = 2z, x + 2y = z.$$

$$1207. (y + 2z^2) \frac{\partial z}{\partial x} - 2x^2z \frac{\partial z}{\partial y} = x^2; x = z, y = x^2.$$

$$1208. (x - z) \frac{\partial z}{\partial x} + (y - z) \frac{\partial z}{\partial y} = 2z; x - y = 2, z + 2x = 1.$$

$$1209. xy^3 \frac{\partial z}{\partial x} + x^2z^2 \frac{\partial z}{\partial y} = y^3z; x = -z^3, y = z^2.$$

$$1210*. x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = 2xy; y = x, z = x^2.$$

1211. Найти общее уравнение поверхностей, пересекающих под прямым углом поверхности семейства

$$z^2 = Cxy.$$

1212. Найти поверхность, проходящую через прямую

$$y = x, z = 1$$

и ортогональную к поверхностям

$$x^2 + y^2 + z^2 = Cx.$$

1213. Написать уравнение в частных производных, которому удовлетворяют цилиндрические поверхности с образующими, параллельными вектору (a, b, c) . Найти общее решение этого уравнения.

1214. Пользуясь результатом предыдущей задачи, найти уравнение цилиндрической поверхности с образующими, параллельными вектору $(1, -1, 1)$,

и направляющей

$$x + y + z = 0, \quad x^2 + xy + y^2 = 1.$$

1215. Написать уравнение в частных производных, которому удовлетворяют все конические поверхности с вершиной в данной точке (a, b, c) , и решить его.

1216. Найти поверхности, у которых любая касательная плоскость пересекает ось Ox в точке с абсциссой, вдвое меньшей абсциссы точки касания.

В задачах **1217—1219** решить данные системы уравнений

$$1217. \begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{z}{x}, \\ \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2z}{y}. \end{cases} \quad 1218. \begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = y - z, \\ \frac{\partial z}{\partial y} = xz. \end{cases}$$

$$1219. \begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2yz - z^2, \\ \frac{\partial z}{\partial y} = xz. \end{cases}$$

В задачах **1220—1223** найти поверхности, удовлетворяющие данным уравнениям Пфаффа.

$$1220. (x - y) dx + z dy - x dz = 0.$$

$$1221. 3yz dx + 2xz dy + xy dz = 0.$$

$$1222. (z + xy) dx - (z + y^2) dy + y dz = 0.$$

$$1223. (2yz + 3x) dx + xz dy + xy dz = 0.$$

ОТВЕТЫ

15. $f(x, y) = 0$; $f'_x < 0$ (max), $f'_x > 0$ (min). 16. а) $y = x^2 + 2x$; б) $x = 2 \operatorname{ch} y$; в) $xy^3 = -(1 - x^2)^2$; $y = 0$; г) $f'_x + f \times \times f'_y = 0$. 17. $y = e^{x y' / y}$. 18. $y' = 3y^{2/3}$. 19. $xy' = 3y$. 20. $y^2 + y'^2 = 1$. 21. $x^2 y' - xy = yy'$. 22. $2xyy' - y^2 = 2x^3$. 23. $y'^3 = = 4y(xy' - 2y)$. 24. $y' = \cos \frac{x \sqrt{1 - y'^2}}{y}$. 25. $x(x - 2)y' - - (x^2 - 2)y' + 2(x - 1)y = 0$. 26. $(yy'' + y'^2)^2 = -y^3 y''$. 27. $y'' y^2 (\ln y - 1) = y'^2 (xy' - y)$. 28. $x^3 y''' - 3x^2 y'' + 6xy' - - 6y = 0$. 29. $y''' y' = 3y'^2$. 30. $(y - 2x)^2 (y'^2 + 1) = (2y'^2 + + 1)^2$. 31. $xy'^2 = y(2y' - 1)$. 32. $(xy' - y)^2 = 2xy(y'^2 + 1)$. 33. $x^2 y'' - 2xy' + 2y = 0$. 34. $(y'' y + y'^2 + 1)^2 = (y'^2 + 1)^3$. 35. $yy' + zz' = 0$, $y^2 + 2xzz' = x^2 z'^2$. 36. $x^2 + y^2 = z^2 - - 2z(y - xy')$; $x + yy' = zz' - z'(y - xy')$. 37. $4yy' = -x$. 38. $y' = -2y$. 39. $(x^2 + y)y' = -x$. 40. $(x + y)y' = y - x$; $(x - y)y' = x + y$. 41. $(x \mp y \sqrt{3})y' = y \pm x \sqrt{3}$. 42. $(3x \mp \mp y \sqrt{3})y' = y \mp 3x \sqrt{3}$. 43. $(2x \mp y \sqrt{3})y' = y \pm 2x \sqrt{3}$. 44. $r' \sin \theta = r^2$. 45. $r' = \frac{1}{2} r \operatorname{ctg} \theta$. 46. $r' = r \operatorname{ctg} (\theta \pm 45^\circ)$. 47. $(x + 2y)y' = -3x - y$; $(3x + 2y)y' = y - x$. 48. $y' [2xy \pm \pm (x^2 - y^2)] = y^2 - x^2 \pm 2xy$. 49. $x(1 + y'^2) = -2yy'$. 50. $yy'^3 + xy'^2 = -1$. 51. $y = C(x + 1)e^{-x}$; $x = -1$. 52. $\ln |x| = = C + \sqrt{y^2 + 1}$; $x = 0$. 53. $y (\ln |x^2 - 1| + C) = 1$, $y = 0$; $y [\ln (1 - x^2) + 1] = 1$. 54. $y = 2 + C \cos x$; $y = 2 - 4 \cos x$. 55. $y = (x - C)^3$; $y = 0$; $y = (x - 2)^3$; $y = 0$. 56. $y(1 - Cx) = = 1$; $y = 0$; $y(1 + x) = 1$. 57. $y^2 - 2 = Ce^{1/x}$. 58. $(Ce^{-x^2} - - 1)y = 2$; $y = 0$. 59. $e^{-s} = 1 + Ce^t$. 60. $z = -\lg (C - 10^x)$. 61. $x^2 + t^2 - 2t = C$. 62. $\operatorname{ctg} \frac{y - x}{2} = x + C$; $y - x = 2\pi k$, $k = 0$; ± 1 , ± 2 , ... 63. $2x + y - 1 = Ce^x$. 64. $\frac{x + 2y}{x + 2} = Ce^y$; $x + 2y + 2 = 0$. 65. $\sqrt{4x + 2y - 1} - - 2 \ln(\sqrt{4x + 2y - 1} + 2) = x + C$. 66. $y = \operatorname{arctg} \left(1 - \frac{2}{x}\right) + + 2\pi$. 67. $y = 2$. 68. а) $2y^2 + x^2 = C$; б) $y^2 + 2x = C$; в) $y^2 = = Ce^{x^2 + y^2}$. 71. $(C \pm x)y = 2a^2$. 72. $\frac{b \ln y - y}{y} = \pm x + C$, $0 < y < b$. 73. $a \ln (a \pm \sqrt{a^2 - y^2}) \mp \sqrt{a^2 - y^2} = x + C$.

74. $y = Cx^2$. 75. $y = Cx^2$; $y^2 = Cx$. 76. $r(1 \pm \cos \varphi) = C$. 77. Количество азота (в литрах) $x(t) = 20 - 4e^{-t/200}$; $x(t) = 19,8$ при $t = 200 \ln 20 \approx 600$ с = 10 мин. 78. Количество соли $x(t) = 10e^{-t/20}$; $x(60) = 10e^{-3} \approx 0,5$ кг. 79. Объем CO_2 (в м^3) $x(t) = 0,08 + 0,22e^{-t/10}$; $x(t) = 0,1$ при $t = 10 \ln 11 \approx 24$ мин. 80. Температура тела $x(t) = 20 + 80 \cdot 2^{-t/10}$; $x(t) = 25$ при $t = 40$ мин. 81. Разность температур воды и предмета $x(t) = 55 \times (3/5)^t$; $x(t) = 1$ при $t = \ln 55 / (\ln 5 - \ln 3) \approx 8$ мин. 82. Температура металла $x(t) = a + \frac{b-a}{60} \left(t - \frac{1-e^{-kt}}{k} \right)$; $x(60) = b - \frac{b-a}{60k} (1 - e^{-60k})$. 83. Скорость (в м/с) $v(t) = (2/3)^{(t/4)-1}$; $v(t) = 0,01$ при $t = 4 \left(\frac{2}{\lg 1,5} + 1 \right) \approx 50$ с; путь $s = \frac{6}{\ln 1,5} \approx 15$ м. 84. Оставшееся количество вещества $x(t) = x(0) \cdot 2^{-t/30}$; $x(t) = 0,01x(0)$ при $t = 60/\lg 2 \approx 200$ дней. 85. Оставшееся количество радия $x(t) = x(0) \cdot (1 - 0,00044)^t$; $x(t) = \frac{1}{2} x(0)$ при $t = (\ln 0,5) / \ln (1 - 0,00044) \approx 1600$ лет. 86. Количество урана $x(t) = x(0)e^{-\alpha t}$, $\alpha = \ln 2 / (4,5 \cdot 10^9)$; $x(t) = 100$, $x = 100 + 14 \cdot \frac{238}{206} = 116,2$; $t = 4,5 \cdot 10^9 \cdot \frac{\lg 1,162}{\lg 2} \approx 970 \cdot 10^6$ лет. 87. Количество света, прошедшего через слой в x см, $y(x) = y(0) \cdot 2^{-x/36}$; $y(200) = y(0) \cdot 2^{-40/7} \approx 0,02y(0)$; поглощается $100\% - 2\% = 98\%$. 88. Скорость $v(t) = 50 \operatorname{th} \frac{t}{5}$, путь (в метрах) $s(t) = 250 \ln \operatorname{ch} \frac{t}{5}$; $s(t) = 1000$ при $\operatorname{ch} \frac{t}{5} = e^t$, $t \approx 5(4 + \ln 2) \approx 23$ с. 89. Скорость $v(t) = \sqrt{\frac{g}{k}} \operatorname{tg} \sqrt{kg}(C - t)$, $g = 10$, $k = 0,012$, $C = \frac{1}{\sqrt{kg}} \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{k}{g}} v(0) \approx 1,75$; $v(t) = 0$ при $t = C \approx 1,75$ с; наибольшая высота $h = \frac{1}{2k} \ln \left(\frac{k}{g} v^2(0) + 1 \right) \approx 16,3$ м (без сопротивления воздуха $t = 2$ с, $h = 20$ м). 90. Скорость $v(t) = \sqrt{\frac{g}{k}} \operatorname{th} \sqrt{kg}t$, путь $s(t) = \frac{1}{k} \ln \operatorname{ch} \sqrt{kg}t$; $s(t) = h = 16,3$ м при $t = \frac{1}{\sqrt{kg}} \ln (e^{hh} + \sqrt{e^{2kh} - 1}) \approx 1,87$ с, $v(t) = \sqrt{\frac{g}{k} (1 - e^{-2kh})} \approx 16,4$ м/с. 91. Высота уровня воды $h(t)$; $\sqrt{H} - \sqrt{h} = 0,3 \sqrt{2g} \frac{r^2}{R^2} t$; $h(t) = 0$ при $t = \frac{R^2}{0,3r^2} \sqrt{\frac{H}{2g}} \approx 1050$ с = 17,5 мин. 92. $(2R - h(t))^{3/2} = 0,45\pi r^2 \sqrt{2g} \frac{t}{H}$, $h(t) = 0$ при $t = \frac{2RH}{0,45\pi r^2} \sqrt{\frac{R}{g}} \approx 1040$ с. 93. $\sqrt{H} - \sqrt{h(t)} = kt$,

- $k = \frac{\sqrt{H}}{5} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$; $h(t) = 0$ при $t = 5(2 + \sqrt{2}) \approx 17$ мин.
94. $H^{5/2} - [h(t)]^{5/2} = \frac{3d^2 H^2 t}{8R^2} \sqrt{2g}$; $h(t) = 0$ при $t = (4R^2/3d^2) \times \sqrt{2H/g} \approx 27$ с.
95. Объем воды в баке в литрах $x(t)$; $t = \frac{2q}{a^2} \ln \frac{q}{q - a\sqrt{x}} - \frac{2}{a} \sqrt{x}$, $q = 1,8$, $a = 10^{-3/2}$; $x(t) = 360$ при $t = 260$ с (для бака без отверстия в дне $t = 200$ с).
96. Удлинение нижнего куска длины x равно $y(x) = \frac{kPx^2}{2l}$, а всего шнура $y(l) = \frac{kPl}{2}$.
97. На высоте h км давление $p(h) = e^{-0,12h}$ (кг/см²).
98. Сила натяжения каната на расстоянии φ (в радиальной мере) по дуге от начальной точки равна $f(\varphi) = f(0)e^{\varphi/3}$; $f(6\pi) = 10e^{2\pi} \approx 5000$ кг.
99. Количество оставшейся воды $m(t) = m_0 - v(q_1 - q_0) \left(1 - e^{-\frac{k}{v}t}\right)$, k — коэффициент пропорциональности.
100. После сгорания массы x топлива скорость ракеты $v(x) = c \ln \frac{M}{M-x}$; $v(M-m) = c \ln \frac{M}{m}$.
101. $x + y = Cx^2$; $x = 0$.
102. $\ln(x^2 + y^2) = C - 2 \operatorname{arctg}(y/x)$.
103. $x(y-x) = Cy$; $y = 0$.
104. $x = \pm y \sqrt{\ln Cx}$; $y = 0$.
105. $y = Ce^{y/x}$.
106. $y^2 - x^2 = Cy$, $y = 0$.
107. $\sin \frac{y}{x} = Cx$.
108. $y = -x \ln \ln Cx$.
109. $\ln \frac{x+y}{x} = Cx$.
110. $\ln Cx = \operatorname{ctg} \left(\frac{1}{2} \ln \frac{y}{x}\right)$; $y = xe^{2\pi k}$, $k = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$
111. $x \ln Cx = 2\sqrt{xy}$; $y = 0$; $x = 0$.
112. $\arcsin \frac{y}{x} = \ln Cx \cdot \operatorname{sgn} x$; $y = \pm x$.
113. $(y-2x)^3 = C(y-x-1)^2$; $y = x+1$.
114. $2x+y-1 = Ce^{2y-x}$.
115. $(y-x+2)^2 + 2x = C$.
116. $(y-x+5)^5(x+2y-2) = C$.
117. $(y+2)^2 = C(x+y-1)$; $y = 1-x$.
118. $y+2 = Ce^{-2 \operatorname{arctg} \frac{y+2}{x-3}}$.
119. $\ln \frac{y+x}{x+3} = 1 + \frac{C}{x+y}$.
120. $\sin \frac{y-2x}{x+1} = C(x+1)$.
121. $x^2 = (x^2-y) \ln Cx$; $y = x^2$.
122. $x = -y^2 \ln Cx$; $y = 0$.
123. $x^2 y^4 \ln Cx^2 = 1$; $y = 0$; $x = 0$.
124. $y^2 e^{-1/xy} = C$; $y = 0$; $x = 0$.
125. $(2\sqrt{y}-x) \ln [C \times (2\sqrt{y}-x)] = x$; $2\sqrt{y} = x$.
126. $1-xy = Cx^3(2+xy)$; $xy = -2$.
127. $2\sqrt{(1/xy^2)-1} = -\ln Cx$; $xy^2 = 1$; $y = 0$.
128. $\arcsin \frac{y^2}{|x^3|} = \ln Cx^3$; $|x^3| = y^2$.
129. $x^2 y \ln Cy = 1$; $y = 0$.
130. а) $y^2 = C(x+y)$; $y = -x$; б) $(y+x)^2(y-2x)^4 = C(y-x)^3$; $y = x$.
131. $y = C(x^2 + y^2)$.
132. $x^2 + y^2 = Cx$.
133. При $\frac{1}{\beta} - \frac{1}{\alpha} = 1$.
136. $y = Cx^2 + x^4$.
137. $y = (2x+1)(C + \ln |2x+1|) + 1$.
138. $y = \sin x + C \cos x$.
139. $y = e^x(\ln |x| + C)$; $x = 0$.
140. $xy = C - \ln |x|$.
141. $y = x(C + \sin x)$.
142. $y = Ce^{x^3} - x^2 - 1$.
143. $y = C \ln^2 x - \ln x$.
144. $xy = (x^3 +$

$\dagger C)e^{-x}$. 145. $x = y^2 + Cy$; $y = 0$. 146. $x = e^y + Ce^{-y}$.
 147. $x = (C - \cos y) \sin y$. 148. $x = 2 \ln y - y + 1 + Cy^2$.
 149. $x = Cy^3 + y^2$; $y = 0$. 150. $(y - 1)^2 x = y - \ln Cy$; $y = 0$;
 $y = 1$. 151. $y(e^x + Ce^{2x}) = 1$; $y = 0$. 152. $y(x + 1)(\ln |x +$
 $+ 1| + C) = 1$; $y = 0$. 153. $y^{-3} = C \cos^3 x - 3 \sin x \cos^2 x$; $y =$
 $= 0$. 154. $y^3 = Cx^3 - 3x^2$. 155. $y^2 = Cx^2 - 2x$, $x = 0$. 156. $y =$
 $= x^4 \ln^2 Cx$; $y = 0$. 157. $y^{-2} = x^4(2e^x + C)$; $y = 0$. 158. $y^2 =$
 $= x^2 - 1 + C\sqrt{|x^2 - 1|}$. 159. $x^2(C - \cos y) = y$; $y = 0$
 160. $xy(C - \ln^2 y) = 1$. 161. $x^2 = Ce^{2y} + 2y$. 162. $y^2 = C(x +$
 $+ 1)^2 - 2(x + 1)$. 163. $e^{-y} = Cx^2 + x$. 164. $\cos y = (x^2 -$
 $- 1) \ln C(x^2 - 1)$. 165. $y = 2e^x - 1$. 166. $y = -2e^x$. 167. $y =$
 $= \frac{2}{x} + \frac{4}{Cx^5 - x}$; $y = \frac{2}{x}$. 168. $y = \frac{1}{x} + \frac{1}{Cx^{2/3} + x}$; $y = \frac{1}{x}$. 169. $y =$
 $= x + \frac{x}{x + C}$; $y = x$. 170. $y = x + 2 + \frac{4}{Ce^{4x} - 1}$; $y = x + 2$.
 171. $y = e^x - \frac{1}{x + C}$; $y = e^x$. 172. $3x = C\sqrt{|y|} - y^2$; $y = 0$.
 173. $xy = Cx^3 + 2a^2$. 174. $xy = a^2 + Cy^2$. 175. Через 20 мин;
 3,68 кг. 176. Через 62 дня. 177. $y = y_1 + C(y_2 - y_1)$. 178. $y =$
 $= \operatorname{tg} x - \sec x$. 179. b/a . 180. b/a . 181. $x(t) = \int_{-\infty}^t e^{s-t} f(s) ds =$
 $= \int_{-\infty}^0 e^z f(z + t) dz$. 182. $y(x) = x \int_{+\infty}^{\infty} e^{x^2 - t^2} dt \rightarrow -\frac{1}{2}$ при $x \rightarrow +\infty$.
 183. $y(x) = \int_0^{\infty} e^{-s - \sin s \cdot \cos(s + 2x)} \sin(x + s) ds$. 186. $3x^2 y - y^3 =$
 $= C$. 187. $x^3 - 3x^3 y^2 + y^4 = C$. 188. $xe^{-y} - y^2 = C$.
 189. $4y \ln x + y^4 = C$. 190. $x + \frac{x^3}{y^2} + \frac{5}{y} = C$. 191. $x^2 + \frac{2}{3}(x^2 -$
 $- y)^{3/2} = C$. 192. $x - y^2 \cos^2 x = C$. 193. $x^3 + x^3 \ln y - y^2 = C$.
 194. $x^2 + 1 = 2(C - 2x) \sin y$. 195. $2x + \ln(x^2 + y^2) = C$.
 196. $x + \operatorname{arctg} \frac{x}{y} = C$. 197. $\sqrt{1 + y^2} = xy + C$. 198. $2x^3 y^3 -$
 $- 3x^2 = C$. 199. $y^2 = x^2(C - 2y)$; $x = 0$. 200. $(x^2 - C)y = 2x$.
 201. $x^2 + \ln y = Cx^3$; $x = 0$. 202. $y \sin xy = C$. 203. $\frac{x^2}{2} + xy +$
 $+ \ln |y| = C$; $y = 0$. 204. $-x + 1 = xy (\operatorname{arctg} y + C)$; $x = 0$;
 $y = 0$. 205. $x + 2 \ln |x| + \frac{3}{2}y^2 - \frac{y}{x} = C$; $x = 0$. 206. $\sin \frac{y}{x} =$
 $= C e^{-x^2}$. 207. $\ln |y| - ye^{-x} = C$; $y = 0$. 208. $\ln \left(\frac{x^2}{y^2} + 1 \right) = 2y +$
 $+ C$; $y = 0$. 209. $x^2 y \ln Cxy = -1$; $x = 0$; $y = 0$. 210. $x^2 +$
 $+ y^2 = y + Cx$; $x = 0$. 211. $x^2 y + \ln |x/y| = C$; $x = 0$; $y = 0$.
 212. $2xy^2 + (1/xy) = C$; $x = 0$; $y = 0$. 213. $\ln \left| \frac{x + y}{y} \right| +$
 $+ \frac{y(1 + x)}{x + y} = C$; $y = 0$; $y = -x$. 214. $\sin^2 y = Cx - x^2$; $x = 0$.

215. $y = C \ln x^2 y$. 216. $\sin y = -(x^2 + 1) \ln C(x^2 + 1)$.
217. $xy(C - x^2 - y^2) = 1$; $x = 0$; $y = 0$. 218. $y^2 = Cx^2 e^{x^2 y^2}$.
219. $x\sqrt{1 + (y^2/x^2)} + \ln\left(\frac{y}{x} + \sqrt{1 + (y^2/x^2)}\right) = C$; $x = 0$.
220. $x^3 - 4y^2 = Cy\sqrt{xy}$; $x = 0$; $y = 0$. 221. а) $y_0 = 0$, $y_1 = -x^6/2$, $y_2 = (x^2/2) - (x^5/20)$. б) $y_0 = 1$, $y_1 = x^3$, $y_2 = 1 + x^3 - x + (x^7 - 1)/7$. в) $y_0 = 1$, $y_1 = 1 + 2x$, $y_2 = \frac{1}{2}(e^{2x} + 1) + x + x^2$. г) $y_0 = 2\pi$, $y_1 = \pi + x$, $y_2 = 2\pi + x + x \cos x - \sin x$. 222. а) $y_0 = 1$, $z_0 = 0$; $y_1 = x^2$, $z_1 = x - 1$; $y_2 = x^2 + (x - 1)^2/2$, $z_2 = (x^3 - 1)/3$. б) $x_0 = 1$, $y_0 = 2$; $x_1 = 1 + 2t$, $y_1 = 2 + t$; $x_2 = 1 + 2t + (t^2/2)$, $y_2 = 2 + t + 2t^2 + (4/8)t^3$. в) $y_0 = 1$, $y_1 = 1$, $y_2 = 1 + x^3$. г) $x_0 = 2$, $x_1 = 3 - t$, $x_2 = 5 - 4t + t^2$. 223. а) $-0,5 \leq x \leq 0,5$. б) $0,87 \leq x \leq 1,13$. в) $0,8 \leq t \leq 1,2$. г) $-0,1 \leq t \leq 0,1$. 224. $y_3 = \frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{20} + \frac{x^8}{160} - \frac{x^{11}}{4400}$, $|y - y_3| < 0,00003$. 225. а) Вся плоскость. б) $y \neq 2x$. в) $x \neq 2$, $y > 0$. г) $y \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ д) $x > 0$. $y \neq x$. е) $x \neq 0$, $|y| > |x|$. 226. При $0 < a < 1$ в точках оси Ox .
228. а) x_0 и y_0 любые, $y_0 \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ б) $x_0 \neq -1$, $y_0 > 0$, y_0' любое. в) $x_0 \neq y_0$, $x_0 y_0 > 0$, $y_0' \neq 0$, y_0'' любое. г) $x_0 \neq y_0'$, $y_0 \neq 0$, y_0'' любое. д) t_0 и y_0 любые, $x_0 \neq 0$. е) $t_0 > -1$, $x_0 \neq 0$, $y_0 \neq t_0$. 229. а) Нет. б) Да. 230. а) Нет. б) Нет. в) Да. 231. В случае $n = 1$ нет решений, при $n = 2$ одно решение, при $n = 3$ бесконечно много решений. 232. В случае $n = 1$ нет решений, если $\operatorname{tg} \alpha \neq f(x_0, y_0)$, и одно решение, если $\operatorname{tg} \alpha = f(x_0, y_0)$; в случае $n = 2$ одно решение, а при $n \geq 3$ бесконечно много. 233. $n \geq 5$. 234. $n \geq 4$. 236. а) 3. б) 2. в) 4. г) 4. д) 3. е) 1. 237. а) $0 \leq a \leq 1$. б) $a \leq \frac{1}{2}$. в) $1 \leq a \leq \frac{3}{2}$. г) $-\frac{1}{2} < a \leq 0$. 241. $y = Ce^{\pm x}$. 242. $y^2 = (x + C)^2$; $y = 0$. 243. $y + x = (x + C)^2$; $y = -x$. 244. $(x + C)^2 + y^2 = 1$. $y = \pm 1$. 245. $y(x + C)^2 = 1$; $y = 0$. 246. $y[1 + (x - C)^2] = 1$; $y = 0$; $y = 1$. 247. $(y - x)^2 = 2C(x + y) - C^2$; $y = 0$. 248. $(x - 1)^{4/3} + y^{4/3} = C$. 249. $4y = (x + C)^2$; $y = Ce^{x^2}$. 250. $y^2(1 - y) = (x + C)^2$; $y = 1$. 251. $y = Ce^{x^2}$; $y = Ce^{-x^2} + x - 1$. 252. $x^2 y = C$; $y = Cx$. 253. $x^2 + C^2 = 2Cy$; $y = \pm x$. 254. $(x + C)^2 = 4Cy$; $y = 0$; $y = x$. 255. $\ln |1 \pm 2\sqrt{2y - x}| = 2(x + C \pm \sqrt{2y - x})$; $8y = 4x + 1$. 256. $4e^{-y/3} = (x + 2)^{4/3} + C$. 257. $y = 2x^2 + C$; $y = -x^2 + C$. 258. $y = Cx^{-3} \pm 2\sqrt{x/7}$. 259. $\ln Cy = x \pm 2e^{x/2}$, $y = 0$. 260. $\ln Cy = x \pm \sin x$; $y = 0$. 261. $\operatorname{arctg} u + \frac{1}{2} \ln [(u - 1)/(u + 1)] = \pm x + C$, где $u = \sqrt{1 - (1/y^2)}$; $y = 0$; $y = \pm 1$. 262. $x^2 + (Cy + 1)^2 = 1$; $y = 0$. 263. $(Cx + 1)^2 = 1 - y^2$; $y = \pm 1$. 264. $2(x - C)^2 + 2y^2 = C^2$; $y = \pm x$. 265. $y = Ce^{\pm x} - x^2$.

266. $y^2 = C^2x - C$; $4xy^2 = -1$. 267. $x = p^3 + p$, $4y = 3p^4 + 2p^2 + C$. 268. $x = \frac{2p}{p^2-1}$, $y = \frac{2}{p^2-1} - \ln |p^2 - 1| + C$.
 269. $x = p\sqrt{p^2+1}$, $3y = (2p^2-1)\sqrt{p^2+1} + C$. 270. $x = \ln p + (1/p)$, $y = p - \ln p + C$. 271. $x = 3p^2 + 2p + C$, $y = 2p^3 + p^2$; $y = 0$. 272. $x = 2 \operatorname{arctg} p + C$, $y = \ln(1+p^2)$; $y = 0$. 273. $x = \ln |p| \pm \frac{3}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{p+1}-1}{\sqrt{p+1}+1} \right| \pm 3\sqrt{p+1} + C$,
 $y = p \pm (p+1)^{3/2}$; $y = \pm 1$. 274. $x = e^p + C$, $y = (p-1)e^p$, $y = -1$. 275. $x = \pm (2\sqrt{p^2-1} + \arcsin \frac{1}{|p|}) + C$, $y = \pm p\sqrt{p^2-1}$; $y = 0$. 276. $x = \pm \left(\ln \left| \frac{1-\sqrt{1-p}}{1+\sqrt{1-p}} \right| + 3\sqrt{1-p} \right) + C$, $y = \pm p\sqrt{1-p}$; $y = 0$. 277. $x = \pm 2\sqrt{1+p^2} - \ln(\sqrt{p^2+1} \pm 1) + C$, $y = -p \pm \pm p\sqrt{p^2+1}$; $y = 0$. 278. $4y = C^2 - 2(x-C)^2$; $2y = x^2$.
 279. $x = -\frac{p}{2} + C$; $5y = C^2 - \frac{5p^2}{4}$; $x^2 = 4y$. 280. $\pm xp\sqrt{2 \ln Cp} = 1$, $y = \mp \left(\sqrt{2 \ln Cp} - \frac{1}{\sqrt{2 \ln Cp}} \right)$. 281. $pxy - q^2 = p^2$
 $y^2(2p+C) = p^4$; $y = 0$. 282. $y^2 = 2Cx - C \ln C$; $2x - 1 = 2 \ln |y|$. 283. $Cx = \ln Cy$; $y = ex$. 284. $xp^2 = C\sqrt{|p|} - 1$, $y = xp - x^2p^3$; $y = 0$. 285. $2p^2x = C - C^2p^2$, $py = C$; $32x^2 = -27y^4$; $y = 0$. 286. $y^2 = 2C^3x + C^2$; $27x^2y^2 = 1$. 287. $y = Cx - C^2$; $4y = x^2$. 288. $x\sqrt{p} = \ln p + C$, $y = \sqrt{p}(4 - \ln p - C)$; $y = 0$. 289. $x = 3p^2 + Cp^{-2}$, $y = 2p^3 + 2pC^{-1}$; $y = 0$. 290. $y = Cx - C - 2$. 291. $C^3 = 3(Cx - y)$; $9y^2 = 4x^2$. 292. $x = C(p-1)^{-2} + 2p + 1$, $y = Cp^2(p-1)^{-2} + p^2$; $y = 0$. 293. $y = Cx - \ln C$; $y = \ln x + 1$. 294. $y = \pm 2\sqrt{Cx + C}$; $y = -x$. 295. $2C^2(y - Cx) = 1$; $8y^3 = 27x^2$. 296. $xp^2 = p + C$, $y = 2 + 2Cp^{-1} - \ln p$. 297. а) $4y = x^4$; б) $y = 0$, $y = -4x$; в) $y = 0$, $27y = 4x^3$; г) $y = 4x$. 298. $xy = \pm a^2$. 299. $x^2 + y^2 = 1$. 300. $x = p(p^2 + 2)/(\sqrt{p^2 + 1})^3$, $y = p^2/(\sqrt{p^2 + 1})^3$ и $x = p/(\sqrt{p^2 + 1})^3$, $y = (2p^2 + 1)/(\sqrt{p^2 + 1})^3$.
 301. $y = x(Ce^{-x} - 1)$. 302. $(Cx + 1)y = Cx - 1$; $y = 1$. 303. $y(x^2 - C) = x$; $y = 0$. 304. $x(C - y) = C^2$; $x = 4y$. 305. $y(x + C) = x + 1$; $y = 0$. 306. $x = Cy + y^3$; $y = 0$. 307. $y = C$; $y = C \pm e^x$. 308. $y \ln Cx = -x$; $y = 0$. 309. $y^2 = C(x^2 - 1)$; $x = \pm 1$. 310. $2y = 2C(x - 1) + C^2$; $2y = -(x - 1)^2$. 311. $x = Cy + \ln^2 y$. 312. $y = Cx^2e^{-3/x}$. 313. $(x - C)^2 + y^2 = C$; $4(y^2 - x) = 1$. 314. $4x^2y = (x + 2C)^2$; $y = 0$. 315. $x = Ce^y + y^2 + 2y + 2$. 316. $3y = 3C(x - 2) + C^3$; $9y^2 = 4(2 - x)^2$. 317. $y^2 = C(xy - 1)$; $xy = 1$. 318. $4(x - C)^3 = 27(y - C)^2$; $y = x - 1$. 319. $x + y = \operatorname{tg}(y - C)$. 320. $x^2y^2 + 7x = C$. 321. $y(xy - 1) = Cx$. 322. $-e^{-y} = \ln C(x - 2)$. 323. $x = y^2(C - 2 \ln |y|)$; $y = 0$. 324. $3xy = C \pm 4x^{3/2}$. 325. $y^2(Ce^{x^2} + 4) = 1$; $y = 0$. 326. $y^2 = 2x \ln Cy$; $y = 0$. 327. $\ln(x^2 + y^2) + \operatorname{arctg}(y/x) = C$. 328. $(x - 1)^2y = x - \ln |x| + C$. 329. $C^2x^2 +$

$+ 2y^2 = 2C$; $2x^2y^2 = 1$. 330. $y(C\sqrt{|x^2 - 1|} - 2) = 1$; $y = 0$.
 331. $y^2(Ce^{2x} + x + 0,5) = 1$; $y = 0$. 332. $y^2 - 1 = C(x + 1)^4 e^{-4x}(y^2 + 1)$; $x = -1$. 333. $y \sin x - \frac{x^3}{3} + \frac{y^2}{2} = C$.
 334. $x = 3p^2 + p^{-1}$; $y = 2p^3 - \ln |p| + C$. 335. $3y^2 = 2 \sin x + C \sin^{-2} x$. 336. $x(e^y + xy) = C$. 337. $x(p - 1)^2 = \ln Cp - p$,
 $y = xp^2 + p$; $y = 0$; $y = x + 1$. 338. $(x + 1)y = x^2 + x \ln Cx$.
 339. $y^2 + \sqrt{x^4 + y^4} = C$. 340. $px = C\sqrt{p} - 1$, $y = \ln p - C\sqrt{p} + 1$. 341. $y = x \operatorname{tg} \ln Cx$; $x = 0$. 342. $y^{2/3} = Ce^{2x} + (x/3) + (1/6)$; $y = 0$. 343. $x = Ce^{\sin y} - 2(1 + \sin y)$.
 344. $Cy = C^2 e^{x/2} + 1$; $y = \pm 2e^{x/2}$. 345. $y^2 = (x^2 + C)e^{2x}$. 346. $y = Cx - \sqrt[3]{C^3 - 1}$; $y^3 = (x^{3/2} \pm 1)^2$. 347. $x(y^2 - 1)^2 = y^3 - 3y + C$. 348. $\sqrt{y - x} - \sqrt{x} = C$; $y = x$. 349. $x\sqrt{y} = \sin x + C$; $y = 0$. 350. $x = 4p^3 - \ln Cp$, $y = 3p^4 - p$; $y = 0$. 351. $y^2 + 2x^2 \ln Cy = 0$; $y = 0$. 352. $4x + y - 3 = 2 \operatorname{tg}(2x + C)$. 353. $xy \cos x - y^2 = C$. 354. $4Cxy = C^2 x^4 - 1$.
 355. $xy(\ln^2 x + C) = 1$. 356. $2\sqrt{y - x^2} = x \ln Cx$; $y = x^2$.
 357. $(y^2/2) - (1/x) - xy = C$; $x = 0$. 358. $x = Cy^2 - y^2(y + 1)e^{-y}$; $y = 0$. 359. $y(\ln y - \ln x - 1) = C$. 360. $x = 2p - \ln p$, $y = p^2 - p + C$. 361. $2x^3 - x^2y^2 + y^3 + x = C$. 362. $(y - 4x + 2)^4(2y + 2x - 1) = C$. 363. $y^3 = (C - x^3) \sin^3 x$. 364. $p^2x = p \sin p + \cos p + C$, $py = p \sin p + 2 \cos p + 2C$; $y = 0$.
 365. $x^2y^2 - 1 = xy \ln Cy^2$; $y = 0$. 366. $y = C \cos x + \sin x$.
 367. $|x| = \ln \left(\frac{y}{x} + \sqrt{1 + \frac{y^2}{x^2}} \right) + C$; $x = 0$. 368. $(y - x)^2 = 2C(x + y) - C^2$; $y^{2/3} - x^{2/3} = C$; $y = 0$. 369. $27(y - 2x)^2 = (C - 2x)^3$; $y = 2x$. 370. $\sin(y/x) = -\ln Cx$. 371. $x^2(x^2y + \sqrt{1 + x^4y^2}) = C$. 372. $3\sqrt{y} = x^2 - 1 + C\sqrt{|x^2 - 1|}$; $y = 0$.
 373. $x = \frac{C}{p^2} - p - \frac{3}{2}$, $y = C\left(\frac{2}{p} - 1\right) - \frac{p^2}{2}$; $y = x + 2$; $y = 0$. 374. $(2x + 3y - 7)^3 = Ce^{x+2y}$. 375. $(x^2 + y + \ln Cy)y = x$; $y = 0$. 376. $x = 2\sqrt{p^2 + 1} - \ln(1 + \sqrt{p^2 + 1}) + \ln Cp$,
 $y = p\sqrt{p^2 + 1}$; $y = 0$. 377. $y^2 = C \ln^2 x + 2 \ln x$. 378. $x = Cue^u$, $4y = C^2 e^{2u}(2u^2 + 2u + 1)$; $x^2 = 2y$. 379. $xy^2 \ln Cxy = 1$; $x = 0$; $y = 0$. 380. $x^2 \sin^2 y = 2 \sin^3 y + C$. 381. $y = 2C - C^2x$; $xy = 1$. 382. $xe^y = e^x + C$. 383. $\sin(y - 2x) - 2 \cos(y - 2x) = Ce^{x+2y}$. 384. $y = (2x + C)\sqrt{x^2 + 1} - x^2 - Cx - 2$. 385. $(y + x^2)^2(2y - x^2) = C$. 386. $(x - 1)^2 = 2y^2(x - \ln Cx)$; $y = 0$. 387. $x = p[\ln(1 + \sqrt{p^2 + 1}) - \ln Cp]$,
 $2y = xp - \sqrt{p^2 + 1}$; $2y = -1$. 388. $(y + 3x + 7)(y - x - 1)^3 = C$. 389. $\sin y = Ce^{-x} + x - 1$. 390. $y = C^2(x - C)^2$; $16y = x^4$. 391. $y^2 = x - (x + 1) \ln C(x + 1)$.
 392. $e^y = x^2 \ln Cx$. 393. $(y - 2x\sqrt{y - x^2})(2\sqrt{y - x^2} + x) = C$. 394. $xy^2 = \ln x^2 - \ln Cy$; $x = 0$, $y = 0$. 395. $x(y^2 + x^2)^3 = \frac{2}{5}y^5 + \frac{4}{3}x^2y^3 + 2x^4y + Cx^5$; $x = 0$. 396. $(u - 1) \ln Cx^u(u - 1)^5(u + 2)^4 = 3$, где $u^3 = (y^2/x^2) - 2$; $y^2 = 3x^2$. 397. $\sqrt{y} =$

$= (x^2 - 1)(2 \ln |x^2 - 1| + C)$; $y = 0$. 398. $x^2 - (x - 1) \ln (y + 1) - y = C$. 399. $\operatorname{tg} y = x^2 + Cx$; $y = (2k + 1)\pi/2$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. 400. $y^2 = Cx^2 + C^2$. 401. $x^3 = Ce^y - y - 2$. 402. $y + 1 = x \ln C(y + 1)$; $y = -1$. 403. $y^2 = 2C^2(x - C)$; $8x^3 = 27y^2$. 404. $x^6 = y^3(C - y \ln y + y)$; $y = 0$. 405. $\ln C(u - v)^3 \left(u^2 + uv + \frac{v^2}{3} \right)^2 = 2 \operatorname{arctg} \frac{2u + v}{v}$, где $u^3 = y$, $v^2 = x$; $y^2 = x^3$. 406. $(y - 1)^2 = x^2 + Cx$. 407. $(x^2 + y^2)(Cx + 1) = x$. 408. $3x + y^3 - 1 = \operatorname{tg}(3x + C)$. 409. $(C - x^2) \sqrt{y^2 + 1} = 2x$. 410. $(x^2 + y^2 + 1)^2 = 4x^2 + C$. 411. $xy - x = y(y - x) \times \times \ln |Cy/(y - x)|$; $x = 0$, $y = 0$; $y = x$. 412. $y = \pm x \operatorname{ch}(x + C)$; $y = \pm x$. 413. $\sqrt{y^2 + 1} = x(Ce^x - 1)$. 414. $(y - x) \times \times \ln C \frac{x - 1}{x + 1} = 2$; $y = x$. 415. $(Ce^{x^2} + 2x^2 + 2) \cos y = 1$. 416. $(y^2 - Cx^2 + 1)^2 = 4(1 - C)y^2$; $y = \pm x$. 417. $y^3 + xy - 1 = Ce^{x^2/2}$. 418. $6x^3y^4 + 2x^3y^3 + 3x^2y^4 = C$. 419. $x + \frac{1}{x} + y^2 - 2y + 2 = Ce^{-y}$; $x = 0$. 420. $e^y(C^2x^2 + 1) = 2C$; $x^2 = e^{-2y}$. 421. $C_1x - C_2^2y = \ln |C_1x + 1| + C_2$; $2y = x^2 + C$; $y = C$. 422. $9C_1^2(y - C_2)^2 = 4(C_1x + 1)^3$; $y = \pm x + C$. 423. $C_1y^2 - 1 = (C_1x + C_2)^2$. 424. $y^3 = C_1(x + C_2)^2$; $y = C$. 425. $y = C_1 \operatorname{tg}(C_1x + C_2)$; $\ln \left| \frac{y - C_1}{y + C_1} \right| = 2C_1x + C_2$; $y(C - x) = 1$; $y = C$. 426. $C_1y = \pm \sin(C_1x + C_2)$; $C_1y = \pm \operatorname{sh}(C_1x + C_2)$; $y = C \pm x$. 427. $y = C_1(x - e^{-x}) + C_2$. 428. $y = C_3 - (x + C_1) \ln C_2(x + C_1)$; $y = C_1x + C_2$. 429. $y + C_1 \ln |y| = x + C_2$; $y = C$. 430. $2y = C_1 \cos 2x + (1 + 2C_1)x^2 + C_2x + C_3$. 431. $y = C_1[1 \pm \operatorname{ch}(x + C_2)]$; $y = Ce^{\pm x}$. 432. $x = C_1p + 3p^2$; $y = \frac{12}{5}p^5 + \frac{5}{4}C_1p^4 + C_1^2 \frac{p^3}{6} + C_2$; $y = C$. 433. $y = C_1 \frac{x^2}{2} - C_1^2x + C_2$; $y = (x^3/12) + C$. 434. $e^y + C_1 = (x + C_2)^2$. 435. $y = C_1(x + 2)e^{-x} + C_2x + C_3$. 436. $y = \pm \operatorname{ch}(x + C_1) + C_2$. 437. $e^y \sin^2(C_1x + C_2) = 2C_1^2$; $e^y \operatorname{sh}^2(C_1x + C_2) = 2C_1^2$; $e^y(x + C)^2 = 2$. 438. $y = C_1 \frac{x^3}{6} - C_1^3 \frac{x^2}{2} + C_2x + C_3$; $y = \frac{\pm 8}{315} \times \times x^3 \sqrt{3x} + C_1x + C_2$. 439. $3C_1y = (x - C_1)^3 + C_3$; $y = C$; $y = C - 2x^2$. 440. $\ln |y^2 + C_1 \pm \sqrt{y^4 + 2C_1y^2 + 1}| = 2x + C_2$; $y = \pm 1$. 441. $x = 3C_1p^2 + \ln C_2p$, $y = 2C_1p^3 + p$; $y = C$. 442. $x = C_1e^p - 2p - 2$, $y = C_1(p - 1)e^p - p^2 + C_2$. 443. $12(C_1y - x) = C_1^2(x + C_2)^3 + C_3$. 444. $y = C_1(x \sqrt{x^2 - 1} - \ln |x + \sqrt{x^2 - 1}|) + x^2 + C_2$; $y = C_1(x \sqrt{1 - x^2} + \operatorname{arcsin} x) + x^2 + C_2$. 445. $\ln y = C_1 \operatorname{tg}(C_1x + C_2)$; $\ln |(\ln y - C_1)/(\ln y + C_1)| = 2C_1x + C_2$; $(C - x) \ln y = 1$; $y = C$. 446. $x = u - \ln |1 + u| + C_2$, где $u = \pm \sqrt{1 + 4C_1y}$; $y = C$; $y = Ce^{-x}$. 447. $C_1^2y = (C_1^2x^2 + 1) \operatorname{arctg} C_1x - C_1x + C_2$; $2y = k\pi x^2 + C_1$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. 448. $x = \ln |p| + 2C_1p - C_2$, $y = p +$

$+ C_1 p^2 + C_3$; $y = C_1 x + C_2$. 449. $C_1^2 y + 1 = \pm \operatorname{ch}(C_1 x + C_2)$; $C_1^2 y - 1 = \sin(C_1 x + C_2)$; $2y = (x + C)^2$. $y = 0$. 450. $y = C_2 - \ln \left| \cos \left(\frac{x^2}{2} + C_1 \right) \right|$. 451. $6y = x^3 \ln |x| + C_1 x^3 + C_2 x^2 + C_3 x + C_4$. 452. $y = x \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt + \cos x + C_1 x + C_2$. 453. $y = C_1 \left[x \int_0^{\infty} e^{t^2} dt - \frac{e^{x^2}}{2} \right] + C_2 x + C_3$. 454. $y = \frac{x^2}{2} \int_1^x \frac{e^t}{t} dt - \frac{x+1}{2} e^x + C_1 x^2 \ln |x| + C_2 x^2 + C_3 x + C_4$. 455. $C_2 y^2 - C_1 = C_2^2 (x + C_3)^2$; $y = C$. 456. $C_1 y = \ln |C_1 x + C_2| + C_3$, $y = C_1 x + C_2$. 457. $C_1 y - 1 = C_2 e^{C_1 x}$; $y = C - x$; $y = 0$. 458. $y = \pm \sqrt{C_1 x + C_2} + C_3 x + C_4$; $y = C_1 x^2 + C_2 x + C_3$. 459. $y^2 = x^2 + C_1 x + C_2$. 460. $y = e^{x^2/2} \left(C_1 \int e^{-x^2/2} dx + C_2 \right) - 1$. 461. $y = C_1 \operatorname{tg}(C_1 \ln C_2 x)$; $C_2 (y + C_1) |x|^{2C_1} = y - C_1$; $y \ln Cx = -1$. 462. $y = 4C_1 \times \operatorname{tg}(C_1 x^2 + C_2)$; $2 \ln \left| \frac{y - C_1}{y + C_1} \right| = C_1 x^2 + C_2$; $y(C - x^2) = 4$, $y = C$. 463. $y = C_2 e^{C_1 x^2}$. 464. $\ln C_2 y = 4x^{5/2} + C_1 x$; $y = 0$. 465. $y = C_2 (x + \sqrt{x^2 + 1})^{C_1}$. 466. $y^2 = C_1 x^3 + C_2$. 467. $y = C_2 x e^{-C_1/x}$. 468. $y = C_2 |x|^{C_1 - (1/2) \ln |x|}$. 469. $y = C_2 \left| \frac{x}{x + C_1} \right|^{1/C_1}$; $y = C$; $y = C e^{-1/x}$. 470. $|y|^{C_1^2 + 1} = C_2 \left(x - \frac{1}{C_1} \right) |x + C_1|^{C_1^2}$, $y = C$. 471. $y = C_2 x (\ln C_1 x)^2$; $y = Cx$. 472. $\ln |y| = \ln |x^2 - 2x + C_1| + \int \frac{2dx}{(x-1)^2 + C_1 - 1} + C_2$; $y = C$. 473. $4C_1 y^2 = 4x + x \times (C_1 \ln C_2 x)^2$. 474. $y = -x \ln (C_2 \ln C_1 x)$; $y = Cx$. 475. $\frac{y}{x} = C_2 - 3 \ln \left| \frac{1}{x} - C_1 \right|$, $y = Cx$. 476. $x^2 y = C_1 \operatorname{tg}(C_1 \ln C_2 x)$, $C_2 (x^2 y + C_1) |x|^{2C_1} = x^2 y - C_1$; $x^2 y \ln Cx = -1$. 477. $4(C_1 y - 1) = C_1^2 \ln^2 C_2 x$. 478. $Cy = x^{3/2} (C_2 x^C + 2)$; $y = Cx^{3/2}$; $y = -2x^{3/2} \ln Cx$. 479. $2C_2 x^2 y = (C_2 x - C_1)^2 - 1$; $xy = \pm 1$. 480. $2C_1 C_2 y = C_2^2 |x|^{2+C_1} + |x|^{2-C_1}$. 501. $(3-x)y^5 = 8(x+2)$. 502. $y(x+2) = -x - 6$. 503. $(1 - \ln x)^2 y = x^2$. 504. $y = 3 \operatorname{th}^2 \frac{x\sqrt{3}}{2} - 2$. 505. $\ln \operatorname{tg} \left(\frac{y}{2} + \frac{\pi}{6} \right) = 2x + 2$. 506. а) $4(C_1 y - 1) = C_1^2 (x + C_2)^2$; б) $y \sqrt{(C_1/y) - 1} + C_1 \arccos \sqrt{y/C_1} = C_2 \pm x$. 507. $y = C_2 - k \ln \cos \left(\frac{x}{k} + C_1 \right)$. 508. $y = \frac{p}{2T} x^2 + C_1 x + C_2$; p — нагрузка на единицу длины горизонтальной проекции, T — горизонтальная составляющая силы натяжения

нити) 509. $ay = \text{ch}(ax + C_1) + C_2$; $a = q/T$, q — вес единицы длины нити, T — см. ответ к задаче 508. 511. $y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x}$. 512. $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-3x}$. 513. $y = C_1 + C_2 e^{2x}$. 514. $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{x/2}$. 515. $y = e^{2x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$. 516. $y = e^{-x} \times (C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x)$. 517. $y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$. 518. $y = C_1 e^{2x} + e^{-x}(C_2 \cos x \sqrt{3} + C_3 \sin x \sqrt{3})$. 519. $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + C_3 \cos x + C_4 \sin x$. 520. $y = e^x(C_1 \cos x + C_2 \sin x) + e^{-x}(C_3 \cos x + C_4 \sin x)$. 521. $y = e^{x\sqrt{3}} \times (C_1 \cos x + C_2 \sin x) + C_3 \cos 2x + C_4 \sin 2x + e^{-x\sqrt{3}} \times (C_5 \cos x + C_6 \sin x)$. 522. $y = e^x(C_1 + C_2 x)$. 523. $y = e^{-x/2}(C_1 + C_2 x)$. 524. $y = C_1 + C_2 x + C_3 x^2 + e^{3x}(C_4 + C_5 x)$. 525. $y = C_1 + C_2 e^x + C_3 e^{-x} + C_4 e^{3x} + C_5 e^{-3x}$. 526. $y = (C_1 + C_2 x) \cos x + (C_3 + C_4 x) \sin x$. 527. $y = e^x(C_1 + C_2 x + C_3 x^2)$. 528. $y = e^x(C_1 + C_2 x) + C_3 e^{-x}$. 529. $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + C_3 e^{2x} + C_4 e^{-2x}$. 530. $y = C_1 + (C_2 + C_3 x) \cos 2x + (C_4 + C_5 x) \sin 2x$. 531. $y = e^x(C_1 + C_2 x) + C_3 e^{-2x}$. 532. $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + C_3 \cos x \sqrt{3} + C_4 \sin x \sqrt{3}$. 533. $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{3x} + (1/5)e^{4x}$. 534. $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + (2x - 2)e^x$. 535. $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + xe^x + x^2 + 2$. 536. $y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} + \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x}{3}\right)e^x$. 537. $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{2x} + 0,1 \sin x + 0,3 \cos x$. 538. $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - 2x \cos x$. 539. $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{4x} - (2x^2 - 2x + 3)e^{2x}$. 540. $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{2x} + (0,1x - 0,12) \cos x - (0,3x + 0,34) \sin x$. 541. $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-4x} - \frac{x}{5}e^{-4x} - \left(\frac{x}{6} + \frac{1}{36}\right)e^{-x}$. 542. $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-3x} + \left(\frac{x^3}{12} - \frac{x^2}{16} + \frac{x}{32}\right)e^x$. 543. $y = e^{2x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) + 0,25e^{2x} + 0,1 \cos 2x + 0,05 \sin 2x$. 544. $y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-3x} + e^{3x}\left(\frac{6}{37} \sin x - \frac{1}{37} \cos x\right)$. 545. $y = (C_1 + C_2 x + x^3)e^x$. 546. $y = \left(C_1 - \frac{x^2}{4}\right) \cos x + \left(C_2 + \frac{x}{4}\right) \sin x$. 547. $y = (C_1 + C_2 x)e^{-2x} + \left(\frac{x}{16} - \frac{1}{32}\right)e^{2x}$. 548. $y = C_1 + C_2 e^{5x} - 0,2x^3 - 0,12x^2 - 0,048x + 0,02(\cos 5x - \sin 5x)$. 575. $y = e^x(x \ln |x| + C_1 x + C_2)$. 576. $y = (e^{-x} + e^{-2x}) \ln(e^x + 1) + C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}$. 577. $y = (C_1 + \ln |\sin x|) \sin x + (C_2 - x) \cos x$. 578. $y = \sin 2x \ln |\cos x| - x \cos 2x + C_1 \sin 2x + C_2 \cos 2x$. 579. $y = e^{-x} \left(\frac{4}{5}(x+1)^{5/2} + C_1 + C_2 x\right)$. 580. $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \frac{\cos 2x}{\cos x}$. 581. $y = -\frac{1}{x} + C_1 e^x + C_2 e^{-x}$. 582. $y = (7 - 3x)e^{x-2}$. 583. $y = 2 \cos x - 5 \sin x + 2e^x$. 584. $y = e^{2x-1} - 2e^x + e - 1$. 585. $y = e^{-x}(x - \sin x)$. 586. $y = 2 + e^{-x}$. 587. $y = (x - 1)(e^{2x} - e^{-x})$.

588. $y = x - x \sin x - 2 \cos x$. 589. $y = C_1 x^2 + C_2 x^3$. 590. $y = C_1 x^3 + C_2 x^{-1}$. 591. $y = x(C_1 + C_2 \ln |x| + C_3 \ln^2 |x|)$. 592. $y = C_1 + C_2 \ln |x| + C_3 x^3$. 593. $y = x(C_1 + C_2 \ln |x|) + 2x^3$. 594. $y = C_1 \cos (2 \ln |x|) + C_2 \sin (2 \ln |x|) + 2x$.

595. $y = C_1 x^2 + \frac{1}{x} \left(C_2 - \frac{2}{3} \ln x - \ln^2 x \right)$. 596. $y = x^2 \times (C_1 \cos \ln |x| + C_2 \sin \ln |x| + 3)$. 597. $y = C_1 x^3 + C_2 x^{-2} + x^3 \ln |x| - 2x^2$. 598. $y = C_1 x^2 + C_2 x^{-1} + 0,1 \cos \ln x - 0,3 \sin \ln x$. 599. $y = (x - 2)^2 (C_1 + C_2 \ln |x - 2|) + x - 1,5$.

600. $y = C_1 \left(x + \frac{3}{2} \right) + C_2 \left| x + \frac{3}{2} \right|^{3/2} + C_3 \left| x + \frac{3}{2} \right|^{1/2}$. 601. $y = \left(C_1 + C_2 x + \frac{x^2}{4} \right) e^{-x} + \frac{1}{8} e^x$. 602. $y = \frac{1-x}{16} e^{3x} - \frac{1+x}{16} e^{-x} + \left(\frac{x^3}{12} + C_1 x + C_2 \right) e^x$. 603. $y = C_1 e^{(-1+i)x} + [C_2 + (i-1)x] \times e^{(1-i)x} - e^{(1+i)x}$. 604. $y = (2x^2 + C_1 x + C_2) e^{-ix} - e^{ix}$.

605. $y = C_1 e^{(\sqrt{3}+i)x} + C_2 e^{(i-\sqrt{3})x} + \left(C_3 - \frac{x}{24} \right) e^{-2ix} + \frac{1}{32} e^{2ix}$. 606. $y = \frac{C_1}{x} + \left[C_2 - \frac{1}{3} \ln(-x) + \frac{1}{2} \ln^2(-x) \right] x^2$. 607. $y = (C_1 + C_2 x + x \ln |x|) e^{-x} + \frac{x-1}{4} e^x$. 608. $y = e^{-x} \left[\frac{1}{8} + \left(C_1 - \frac{x}{2} \right) \cos 2x + \left(C_2 + \frac{x}{8} + \frac{1}{2} \ln |\cos x| \right) \sin 2x \right]$. 609. $y = x^3 \ln \frac{C_1 x}{x+1} - \frac{x}{2} + 1 - \frac{1}{x} \ln C_2 (x+1)$. 610. $y = x [C_1 + (C_2 + \ln |\ln x|) \ln x] + \frac{1 + \ln x}{4x}$. 611. $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \int_0^x \sin(x-s) f(s) ds$. 612. $\int_0^x f(s) \cos s ds$ и $\int_0^x f(s) \sin s ds$ ограничены при $x \rightarrow +\infty$.

613. $y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$. 614. $y'' - 4y' + 5y = 0$. 615. $y^{IV} + 2y'' + y = 0$. 616. $y^{IV} - 4y''' + 14y'' - 20y' + 25y = 0$. 617. $y''' - y'' - y' + y = 0$. 618. $y^{IV} + y'' = 0$. 619. $a = 0, b > 0$. 620. $a > 0, b > 0$. 621. $b < 0$ или $b \geq 0, a > 0$. 622. $b > 0, a \leq -2\sqrt{b}$. 623. $a^2 < 4b$. 624. $a > 2, b > a - 1$. 625. $a = 2\sqrt{b}$. 626. $\omega \neq \pm k$. 627. $x = \frac{(b - \omega^2) \sin \omega t - a \omega \cos \omega t}{(b - \omega^2)^2 + a^2 \omega^2}$;

амплитуда $A = \frac{1}{\sqrt{(b - \omega^2)^2 + a^2 \omega^2}}$; $\max A$ достигается при $\omega^2 = b - \frac{a^2}{2}$. 628. $x = \frac{e^{i\omega t}}{4 - \omega^2 + i\omega}$. 629. $x(t) = \int_{-\infty}^t \frac{e^{\lambda_1(t-s)} - e^{\lambda_2(t-s)}}{\lambda_1 - \lambda_2} f(s) ds = \int_0^{\infty} \frac{e^{\lambda_1 z} - e^{\lambda_2 z}}{\lambda_1 - \lambda_2} f(t - z) dz; |x(t)| \leq$

$\leq \frac{m}{b}$. 630. $2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$. 631. В случае $h^2 > 4km$ $x = \frac{v_0}{2\gamma} (e^{(-\alpha+\gamma)t} - e^{(-\alpha-\gamma)t})$, $\alpha = \frac{h}{2m}$, $\gamma = \frac{\sqrt{h^2 - 4km}}{2m}$. В случае $h^2 < 4km$ $x = \frac{v_0}{\beta} e^{-\alpha t} \sin \beta t$, $\alpha = \frac{h}{2m}$, $\beta = \frac{\sqrt{4km - h^2}}{2m}$. 632. $x(t) = \frac{b(k - m\omega^2) \sin \omega t - bh\omega \cos \omega t}{(h - m\omega^2)^2 + h^2\omega^2}$. 633. $A = \frac{kB}{k - m\omega^2}$. 634. $x = 4 - 2 \cos t$. 635. $I = \frac{V}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$. 636. $I = \frac{V}{R} e^{-t/RC}$. 637. $I = \frac{q}{RC} e^{-t/RC}$. 638. $I = \frac{q}{\omega CL} e^{-Rt/2L} \sin \omega t$, $CR^2 < 4L$, $\omega = \frac{\sqrt{4CL - R^2C^2}}{2LC}$. 639. $I = A \sin(\omega t - \varphi)$, $A = \frac{V}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$, $\varphi = \arctg \frac{\omega L}{R}$. 640. $I = A \sin(\omega t - \varphi)$, $A = \frac{V}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$, $\varphi = \arctg \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$; $\max A = \frac{V}{R}$ при $\omega^2 = \frac{1}{LC}$. 641. Нет. 642. Да. 643. Нет. 644. Нет. 645. Да. 646. Нет. 647. Да. 648. Нет. 649. Нет. 650. Да. 651. Нет. 652. Да. 653. Да. 654. Да. 655. Нет. 656. Нет. 657. Да. 658. Нет. 659. Да. 660. Нет. 661. Да. 662. Нет. 663. а) Нет. б) Нет. 664. Линейно независимы. 665. Могут быть линейно зависимы или независимы. 666. а) $W \equiv 0$; б) ничего нельзя сказать. 667. Линейно независимы. Уравнение не удовлетворяет условиям теоремы. 669. Два. 670. а) $-1 < x < \infty$. б) $\frac{3}{2}\pi < x < \frac{5}{2}\pi$. 671. а) Могут при $n \geq 2$. б) Могут при $n \geq 3$. 672. $n \geq 4$. 673. $n \geq 2$. 674. $y'' - y' \operatorname{ctg} x = 0$. 675. $(x-1)y'' - xy' + y = 0$. 676. $y''' - y'' = 0$. 677. $(2x^2 + 6x - 9)y'' - (4x + 6)y' + 4y = 0$. 678. $y'' - y = 0$. 679. $(x^2 - 2x + 2)y''' - x^2y'' + 2xy' - 2y = 0$. 680. $x^2y'' - 3xy' + 3y = 0$. 681. $y = C_1x + C_2e^{-2x}$. 682. $y = C_1\left(1 + \frac{1}{x}\right) + C_2\left(\frac{x}{2} + 1 - \frac{x+1}{x} \ln|x+1|\right)$. 683. $y = e^x(C_1x^2 + C_2)$. 684. $xy = C_1e^{-x} + C_2e^x$. 685. $y = C_1 \operatorname{tg} x + C_2(1 + x \operatorname{tg} x)$. 686. $y = C_1(1 + x \ln|x|) + C_2x$. 687. $y = C_1(e^x - 1) + \frac{C_2}{e^x + 1}$. 688. $y = C_1x + C_2(\ln x + 1)$. 689. $y = C_1 \sin x + C_2(2 - \sin x \times \ln \frac{1 + \sin x}{1 - \sin x})$. 690. $y = C_1(x - 3) + \frac{C_2}{x + 1}$. 691. $y = C_1e^{2x} + C_2(3x + 1)e^{-x}$. 692. $y = (C_1 + C_2x)e^{-x^2}$. 693. $y = C_1(2x + 1) + C_2e^{2x}$. 694. $y = C_1(x + 1) + C_2x^{-1}$. 695. $y = C_1(x + 2) + C_2x^2$. 696. $y = C_1(x^2 + 2) + C_2x^3$. 697. $y = C_1(x^2 + 1) +$

$+ C_2[x + (x^2 + 1) \operatorname{arctg} x]$. 698. $y = C_1 \sqrt{|x|} + C_2(x - 2)$.
 699. $y = C_1x + C_2e^x + C_3e^{-x}$. 700. $y = C_1x + C_2x^{-1} + C_3(x \ln |x| + 1)$. 701. $y = C_1x + C_2e^x + C_3(x^2 - 1)$. 702. $y = C_1(x + 2) + \frac{C_2}{x} + \left(\frac{x}{2} + 1\right) \ln x + \frac{3}{2}$. 703. $y = C_1(2x - 1) + C_2e^{-x} + \frac{x^2 + 1}{2}$. 704. $y = \frac{C_1}{x + 1} + \frac{C_2}{x - 1} + x$. 705. $y = C_1(x^2 + 1) + C_2x^{-1} + 2x$. 706. $z'' + z = 0$. 707. $z'' - z = 0$. 708. $z'' = 0$. 709. $x^2z'' - 2z = 0$. 710. $4x^2z'' + (4x^2 + 1)z = 0$. 711. $y_{tt}'' - y = 0$. 712. $y_{tt}'' + y = 0$. 713. $(t^2 - 1)y_{tt}'' - 2y = 0$. 714. $y_{tt}'' + t^2y = 0$. 715. $8y_{tt}'' + t^2y = 0$. 716. $y = 1 + C_1(x - 1) + C_2(x^2 - 1)$. 717. $\int p(x)dx \rightarrow +\infty$ при $x \rightarrow +\infty$. 719. На прямых $y = 0$ и $x = x_i$, где $q(x_i) = 0$. 720. а) Нет. б) Да. в) Нет. г) Нет. 726. π / \sqrt{m} ; $[(b - a)\sqrt{m}/\pi]$ нулей или на один больше (квадратные скобки обозначают целую часть числа). 727. $0,33 < d < 0,5$. 728. $15,7 < d < 32$. 729. $0,49 < d < 1$. 730. $0,15 < d < 1,2$. 737. $u_{tt}'' + (\pm 1 + \psi^3 \psi_{xx}'') u = 0, t = \int \frac{dx}{(\psi(x))^2}, y = \psi u$.

В тех из ответов 738—750, где решение y_2 не указано, оно получается из y_1 заменой \cos на \sin .

738. $y_1 = \frac{1}{x} \cos \frac{x^3}{3} + O(1/x^4)$. 739. $y_{1,2} = x^{-1/2} e^{\pm x^{3/2}} (1 + O(x^{-2}))$. 740. $y = \frac{1}{\sqrt{x}} \cos \frac{x^2}{2} + O(x^{-5/2})$. 741. $y_1 = e^{-x^2} \cos ex + O(e^{-3/2x})$. 742. $y_{1,2} = x^{1/4} e^{\pm 2\sqrt{x}} (1 + O(x^{-1/2}))$. 743. $y_{1,2} = x^{-1/4} e^{\pm \frac{2}{3}x^{3/2}} (1 + O(x^{-3/2}))$. 744. $y_1 = x^{-3/4} \cos 2\sqrt{x} + O(x^{-5/4})$. 745. $y_1 = e^{(x-1)^2/2} \left[(2x)^{-1/4} \cos \frac{(2x)^{3/2}}{3} + O(x^{-7/4}) \right]$.
 746. $y_1 = \frac{1}{x} \cos \frac{x^3}{3} + O\left(\frac{1}{x^2}\right)$. 747. $y_{1,2} = x^{1 \pm \sqrt{5}} (1 + O(x^{-2}))$.
 748. $y_1 = \sqrt{\frac{x}{\ln x}} \left[\cos \left(\frac{1}{2} \ln^2 x - \frac{1}{8} \ln \ln x \right) + O(\ln^{-2} x) \right]$.
 749. $y_{1,2} = \left[1 \pm \frac{3}{32x^2} + \frac{105}{2048x^4} + O(x^{-6}) \right] \frac{e^{\pm x^2}}{\sqrt{2x}}$. 750. $y_1 = x^{1/4} \left(1 + \frac{3}{64x} \right) \cos \left(2\sqrt{x} + \frac{3}{16\sqrt{x}} \right) + O(x^{-5/4})$. 751. $y = (\operatorname{sh} x / \operatorname{sh} 1) - 2x$. 752. $y = x + e^{-x} - e^{-1}$. 753. $y = e^x - 2$. 754. $y = 1 - \sin x - \cos x$. 755. Решений нет. 756. $y = 2x - \pi + \pi \cos x + C \sin x$, C — произвольное. 757. $y = -2e^{-x}$. 758. $y = e^{-x} - 1$. 759. $y = -e^{(-1-i)x}$. 760. $y = 2x^3$. 761. $y = 3x^2$. 762. $y = -x^3$. 763. $a = (2n - 1)^2 \pi^2$, $n = 1, 2, 3, \dots$. 764. $G = (s - 1)x$ ($0 \leq x \leq s$), $G = s(x - 1)$ ($s \leq x \leq 1$). 765. $G = \sin s \cos x$ ($0 \leq x \leq s$), $G = \cos s \sin x$ ($s \leq x \leq \pi$). 766. $G = e^s(e^{-x} - 1)$ ($0 \leq x \leq s$), $G = 1 - e^s$ ($s \leq x \leq 1$).

767. $G = -e^{-s} \operatorname{ch} x$ ($0 \leq x \leq s$), $G = -e^{-x} \operatorname{ch} s$ ($s \leq x \leq 2$).
768. $G = \frac{1}{2} \sin |x - s|$. 769. $G = \frac{1}{x} - 1$ ($1 \leq x \leq s$), $G = \frac{1}{s} - 1$ ($s \leq x \leq 3$).
770. $G = \frac{s^2 - 4}{2s^2}$ ($1 \leq x \leq s$), $G = \frac{x^2 - 4}{2s^2}$ ($s \leq x \leq 2$).
771. $G = \frac{1 - x^3}{3s^3 x}$ ($1 \leq x \leq s$), $G = \frac{1 - s^3}{3s^3 x}$ ($s \leq x \leq 2$).
772. $G = -x$ ($0 \leq x \leq s$), $G = -s$ ($s \leq x$). 773. $G = -1$ ($0 \leq x \leq s$), $G = -e^{s-x}$ ($s \leq x < \infty$).
774. $G = -\ln x$ ($1 \leq x \leq s$), $G = -\ln s$ ($s \leq x < \infty$).
775. $G = \frac{1}{2} e^s (e^{-3x} - e^{-x})$ ($0 \leq x \leq s$), $G = \frac{1}{2} e^{-3x} (e^s - e^{3s})$ ($s \leq x < \infty$).
776. $G = (1 - x^2)/2s^2 x$ ($1 \leq x \leq s$), $G = (1 - s^2)/2s^2 x$ ($s \leq x < \infty$).
777. $G = x(s^3 - 1)/3s^2$ ($0 \leq x \leq s$), $G = s(x^3 - 1)/3x^2$ ($s \leq x \leq 1$).
778. $G = -(1/2)e^{-|x-s|}$. 779. $G = -x^2/3s^3$ ($0 \leq x \leq s$), $G = -1/3x$ ($s \leq x < \infty$).
780. $a \neq k^2 \pi^2$, $k = 1, 2, 3, \dots$
781. $-\frac{m}{2} \leq y \leq 0$, $-\frac{m}{3x} \leq y' \leq \frac{m}{3x}$.
782. $\lambda_k = -k^2 \pi^2 / l^2$, $y_k = \sin(k\pi x / l)$, $k = 1, 2, 3, \dots$
783. $\lambda_k = -k^2 \pi^2 / l^2$, $y_k = \cos(k\pi x / l)$, $k = 0, 1, 2, \dots$
784. $\lambda_k = -\left(k - \frac{1}{2}\right)^2 \frac{\pi^2}{l^2}$, $y_k = \sin\left(k - \frac{1}{2}\right) \frac{\pi x}{l}$, $k = 1, 2, 3, \dots$
785. $\lambda_k = -\left(\frac{k\pi}{\ln a}\right)^2 - \frac{1}{4}$, $y_k = \sqrt{x} \sin \frac{k\pi \ln x}{\ln a}$, $k = 1, 2, 3, \dots$
786. $x = C_1 e^t + C_2 e^{5t}$, $y = -C_1 e^t + 3C_2 e^{5t}$.
787. $x = C_1 e^{-t} + C_2 e^{3t}$, $y = 2C_1 e^{-t} - 2C_2 e^{3t}$.
788. $x = 2C_1 e^{3t} - 4C_2 e^{-3t}$, $y = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-3t}$.
789. $x = e^{2t}(C_1 \cos t + C_2 \sin t)$, $y = e^{2t}[(C_1 + C_2) \cos t + (C_2 - C_1) \sin t]$.
790. $x = e^t(C_1 \cos 3t + C_2 \sin 3t)$, $y = e^t(C_1 \sin 3t - C_2 \cos 3t)$.
791. $x = (2C_2 - C_1) \cos 2t - (2C_1 + C_2) \sin 2t$, $y = C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t$.
792. $x = (C_1 + C_2 t)e^{3t}$, $y = (C_1 + C_2 + C_2 t)e^{3t}$.
793. $x = (C_1 + C_2 t)e^t$, $y = (2C_1 - C_2 + 2C_2 t)e^t$.
794. $x = (C_1 + 2C_2 t)e^{-t}$, $y = (C_1 + C_2 + 2C_2 t)e^{-t}$.
795. $x = (C_1 + 3C_2 t)e^{2t}$, $y = (C_2 - C_1 - 3C_2 t)e^{2t}$.
796. $x = C_1 e^t + C_2 e^{2t} + C_3 e^{-t}$, $y = C_1 e^t - 3C_3 e^{-t}$, $z = C_1 e^t + C_2 e^{2t} - 5C_3 e^{-t}$.
797. $x = C_1 + 3C_2 e^{2t}$, $y = -2C_2 e^{2t} + C_3 e^{-t}$, $z = C_1 + C_2 e^{2t} - 2C_3 e^{-t}$.
798. $x = C_2 e^{2t} + C_3 e^{3t}$, $y = C_1 e^t + C_2 e^{2t}$, $z = C_1 e^t + C_2 e^{2t} + C_3 e^{3t}$.
799. $x = C_1 e^t + C_2 e^{2t} + C_3 e^{5t}$, $y = C_1 e^t - 2C_2 e^{2t} + C_3 e^{5t}$, $z = -C_1 e^t - 3C_2 e^{2t} + 3C_3 e^{5t}$.
800. $x = C_1 e^t + C_3 e^{-t}$, $y = C_1 e^t + C_2 e^{2t}$, $z = 2C_2 e^{2t} - C_3 e^{-t}$.
801. $x = e^t(2C_2 \sin 2t + 2C_3 \cos 2t)$, $y = e^t(C_1 - C_2 \cos 2t + C_3 \sin 2t)$, $z = e^t(-C_1 - 3C_2 \cos 2t + 3C_3 \sin 2t)$.
802. $x = C_1 e^{2t} + e^{3t}(C_2 \cos t + C_3 \sin t)$, $y = e^{3t}[(C_2 + C_3) \cos t + (C_3 - C_2) \sin t]$, $z = C_1 e^{2t} + e^{3t}[(2C_2 - C_3) \cos t + (2C_3 + C_2) \sin t]$.
803. $x = C_2 \cos t + (C_2 + 2C_3) \sin t$, $y = 2C_1 e^t + C_2 \cos t +$

$+ (C_2 + 2C_3) \sin t, \quad z = C_1 e^t + C_3 \cos t - (C_2 + C_3) \sin t.$
804. $x = C_1 e^{2t} + (C_2 + C_3) e^{3t}, \quad y = C_1 e^{2t} + C_2 e^{3t}, \quad z = C_1 e^{2t} + C_3 e^{3t}.$ **805.** $x = C_1 + C_2 e^t, \quad y = 3C_1 + C_3 e^t, \quad z = -C_1 + (C_2 - C_3) e^t.$ **806.** $x = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-t}, \quad y = -C_1 e^{3t} + (C_2 + 2C_3) e^{-t}, \quad z = -3C_1 e^{3t} + C_3 e^{-t}.$ **807.** $x = C_1 e^{2t} + C_3 e^{-5t}, \quad y = C_2 e^{2t} + 3C_3 e^{-5t}, \quad z = (C_1 - 2C_2) e^{2t} + 2C_3 e^{-5t}.$ **808.** $x = (C_1 + C_2) e^t + C_3 e^{2t}, \quad y = (C_1 - 2C_2 + C_2 t) e^t, \quad z = (C_1 - C_2 + C_2 t) e^t + C_3 e^{2t}.$ **809.** $x = (C_2 + C_3) e^{-t}, \quad y = 2C_1 e^t - (2C_2 + C_3 + 2C_3 t) e^{-t}, \quad z = C_1 e^t - (C_2 + C_3 + C_3 t) e^{-t}.$ **810.** $x = C_1 + C_2 t + 4C_3 e^{3t}, \quad y = C_2 - 2C_1 - 2C_2 t + 4C_3 e^{3t}, \quad z = C_1 - C_2 + C_2 t + C_3 e^{3t}.$ **811.** $x = (C_1 + C_3 t) e^t, \quad y = (C_2 + 2C_3 t) e^t, \quad z = (C_1 - C_2 - C_3 - C_3 t) e^t.$ **812.** $x = (C_1 + C_2 t + C_3 t^2) e^{2t}, \quad y = [2C_1 - C_2 + (2C_2 - 2C_3)t + 2C_3 t^2] e^{2t}, \quad z = [C_1 - C_2 + 2C_3 + (C_2 - 2C_3)t + C_3 t^2] e^{2t}.$ **813.** $x = 3C_1 e^t + 3C_2 e^{-t} + C_3 \cos t + C_4 \sin t, \quad y = C_1 e^t + C_2 e^{-t} + C_3 \cos t + C_4 \sin t.$ **814.** $x = -2e^t(C_1 + C_2 + C_3 t) - 2e^{-t}(C_3 - C_4 + C_4 t), \quad y = e^t(C_1 + C_2 t) + e^{-t}(C_3 + C_4 t).$ **815.** $x = e^t(C_1 \cos t + C_2 \sin t) + e^{-t}(C_3 \cos t + C_4 \sin t), \quad y = e^t(C_1 \sin t - C_2 \cos t) + e^{-t}(C_4 \cos t - C_3 \sin t).$ **816.** $x = C_1 e^t + C_2 e^{-t} + C_3 e^{2t} + C_5 e^{-2t}, \quad y = C_1 e^t + C_2 e^{-t} + C_4 e^{2t} + C_6 e^{-2t}, \quad z = C_1 e^t + C_2 e^{-t} - (C_3 + C_4) e^{2t} - (C_5 + C_6) e^{-2t}.$ **817.** $x = 3C_1 e^t + C_2 e^{-t}, \quad y = C_1 e^t + C_2 e^{-t}.$ **818.** $x = C_1 e^t + C_2 e^{-t} + 2C_3 e^{-2t}, \quad y = 2C_1 e^t + C_3 e^{-2t}.$ **819.** $x = 3C e^{-t}, \quad y = C e^{-t}.$ **820.** $x = -2C_2 e^{3t} + C_3 e^t, \quad y = C_1 e^{-t} + C_2 e^{3t}.$ **821.** $x = 2C_1 e^{2t} + 2C_2 e^{-2t} + 2C_3 \cos 2t + 2C_4 \sin 2t, \quad y = 3C_1 e^{2t} - 3C_2 e^{-2t} - C_3 \sin 2t + C_4 \cos 2t.$ **822.** $x = C_1 e^{2t} - 4C_2 e^{-2t}, \quad y = C_1 e^{2t} + C_2 e^{-2t}.$ **823.** $x = (C_1 + C_2 t) e^t + C_3 e^{-t}, \quad y = (-2C_1 - C_2 - 2C_3 t) e^t - 4C_3 e^{-t}.$ **824.** $x = C_1 e^t + C_2 e^{-t} + C_3 e^{2t} + C_4 e^{-2t}, \quad y = C_1 e^t + 5C_2 e^{-t} + 2C_3 e^{2t} + 2C_4 e^{-2t}.$ **825.** $x = C_1 + C_2 e^t + C_3 \cos t + C_4 \sin t, \quad y = -C_1 - C_2 e^t + \left(\frac{3}{5}C_4 - \frac{4}{5}C_3\right) \cos t - \left(\frac{3}{5}C_3 + \frac{4}{5}C_4\right) \sin t.$ **826.** $x = C_1 e^t + C_2 e^{-t} + t e^t - t^2 - 2, \quad y = C_1 e^t - C_2 e^{-t} + (t - 1) e^t - 2t.$ **827.** $x = C_1 e^{2t} + C_2 e^{-2t} - 2 \sin t - \cos t, \quad y = 2C_1 e^{-2t} - C_2 e^{-t} + \sin t + 3 \cos t.$ **828.** $x = C_1 e^t + 2C_2 e^{4t} + 3e^{6t}, \quad y = -C_1 e^t + C_2 e^{4t} + e^{5t}.$ **829.** $x = C_1(\cos 2t - \sin 2t) + C_2(\cos 2t + \sin 2t), \quad y = C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t + e^{-2t}.$ **830.** $x = C_1 e^{2t} + C_2 e^{3t} + (t + 1) e^{2t}, \quad y = -2C_1 e^{2t} - C_2 e^{3t} - 2t e^{2t}.$ **831.** $x = (C_1 + 2C_2) e^t - 3, \quad y = (C_1 + C_2 + 2C_2 t) e^t - 2.$ **832.** $x = C_1 e^{2t} + 3C_2 e^{4t} - e^{-t} - 4e^{3t}, \quad y = C_1 e^{2t} + C_2 e^{4t} - 2e^{-t} - 2e^{3t}.$ **833.** $x = C_1 e^t \cos t + C_2 e^t \sin t + e^t + t + 1, \quad y = C_1 e^t(-\cos t - \sin t) + C_2 e^t(\cos t - \sin t) - 2e^t - 2t - 1.$ **834.** $x = C_1 e^{-t} + 2C_2 e^{2t} - \cos t + 3 \sin t, \quad y = -C_1 e^{-t} + C_2 e^{2t} + 2 \cos t - \sin t.$ **835.** $x = 4C_1 e^t + C_2 e^{-2t} - 4t e^t, \quad y = C_1 e^t + C_2 e^{-2t} - (t - 1) e^t.$

836. $x = C_1 e^{3t} + 3t^2 + 2t + C_2$, $y = -C_1 e^{3t} + 6t^2 - 2t + 2C_2 - 2$. 837. $x = 2C_1 e^{2t} + C_2 e^{-3t} - (12t + 13)e^t$, $y = C_1 e^{2t} - 2C_2 e^{-3t} - (8t + 6)e^t$. 838. $x = 2C_1 e^{8t} - 2C_2 - 6t + 1$, $y = 3C_1 e^{8t} + C_2 + 3t$. 839. $x = 3C_1 e^t + C_2 e^{-t} + 3 \sin t$, $y = C_1 e^t + C_2 e^{-t} - \cos t + 2 \sin t$. 840. $x = C_1 \cos t + C_2 \sin t + t \sin t - t \cos t$, $y = C_1 (\sin t + \cos t) + C_2 (\sin t - \cos t) - 2t \cos t + \sin t + \cos t$. 841. $x = (C_1 + C_2 t - t^2)e^t$, $y = [C_1 - C_2 + (C_2 + 2)t - t^2]e^t$. 842. $x = C_1 e^t + 3C_2 e^{2t} + \cos t - 2 \sin t$, $y = C_1 e^t + 2C_2 e^{2t} + 2 \cos t - 2 \sin t$. 843. $x = C_1 e^t + C_2 e^{3t} + te^t - e^{4t}$, $y = -C_1 e^t + C_2 e^{3t} - (t + 1)e^t - 2e^{4t}$. 844. $x = C_1 \cos 2t - C_2 \sin 2t + 2t + 2$, $y = (C_1 + 2C_2) \cos 2t + (2C_1 - C_2) \sin 2t + 10t$. 845. $x = C_1 e^t + C_2 e^{3t} + e^t(2 \cos t - \sin t)$, $y = C_1 e^t - C_2 e^{3t} + e^t(3 \cos t + \sin t)$. 846. $x = C_1 \cos t + C_2 \sin t + tg t$, $y = -C_1 \sin t + C_2 \cos t + 2$. 847. $x = C_1 e^t + 2C_2 e^{2t} - e^t \ln(e^{2t} + 1) + 2e^{2t} \operatorname{arctg} e^t$, $y = C_1 e^t + 3C_2 e^{2t} - e^t \ln(e^{2t} + 1) + 3e^{2t} \operatorname{arctg} e^t$. 848. $x = C_1 + 2C_2 e^{-t} + 2e^{-t} \ln|e^t - 1|$, $y = -2C_1 - 3C_2 e^{-t} - 3e^{-t} \ln|e^t - 1|$. 849. $x = C_1 \cos t + C_2 \sin t + t(\cos t + \sin t) + (\cos t - \sin t) \ln|\cos t|$, $y = (C_1 - C_2) \cos t + (C_1 + C_2) \sin t + 2 \cos t \ln|\cos t| + 2t \sin t$. 850. $x = (C_1 + 2C_2 t - 8t^{5/2})e^t$, $y = (C_1 + 2C_2 t - C_2 - 8t^{5/2} + 10t^{3/2})e^t$. 851. $x = C_1 e^{3t} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 e^{3t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. 852. $x = C_1 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$. 853. $x = C_1 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{-t} \begin{pmatrix} 2t \\ 2t - 1 \end{pmatrix}$. 854. $x = C_1 e^t \begin{pmatrix} \cos 2t \\ \cos 2t + \sin 2t \end{pmatrix} + C_2 e^t \begin{pmatrix} \sin 2t \\ \sin 2t - \cos 2t \end{pmatrix}$. 855. $x = C_1 e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_3 e^{-t} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. 856. $x = C_1 e^{2t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} + C_3 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$. 857. $x = C_1 e^t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 2 \cos t \\ 2 \cos t \\ 3 \cos t - \sin t \end{pmatrix} + C_3 \begin{pmatrix} 2 \sin t \\ 2 \sin t \\ 3 \sin t + \cos t \end{pmatrix}$. 858. $x = C_1 e^{-2t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + C_2 e^{-t} \begin{pmatrix} \cos 2t \\ -\sin 2t \\ \cos 2t \end{pmatrix} + C_3 e^{-t} \begin{pmatrix} \sin 2t \\ \cos 2t \\ \sin 2t \end{pmatrix}$. 859. $x = C_1 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + C_2 e^t \begin{pmatrix} \cos t - \sin t \\ \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} + C_3 e^t \begin{pmatrix} \cos t + \sin t \\ \sin t \\ -\cos t \end{pmatrix}$. 860. $x = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_3 e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. 861. $x = C_1 e^{3t} \times$

$$\times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + C_2 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_3 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}. \quad 862. \quad x = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} +$$

$$+ C_2 e^t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + C_3 e^t \begin{pmatrix} 1 \\ t+1 \\ -t \end{pmatrix}. \quad 863. \quad x = C_1 e^{-t} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} +$$

$$+ C_3 e^t \begin{pmatrix} 2t \\ 2t \\ 2t+1 \end{pmatrix}. \quad 864. \quad x = C_1 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 e^{-t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} +$$

$$+ C_3 e^{-t} \begin{pmatrix} t+1 \\ t \\ 2t \end{pmatrix}. \quad 865. \quad x = C_1 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} +$$

$$+ C_3 e^{2t} \begin{pmatrix} 2t+1 \\ t \\ 3t \end{pmatrix}. \quad 866. \quad x = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} t \\ t-1 \\ 2t-1 \end{pmatrix} + C_3 \times$$

$$\times \begin{pmatrix} t^2 \\ t^2 - 2t + 2 \\ 2t^2 - 2t \end{pmatrix}. \quad 867. \quad \begin{pmatrix} e^3 & 0 \\ 0 & e^{-2} \end{pmatrix}. \quad 868. \quad \begin{pmatrix} \cos 1 & \sin 1 \\ -\sin 1 & \cos 1 \end{pmatrix}.$$

$$869. \quad \begin{pmatrix} e^2 & e^2 \\ 0 & e^2 \end{pmatrix}. \quad 870. \quad \begin{pmatrix} 2e^2 - e & e - e^2 \\ 2e^2 - 2e & 2e - e^2 \end{pmatrix}. \quad 871. \quad \begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$872. \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & e^2 \end{pmatrix}.$$

$$873. \quad \begin{pmatrix} e^2 & e^2 & \frac{e^2}{2} \\ 0 & e^2 & e^2 \\ 0 & 0 & e^2 \end{pmatrix}. \quad 874. \quad e^2. \quad 875. \quad e^{-t}. \quad 876. \quad x = d \cos at,$$

$$y = \frac{v}{a} \sin at; \text{ эллипс } \left(\frac{x}{d}\right)^2 + \left(\frac{ay}{v}\right)^2 = 1. \quad 877. \quad x = C_1 \times$$

$$\times \sin\left(\frac{at}{\sqrt{6}} + C_2\right), \quad y = \frac{3}{2} C_1 \sin\left(\frac{at}{\sqrt{6}} + C_2\right); \quad x = C_3 \sin(at + C_4),$$

$$y = -C_3 \sin(at + C_4). \quad 878. \quad \frac{1}{2\pi} \sqrt{K\left(\frac{1}{I_1} + \frac{1}{I_2}\right)}. \quad 879. \quad I =$$

$$= A \sin(\omega t - \varphi), \quad A = \frac{V}{\sqrt{R^2 + (\omega L / (1 - \omega^2 LC))^2}}; \quad \max A = \frac{V}{R} \text{ при}$$

$\omega = 0$ и $\omega = \infty$, $\min A = 0$ при $\omega^2 = \frac{1}{LC}$. 880. $\lambda \neq \frac{2\pi k}{\omega} t$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 881. а) неустойчиво; б) устойчиво; в) устойчиво; г) неустойчиво. 882. Асимптотически устойчиво. 883. Неустойчиво. 884. Неустойчиво. 885. Устойчиво. 886. Устойчиво.

887. Неустойчиво. 888. Устойчиво. 889. Все решения стремятся к нулю. Нет, нет. 890. Устойчиво. 891. Асимптотически устойчиво. 892. Неустойчиво. 898. Нет. 899. Устойчиво. 900. Неустойчиво. 901. Неустойчиво. 902. Устойчиво. 903. Неустойчиво. 904. Устойчиво. 905. Устойчиво. 906. Неустойчиво. 907. $-2 < a < -1$. 908. $a < -1$. 909. $ab < -3$. 910. $a < b < -1$. 911. $0 < a < 2$. 912. $-be < a < -e$. 913. Устойчиво. 914. Неустойчиво. 915. (0, 0) неустойчиво, (1, 2) устойчиво. 916. (1, 2) и (2, 1) неустойчивы. 917. (2кл, 0) неустойчивы, $((2k + 1)\pi, 0)$ устойчивы. 918. (3, 2) неустойчиво, (0, -1) устойчиво. 919. (2, 1) устойчиво, (-2, 1) неустойчиво. 920. (1, 1) неустойчиво, (-4, -4) устойчиво. 921. (2кл, 0) неустойчивы, $((2k + 1)\pi, 0)$ устойчивы. 922. (-1, 2кл) устойчивы, (-1, $(2k + 1)\pi$) неустойчивы. 923. Неустойчиво. 924. Устойчиво. 925. Устойчиво. 926. Неустойчиво. 927. Устойчиво. 928. Устойчиво. 929. Неустойчиво. 930. Устойчиво. 931. Устойчиво. 932. Неустойчиво. 933. Устойчиво. 934. Устойчиво. 935. Неустойчиво. 936. Устойчиво. 937. Неустойчиво. 938. Неустойчиво. 939. Неустойчиво. 940. Устойчиво. 941. Неустойчиво. 942. Устойчиво. 943. Неустойчиво. 944. Неустойчиво. 945. Устойчиво. 946. Неустойчиво. 947. Устойчиво. 948. Неустойчиво. 949. $a > 0$, $b > 0$, $ab > 2$. 950. $3a > b > 0$. 951. $0 < a < 2$. 952. Неустойчиво при всех a . 953. $a > 0$, $b > 0$, $a + b < 1$. 954. $b > 0$, $a > b + 1$. 955. $a > 0$, $b > 0$, $8a - a^2b > 4$. 956. $a > 2$, $b > 0$, $2ab - b^2 > 4$. 957. $a > 0$, $b > 0$, $2 - \sqrt{3} < \frac{a}{b} < 2 + \sqrt{3}$.

958. 0 < a < 8, 0 < b < 8a - a². 959. а) устойчиво; б) устойчиво; в) неустойчиво; г) неустойчиво; д) неустойчиво; е) устойчиво. 960. $-4 < ab < 0$ и $a = b = 0$. 961. Седло. 962. Узел. 963. Фокус. 964. Узел. 965. Седло. 966. Центр. 967. Вырожденный узел. 968. Узел. 969. Особый узел. 970. Фокус. 971. Узел. 972. Вырожденный узел. 973. Фокус. 974. Седло. 975. Центр. 976. Вырожденный узел. 977 и 978. Особые точки заполняют прямую линию. 979. (-2, -1) — узел. 980. (1, -2) — фокус. 981. (4, 2) узел, (-2, -1) фокус. 982. (1, 0) особый узел, (-1, 0) седло. 983. (1, 1) фокус, (-1, -1) седло. 984. (0, -1) вырожденный узел, (2, -3) седло. 985. (2, 4) узел, (-1, 1) седло. 986. (1, 1) фокус, (-1, -1) седло. 987. (2, 1) узел, (1, 2) седло, (-1, -2) фокус. 988. (1, -1) фокус, (0, -2) седло, (-2, 2) узел. 989. (-2, 4) узел, (1, 1) фокус, (2, 4) и (-1, 1) седла. 990. (-2, 2) вырожденный узел, (1, -1) фокус, (2, 2) и (-1, -1) седла. 991. (3, 0) фокус, (1, 1) узел, (-1, 1) и (-3, 0) седла. 992. (0, 1) и (0, -1) седла, (-1, 0) фокус, (3, 2) узел. 993. В области $y > 0$ интегральные кривые расположены как у седла, в области $y < 0$ — как у узла. 994. Через (0, 0) проходит одна кривая, имеющая там точку возврата первого рода. Остальные кривые не заходят в особую точку. 995. Из области $y < 0$ все интегральные кривые обоими концами входят в особую точку, а из области $y > 0$ не входит ни одна. 996. Две интегральные кривые проходят через особую точку, касаясь друг друга. Остальные кривые расположены, как у седла. 997. Из области $y > 0$ кривые не входят в особую точку. В области $y < 0$, $x < 0$ расположение кривых напоминает вырожденный узел, а в области $y < 0$, $x > 0$ — седло. 1021. (0, 1) седло, (0, -1) фокус. 1022. (1, 2) седло, (-1, 2) узел. 1023. (1, 0) седло, (0, 2) вырожденный узел.

1024. (0, 1) центр, (0, -1) седло. **1025.** (2, 2) узел, (0, -2) седло, (-1, -1) фокус. **1026.** (2, 2) седло, (4, 1) и (-2, -2) фокусы. **1027.** (1, 0) и (-1, 0) седла, (0, 1) и (0, -1) центры. **1028.** (1, 1) седло, (1, -1) узел, (2, 2) и (-2, 2) фокусы. **1029.** (0, 1) и (0, -1) седла, (1, 0) фокус, (-3, 2) узел. **1030.** (1, -1) и (-1, 1) узлы, (3, 3) и (-3, -3) седла. **1031.** (1, -1) и (-1, 1) седла, (3, 3) и (-3, -3) узлы. **1032.** (0, 0) фокус, (7, 1) узел, (0, 8) и (3, -1) седла. **1033.** (0, 0) фокус, (2, 4) узел, (1, 1) и (-1, 1) седла. **1034.** (2, 1) узел, (-1, 2) фокус, (1, 2) и (1, -2) седла.

1035. $l\ddot{\varphi} + g \sin \varphi = 0$. **1036.** $m l \ddot{\varphi} + k l^2 \dot{\varphi} |\dot{\varphi}| + m g \sin \varphi = 0$. **1037.** $\ddot{\varphi} + \sin \varphi = \frac{1}{2}$. **1038.** $m \ddot{x} + f \operatorname{sgn} \dot{x} + kx = 0$. **1039.** В $(L/l)^3$ раз. **1047.** $f(r_0) = 0$; при возрастании r функция $f(r)$ меняет знак с + на -; меняет знак с - на +; не меняет знака при переходе через нуль. **1048.** $a < -1/2$; $a > -1/2$. **1053.** $x = \pm b \operatorname{cth} \frac{\pi a}{2 \sqrt{1-a^2}}$. **1054.** $\dot{x} = y$; $\frac{d}{dt}(x^2 + y^2) = -2yF(y) < 0$ при $y \neq 0$. **1056.** Меньше, чем на 0,03. **1057.** Меньше, чем на $0,05(e^{2T} - 1)$. **1058.** Ошибка меньше 0,081. **1059.** $|\tilde{y} - y| < 0,016$. **1060.** $|\tilde{x} - x| + |\tilde{y} - y| < 0,0012$. **1061.** $|\tilde{y} - y| < 0,002$. **1062.** $|\tilde{y} - y| < 0,015$. **1063.** $|\tilde{y} - y| < 0,034$.

1064. $e^{2x} - x - 1$. **1065.** $\frac{x^5}{5} - \frac{2x^3}{3} + x + 1$. **1066.** e^{x-2} . **1067.** $t(e^{-1} - e^{-t})$. **1068.** $\frac{1-t-\ln(1-t)}{(1-t)^2}$. **1069.** t^8 .

1070. $t^2 \ln t + 2t^2 - 2t$. **1071.** $-e^{2t} - 2e^{-t} - 3e^{-2t}$. **1072.** $-\frac{e^{2t}}{72} - \frac{e^{-2t}}{4} + \left(\frac{5}{36} - \frac{t}{3}\right)e^{-t} + \frac{1}{8}$. **1073.** $\frac{t^2}{3} - \frac{1}{3t}$. **1074.** $y = \frac{1}{x} + \mu \left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right) + \mu^2 \left(-\frac{x^5}{7} + \frac{2x}{3} - \frac{32}{21x^2} + \frac{1}{x^3}\right) + O(\mu^3)$. **1075.** $y = 2\sqrt{x} + 2\mu(x^{-1/2} - x^2) + \mu^2 \left(\frac{1}{4}x^{7/2} - \frac{4}{3}x + \frac{25}{12}x^{-1/2} - x^{-3/2}\right) + O(\mu^3)$. **1076.** $y = 1 + \mu(x^2 - x) + \mu^2 x(1 - x)^3/6 + O(\mu^3)$. **1077.** $y = \frac{1}{x} + 3\mu + \mu^2 \left(\frac{3}{x^2} - 3x\right) + O(\mu^3)$. **1078.** $y = x - \mu(x+1) + (\mu^2/2)(e^x - x^2 - 2x - 1) + O(\mu^3)$. **1079.** $x = \sin t + \mu \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2} \cos 2t\right) + \mu^2 \left(\frac{1}{2} \sin t - \frac{1}{6} \sin 3t\right) + O(\mu^3)$. **1080.** $x = \cos 2t + \mu \left(\frac{1}{10} - \frac{1}{22} \cos 4t\right) + \mu^2 \left(\frac{17}{110} \cos 2t + \frac{1}{682} \cos 6t\right) + O(\mu^3)$. **1081.** $x = \mu \cos t + \mu^3 \left(-\frac{3}{8} \cos t + \frac{1}{24} \cos 3t\right) + O(\mu^5)$. **1082.** $x_1 = 1 + \mu \sin t - \frac{\mu^2}{4}(1 + \cos 2t) + O(\mu^3)$, $x_2 = -1 - \frac{\mu}{3} \sin t +$

$$\begin{aligned}
& + \frac{\mu^2}{36} \left(1 - \frac{1}{3} \cos 2t \right) + O(\mu^3). \quad 1083. \quad x_1 = -\frac{\mu}{3} \sin 2t + \frac{\mu^3}{648} \left(\sin 2t - \right. \\
& \left. - \frac{1}{35} \sin 6t \right) + O(\mu^5), \quad x_2 = \pi - \frac{\mu}{5} \sin 2t - \frac{\mu^3}{1000} \left(\frac{1}{5} \sin 2t - \frac{1}{111} \times \right. \\
& \left. \times \sin 6t \right) + O(\mu^5). \quad 1084. \quad x = \frac{1}{8} \sin t + \frac{1}{3} \sin 2t - \frac{1}{8} \sin 3t + \\
& + O(\mu). \quad 1085. \quad x = 2\mu^{\frac{1}{3}} \sin t - \mu \left(\frac{1}{12} \sin t + \frac{1}{4} \sin 3t \right) + O\left(\mu^{\frac{5}{3}}\right). \\
& 1086. \quad x = C \cos \tau + C^2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \cos \tau - \frac{1}{6} \cos 2\tau \right) + O(C^3), \quad \tau = \\
& = t \left(1 - \frac{5}{12} C^2 + O(C^3) \right) + C_2. \quad 1087. \quad x = C \cos \tau + \frac{C^2}{32} (\cos 3\tau - \\
& - \cos \tau) + O(C^5), \quad \tau = t \left(1 + \frac{3}{8} C^2 + O(C^4) \right) + C_2. \quad 1088. \quad x = \\
& = C \cos \tau + \frac{C^3}{192} (\cos \tau - \cos 3\tau) + O(C^5), \quad \tau = t \left(1 - \frac{C^2}{16} + O(C^4) \right) + \\
& + C_2. \quad 1089. \quad x = 2 \cos \tau + \frac{3\mu}{4} \sin \tau - \frac{\mu}{4} \sin 3\tau + O(\mu^2), \quad \tau = \\
& = t \left(1 - \frac{\mu^2}{16} + O(\mu^4) \right) + C. \quad 1090. \quad x = \frac{2}{\sqrt{3}} \cos \tau + \frac{\mu}{12\sqrt{3}} \sin 3\tau + \\
& + O(\mu^2), \quad \tau = \left(1 - \frac{\mu^2}{16} + O(\mu^3) \right) t + C. \quad 1091. \quad y = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \\
& + \frac{2x^3}{3} + \frac{7x^4}{12} + \dots \quad 1092. \quad y = 1 + x + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{3} + \dots \quad 1093. \quad y = \\
& = \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{6} + \dots \quad 1094. \quad y = x + x^2 - \frac{x^3}{6} - \frac{x^4}{4} - \dots \\
& 1095. \quad y = 1 + 2(x-1) + 4(x-1)^2 + \frac{25}{3}(x-1)^3 + \frac{81}{4}(x- \\
& - 1)^4 + \dots \quad 1096. \quad y = 1 + 2x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{3} - \dots \quad 1097. \quad y = \\
& = 4 - 2x + 2x^2 - 2x^3 + \frac{19}{6}x^4 + \dots \quad 1098. \quad R > 0,73. \quad 1099. \quad \text{Ошиб-} \\
& \text{ка меньше } 0,00024. \quad 1100. \quad y_1 = 1 + \frac{x^4}{3 \cdot 4} + \frac{x^8}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8} + \dots, \\
& y_2 = x + \frac{x^5}{4 \cdot 5} + \frac{x^9}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9} + \dots \quad 1101. \quad y_1 = 1 + \frac{x^2}{1} + \\
& + \frac{x^4}{1 \cdot 3} + \frac{x^6}{1 \cdot 3 \cdot 5} + \dots, \quad y_2 = x + \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{2 \cdot 4} + \frac{x^7}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \\
& + \dots = x e^{\frac{x^2}{2}}. \quad 1102. \quad y_1 = 1 + x^2 + x^4 + \dots = \frac{1}{1-x^2}, \quad y_2 = x + \\
& + x^3 + x^5 + \dots = \frac{x}{1-x^2}. \quad 1103. \quad y_1 = 1 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{3 \cdot 5}{2 \cdot 4}x^4 - \dots =
\end{aligned}$$

$$= (1+x^2)^{-\frac{3}{2}}, y_2 = x - \frac{4}{3}x^3 + \frac{4 \cdot 6}{3 \cdot 5}x^5 - \dots \quad 1104. \quad y_1 = 1 - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{2} - \frac{11x^4}{24} - \dots, \quad y_2 = x + x^2 + \frac{5x^3}{6} + \frac{3x^4}{4} + \dots$$

$$1105. \quad y_1 = 1 + x - x^3 - x^4 + x^6 + x^7 - \dots = \frac{1}{1-x+x^2},$$

$$y_2 = xy_1. \quad 1106. \quad y_1 = 1 - \frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{40} + \dots, \quad y_2 = x + \frac{x^3}{6} - \frac{x^4}{12} + \dots$$

$$1107. \quad y_1 = 1 - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \dots, \quad y_2 = x - \frac{x^4}{12} + \frac{x^6}{180} + \dots$$

$$1108. \quad y_1 = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{12} + \frac{5x^4}{72} + \dots, \quad y_2 = x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \dots$$

$$1109. \quad y_1 = 1 - \frac{x^3}{6} + \dots, \quad y_2 = x + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{12} + \dots, \quad y_3 = x^2 + \frac{x^4}{4} - \dots \quad 1110. \quad y_1 = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \dots = \frac{\sin x}{x}, \quad y_2 =$$

$$= \frac{1}{x} - \frac{x}{2!} + \frac{x^3}{4!} - \dots = \frac{\cos x}{x}. \quad 1111. \quad y_1 = \frac{1}{x} + 1 + \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{3!} + \dots = \frac{e^x}{x}, \quad y_2 = |x|^{1/2} \left(1 + \frac{2x}{5} + \frac{(2x)^2}{5 \cdot 7} + \frac{(2x)^3}{5 \cdot 7 \cdot 9} + \dots \right).$$

$$1112. \quad y_1 = x^{1/3} \left(1 + \frac{x^2}{5 \cdot 6} + \frac{x^4}{5 \cdot 6 \cdot 11 \cdot 12} + \dots \right), \quad y_2 = x^{2/3} \left(1 + \frac{x^2}{6 \cdot 7} + \frac{x^4}{6 \cdot 7 \cdot 12 \cdot 13} + \dots \right). \quad 1113. \quad y_1 = \frac{1}{x} + 1 + \frac{x}{2}, \quad y_2 = x^2 +$$

$$+ \frac{x^3}{4} + \frac{x^4}{4 \cdot 5} + \frac{x^5}{4 \cdot 5 \cdot 6} + \dots = 6 \left(\frac{e^x - 1}{x} - 1 - \frac{x}{2} \right). \quad 1114. \quad y_1 = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{2} + \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{40} + \frac{7x^4}{720} + \dots, \quad y_2 = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{5} + \frac{x^4}{20} + \dots$$

$$1115. \quad y_1 = x + x^2 + \frac{x^3}{2!} + \frac{x^4}{3!} + \dots = xe^x. \quad 1116. \quad y_1 = 1 + \frac{x^2}{2^2} + \frac{x^4}{2^2 \cdot 4^2} + \frac{x^6}{2^2 \cdot 4^2 \cdot 6^2} + \dots \quad 1117. \quad y_2 = \left(1 + \frac{x^2}{2^2} + \frac{x^4}{2^2 \cdot 4^2} + \dots \right) \times$$

$\times \ln |x| - \frac{x^2}{4} - \frac{3x^4}{128} - \dots$ 1118. y_1 и y_2 — обобщенные степенные ряды с иррациональными показателями. 1119. y_1 и y_2 — ряды с комплексными показателями. 1120. Решений в виде обобщенных степенных рядов нет, так как получаемый ряд $y = 1 + 1!x + 2!x^2 + 3!x^3 + \dots$ имеет нулевой радиус сходимости.

$$1121. \quad y = -\frac{\pi}{6} + \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k-1)}{(2k-1)^2(k^2-k+1)}. \quad 1122. \quad y =$$

$$= \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{16k^4 - 4k^2 + 1} \left(\cos 2kx - \frac{2k}{4k^2 - 1} \sin kx \right).$$

1123. $y = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k^3 + k) \cos kx - \sin kx}{2^k [(k^3 + k)^2 + 1]}$. **1124.** $y = -\frac{1}{6\pi^2} +$
 $+\frac{1}{\pi^4} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos 2k\pi x}{k^2 (4k^2 + 1)}$. **1125.** $y = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin 2kx}{k^2 (9 - 4k^2)} + C_1 \cos 3x +$
 $+ C_2 \sin 3x$. **1136.** $1 \leq y \leq \sqrt{3}$. **1137.** $1 + x^2 < y < 1 +$
 $+ x^2 + \operatorname{arctg} x$. **1141.** $y = C_2 e^{C_1 x^3}$, $z = \frac{1}{2C_1 C_2} e^{-C_1 x^3}$. **1142.** $y =$
 $= C_2 e^{C_1 x}$, $z = x + \frac{C_2}{C_1} e^{C_1 x}$; $y = 0$, $z = x + C$. **1143.** $y = \frac{x + C_1}{x + C_2}$,
 $z = \frac{(C_2 - C_1)x}{(x + C_2)^2}$. **1144.** $y = C_2 e^{C_1 x^3}$, $z = \frac{2C_1}{C_2} x e^{-C_1 x^3}$; $y = 0$,
 $z = Cx$. **1145.** $y = -\frac{1}{C_1} + \frac{C_1}{2} (x + C_2) - \frac{C_1}{4} (x + C_2)^2$,
 $z = \frac{C_1}{4} (x + C_2)^2 + \frac{1}{C_1}$. **1146.** $y = C_1 z$, $x = 2y - z + C_2$.
1147. $x^2 - y^2 = C_1$, $x + y = C_2 z$. **1148.** $x - y = C_1 (y - z)$, $(x +$
 $+ y + z)(x - y)^2 = C_2$. **1149.** $x + z = C_1$, $(x + y + z)(y -$
 $- 3x - z) = C_2$. **1150.** $x^2 - z^2 = C_1$, $y^2 - u^2 = C_2$, $(x + z) =$
 $= C_3 (u + y)$. **1151.** $x + z = C_1$, $y + u = C_2$, $(x - z)^3 + (y -$
 $- u)^2 = C_3$. **1152.** $x^2 - 2y = C_1$, $6xy - 2x^3 - 3z^2 = C_2$.
1153. $y^2 + z^2 = C_1$, $x - yz = C_2$. **1154.** $x = C_1 y$, $xy - z = C_2 x$.
1155. $x = C_1 y$, $xy - 2\sqrt{z^2 + 1} = C_2$. **1156.** $y = C_1 z$, $x - y^2 -$
 $- z^2 = C_2 z$. **1157.** $y^2 + z^2 = C_1$, $x(y - z) = C_2$. **1158.** $xz = C_1$,
 $xy + z^2 = C_2$. **1159.** $x + z - y = C_1$, $\ln |x| + \frac{z}{y} = C_2$. **1160.** $x^2 +$
 $+ y^2 + z^2 = C_1$, $yz = C_2 x$. **1161.** 1) да; 2) нет. **1162.** 1) нет;
2) да. **1163.** Да. **1164.** Зависимы. **1167.** $z = f(x^2 + y^2)$. **1168.** $z =$
 $= f(xy + y^2)$. **1169.** $u = f(y/x, z/x)$. **1170.** $u = f((x - y)/z, (x +$
 $+ y + 2z)/z)$. **1171.** $F(x^2 - y^2, x - y + z) = 0$. **1172.** $F(e^{-x} -$
 $- y^{-1}, z + \frac{x - \ln |y|}{e^{-x} - y^{-1}}) = 0$. **1173.** $F(x^2 - 4z, (x + y)^2/x) = 0$.
1174. $F(x^2 + y^2, z/x) = 0$. **1175.** $F\left(\frac{x^2}{y}, xy - \frac{3z}{x}\right) = 0$.
1176. $F\left(\frac{1}{x+y} + \frac{1}{z}, \frac{1}{x-y} + \frac{1}{z}\right) = 0$. **1177.** $F(x^2 + y^4, y(z +$
 $+ \sqrt{z^2 + 1})) = 0$. **1178.** $F\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{y}, \ln |xy| - \frac{z^2}{2}\right) = 0$. **1179.** $F(x^2 +$
 $+ y^2, \operatorname{arctg} (x/y) + (z + 1)e^{-z}) = 0$. **1180.** $F(z^2 - y^2, x^2 + (y -$
 $- z)^2) = 0$. **1181.** $F\left(\frac{z}{x}, 2x - 4z - y^2\right) = 0$. **1182.** $F(z - \ln |x|,$
 $2x(z - 1) - y^2) = 0$. **1183.** $F(\operatorname{tg} z + \operatorname{ctg} x, 2y - \operatorname{tg}^2 z) = 0$.
1184. $F((x + y + z)/(x - y)^2, (x - y)(x + y - 2z)) = 0$.
1185. $F((x - y)(z + 1), (x + y)(z - 1)) = 0$. **1186.** $F(u(x - y),$
 $u(y - z), (x + y + z)/u^2) = 0$. **1187.** $F(x/y, xy - 2u, (z + u -$
 $- xy)/x) = 0$. **1188.** $F((x - y)/z, (2u + x + y)z, (u - x -$
 $- y)/z^2) = 0$. **1189.** $z = 2xy$. **1190.** $z = ye^x - e^{2x} + 1$. **1191.** $z =$
 $= y^2 e^{2\sqrt{x-2}}$. **1192.** $u = (1 - x + y)(2 - 2x + z)$. **1193.** $u =$

$= (xy - 2z)\left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x}\right)$. 1194. $y^2 - x^2 - \ln \sqrt{y^2 - x^2} = z - \ln |y|$.
 1195. $2x^2(y + 1) = y^2 + 4z - 1$. 1196. $(x + 2y)^2 = 2x(z + xy)$.
 1197. $\sqrt{z/y^3} \sin x = \sin \sqrt{z/y}$. 1198. $2xy + 1 = x + 3y + z^{-1}$.
 1199. $x - 2y = x^2 + y^2 + z$. 1200. $2x^2 - y^2 - z^2 = a^2$.
 1201. $[(y^2z - 2)^2 - x^2 + z]y^2z = 1$. 1202. $x^2 + z^2 = 5(xz - y)$.
 1203. $3(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2$. 1204. $xz = (xz - y - x + 2z)^2$.
 1205. $(1 + yz)^3 = 3yz(1 + yz - x) + y^3$. 1206. $x + y + z = 0$.
 1207. $2(x^3 - 4z^3 - 3yz)^2 = 9(y + z^2)^3$. 1208. $(x - y) \times (3x + y + 4z) = 4z$. 1209. $xz + y^2 = 0$. 1210. $z = xy + f(y/x)$,
 где f — произвольная дифференцируемая функция, для которой $f(1) = 0$. 1211. $F(x^2 - y^2, 2x^2 + z^2) = 0$. 1212. $2y^2 + z^2 = z(x^2 + y^2 + z^2)$. 1213. $F(bx - ay, cx - az) = 0$. 1214. $x^2 + 3y^2 + z^2 + 3xy + xz + 3yz = 1$. 1215. $F((y - b)/(x - a), (z - c)/(x - a)) = 0$. 1216. $F(x^2/y, z/y) = 0$. 1217. $z = Cxy^2$.
 1218. Решений нет. 1219. $z = 0$. 1220. Решений нет. 1221. $x^3y^2z = C$. 1222. $z = y^2 - xy$. 1223. $x^2yz = C - x^3$; $x = 0$.

ТАБЛИЦЫ ПОКАЗАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ И ЛОГАРИФМОВ

Таблица 1

x	e^x	x	$\ln x$	$\lg x$
0,00	1,000	1,0	0,000	0,000
0,05	1,051	1,1	0,095	0,041
0,10	1,105	1,2	0,182	0,079
0,15	1,162	1,3	0,262	0,114
0,20	1,221	1,4	0,336	0,146
0,25	1,284	1,5	0,405	0,176
0,30	1,350	1,6	0,470	0,204
0,35	1,419	1,7	0,531	0,230
0,40	1,492	1,8	0,588	0,255
0,45	1,568	1,9	0,642	0,279
0,50	1,649	2,0	0,693	0,301

Таблица 2

x	e^x	x	$\ln x$	$\lg x$
-3	0,050	3	1,099	0,477
-2	0,135	4	1,386	0,602
-1	0,368	5	1,609	0,699
0	1,000	6	1,792	0,778
1	2,718	7	1,946	0,845
2	7,389	8	2,079	0,903
3	20,09	9	2,197	0,954
4	54,60	10	2,303	1,000
5	148,4	11	2,398	1,041
π	23,14	20	2,996	1,301
2π	535,5	100	4,605	2,000

